

EJERCICIOS DE TRIGONOMETRÍA

1.- Expresar en radianes los siguientes ángulos:

- a) 120° b) 13° c) 330° d) 390° g) 1000° h) 15°

2.- Calcular el ángulo, medido en radianes, que forman las del reloj cuando señalan:

- a) las 5h b) las 5h 12 m c) 12h 20m d) 2h 30 m

3.- Expresar en grados los siguientes ángulos:

- a) $\frac{4\pi}{3} \text{ rad}$ b) $\frac{5\pi}{6} \text{ rad}$ c) $\frac{16\pi}{3} \text{ rad}$ d) $\frac{\pi}{5} \text{ rad}$ e) $\frac{3\pi}{4} \text{ rad}$ f) $\frac{7\pi}{12} \text{ rad}$

4.- ¿Cuántos radianes mide el ángulo central de un decágono regular? ¿y de un pentágono?

5.- Expresar en rad. los ángulos interiores de los siguientes polígonos regulares:

- a) Cuadrado b) Pentágono c) Octógono d) Dodecágono

6.- Dibujar los ángulos cuyas razones trigonométricas son:

- a) $\operatorname{sen} \alpha = -\frac{1}{3}$ b) $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ c) $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{4}{3}$ d) $\operatorname{ctg} \alpha = 3$ e) $\sec \alpha = 4$ f) $\operatorname{cosec} \alpha = 2$

7.- Construir los siguientes ángulos:

- a) Que el seno sea el doble que el coseno
b) Que el coseno sea el triple que el seno
c) Que la tangente sea el triple que el seno.

8.- Calcular las razones trigonométricas restantes sabiendo que:

- a) $\operatorname{sen} \alpha = -\frac{1}{3}$ $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ b) $\operatorname{sen} \alpha = \frac{3}{5}$ $90^\circ < \alpha < 180^\circ$
c) $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ $\operatorname{sen} \alpha < 0$ d) $\cos \alpha = \frac{3}{4}$ $\alpha \notin \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
e) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ $\alpha \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ f) $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{12}{5}$ $\cos \alpha < 0$
g) $\sec \alpha = \sqrt{5}$ $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ h) $\operatorname{cosec} \alpha = -2$ $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$

9.- El seno de un ángulo, puede valer: a) $3/7$ b) $-7/12$ c) -1 d) $-13/5$ e) $7/6$ f) $\pi/4$

10.- ¿Puede haber algún ángulo que cumpla $\operatorname{tg} \alpha = 5$, $\operatorname{sen} \alpha = 1/2$?

11.- Comprobar las siguientes identidades

1) $\cos^2 x = \cot^2 x - \operatorname{cosec}^2 x$

2) $\operatorname{tg}^2 x = \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{cosec}^2 x$

3) $\sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x = \sec^2 x \cdot \operatorname{cosec}^2 x$

4) $\frac{1 - \operatorname{sen} x}{\cos x} = \frac{\cos x}{1 + \operatorname{sen} x}$

5) $\frac{1 + \operatorname{tg}^2 x}{\cot x} = \frac{\operatorname{tg} x}{\cos^2 x}$

6) $\operatorname{tg} x = \cot x - \frac{\cot^2 x - 1}{\cot x}$

7) $\cos^2 a \cdot \cos^2 b - \operatorname{sen}^2 a \cdot \operatorname{sen}^2 b = \cos^2 a - \operatorname{sen}^2 b$

8) $\operatorname{sen}^2 a - \cos^2 b = \operatorname{sen}^2 b - \cos^2 a$

9) $\operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \cot \alpha \cdot \sec \alpha \cdot \operatorname{cosec} \alpha = 1$

10) $\cos^4 a - \operatorname{sen}^4 a = 2\cos^2 a - 1$

11) $(\operatorname{sen} a - \cos a)^2 + (\operatorname{sen} a + \cos a)^2 = 2$

12) $(\operatorname{cosec} a + \cot a) \cdot (\operatorname{cosec} a - \cot a) = 1$

13) $\operatorname{tg} a + \cot a = \sec a \cdot \operatorname{cosec} a$

14) $\frac{\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b}{\cot a + \cot b} = \operatorname{tg} a \cdot \operatorname{tg} b$

15) $\frac{\operatorname{sen} a \cdot \cos a}{\cos^2 a - \operatorname{sen}^2 a} = \frac{\operatorname{tg} a}{1 - \operatorname{tg}^2 a}$

16) $\frac{\sec^2 a - \cos^2 a}{\operatorname{tg}^2 a} = 1 + \cos^2 a$

$$17) \frac{\cos ec a}{1 + \cot^2 a} = \operatorname{sen} a \quad 18) \frac{\cos ec^2 a - \operatorname{sen}^2 a}{\cos ec^2 a (2 - \cos^2 a)} = \cos^2 a \quad 19) 1 + \operatorname{tg} a = \frac{\operatorname{sen}(a + 45^\circ)}{\cos 45^\circ \cdot \cos a}$$

$$20) \operatorname{sen}(a + b) \cdot \operatorname{sen}(a - b) = \operatorname{sen}^2 a - \operatorname{sen}^2 b \quad 21) \cos(a + b) \cdot \cos(a - b) = \cos^2 a - \cos^2 b$$

$$22) \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen}(b - c) + \operatorname{sen} b \cdot \operatorname{sen}(c - a) + \operatorname{sen} c \cdot \operatorname{sen}(a - b) = 0$$

$$23) (\cos a + \operatorname{sen} a)^2 = \operatorname{sen} 2a + 1$$

$$24) (\cot a - \operatorname{tg} a) \cdot \left[\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + a\right) - \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - a\right) \right] = 4$$

$$25) \frac{\cot a + \operatorname{tg} a}{\cot a - \operatorname{tg} a} = \sec 2a$$

$$26) \frac{\operatorname{sen} 2a}{1 - \cos^2 a} \cdot \frac{\operatorname{sen} 2a}{\cos a} = 4 \cos a$$

$$27) \frac{2 \operatorname{sen} a}{\operatorname{tg} 2a} = \cos a - \frac{\operatorname{sen}^2 a}{\cos a}$$

$$28) \operatorname{tg} \frac{a}{2} = \pm (\cos ec a - \cot a)$$

$$29) \operatorname{sen} a = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{a}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{a}{2}}$$

$$30) \cos a = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{a}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{a}{2}}$$

12.- Resolver los siguientes triángulos, rectángulos en A, sabiendo :

a) a=54 , B=32°25'

b) b=230 , B=62°26'

c) a=62 , b=32

d) b=122 , c=130

e) c=27 , a=35

f) c=34 , B=42°25'

13.- Sabiendo que $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$, hallar: a) $\operatorname{tg}(\alpha + 30^\circ)$ b) $\operatorname{tg}(45^\circ - \alpha)$

14.- Si $\operatorname{tg} 14^\circ 5' = \frac{1}{4}$, calcular: a) $\operatorname{sen} 28^\circ 10'$ b) $\cos 28^\circ 10'$ c) $\operatorname{tg} 28^\circ 10'$

15.- Calcular $\operatorname{sen} 2\alpha$, $\cos 2\alpha$ y $\operatorname{tg} 2\alpha$ sabiendo

a) $\operatorname{tg} \alpha = 7$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$

b) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{-7}{3}$, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$

c) $\operatorname{sen} \alpha = \frac{3}{7}$, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$

d) $\cot \alpha = \frac{4}{3}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$

16.- Si $\cos \alpha = \frac{1}{5}$, calcular las razones trigonométricas de $(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$

17.- Sabiendo que $\operatorname{tg} \alpha = 2$, calcular el valor de $\operatorname{sen} 4\alpha$

18.- Calcular seno, coseno y tangente de a) $112^\circ 30'$ b) 150° c) 60° en función de los cosenos de los ángulos 225° , 300° y 120° respectivamente.

19.- Si $\cos 80^\circ = \frac{1}{5}$, hallar:

a) $\operatorname{sen} 40^\circ$

b) $\cos 40^\circ$

c) $\operatorname{tg} 40^\circ$

d) $\operatorname{sen} 20^\circ$

e) $\cos 20^\circ$

f) $\operatorname{tg} 20^\circ$

20.- Si $\cos \alpha = \frac{1}{6}$ y $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, calcular: a) $\operatorname{sen} \frac{\alpha}{2}$ b) $\cos \frac{\alpha}{2}$ c) $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$

21.- Si $\operatorname{tg} 2\alpha = \sqrt{3}$, hallar $\operatorname{sen} \alpha$ y $\cos \alpha$ sabiendo que $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$

22.- Si $\operatorname{sen} \alpha = \frac{1}{2}$, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ y $\cos \beta = \frac{3}{5}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ calcular:

a) $\operatorname{sen}(\alpha + \beta)$

b) $\operatorname{sen}(\alpha - \beta)$

c) $\cos(\alpha + \beta)$

d) $\cos(\alpha - \beta)$

e) $\operatorname{tg}(\alpha + \beta)$

f) $\operatorname{tg}(\alpha - \beta)$

g) $\operatorname{sen} 2\alpha$

h) $\cos 2\alpha$

i) $\operatorname{tg} 2\alpha$

j) $\cos \frac{\alpha}{2}$

k) $\operatorname{tg} \frac{\beta}{2}$

l) $\operatorname{sen}(\alpha + 2\beta)$

23.- Resolver los siguientes triángulos, rectángulos en A, sabiendo:

a) a=54, B=32°25'

b) b=230, B=62°26'

c) a=62, b=32

d) b=122, c=130

e) c=27, a=35

f) c=34, B=42°25'

24.- Resolver los siguientes triángulos:

a) a=25, B=36°30', C=58°45'

b) a=12, B=32°, C=124°

c) a=114, b=105, C=54°18'

d) b=40, c=45, A=62°9'

e) a=90, b=102, A=61°18'

f) b=45, c=50, B=40°32'

g) a=12, b=20, c=15

h) a=10, b=8, c=7