

Opción A**Ejercicio 1 opción A, Reserva B de 2019 (modelo 6)**

[2'5 puntos] Dada la función $f: (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$, calcula sus máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión de la gráfica de f (abscisas en los que se obtienen y valores que se alcanzan).

Solución

Dada la función $f: (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$, calcula sus máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión de la gráfica de f (abscisas en los que se obtienen y valores que se alcanzan).

Calcularemos los extremos por la monotonía, es decir por el estudio de la 1ª derivada $f'(x)$.

Recordamos que $\sin(x)$ y $\cos(x)$ son continuas y derivables en \mathbb{R} , por tanto también lo es la función f , en particular en el intervalo dado $(0, 2\pi)$.

$$f(x) = \sin(x) + \cos(x); \quad f'(x) = \cos(x) - \sin(x).$$

De $f'(x) = 0$, tenemos $\cos(x) - \sin(x) = 0$, es decir $\cos(x) = \sin(x)$. Sabemos que \sin y \cos coinciden en la bisectriz del I y III cuadrante (la recta $y = x$), por tanto $x = \pi/4 + k \cdot 2\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. En nuestro intervalo $(0, 2\pi)$ los posibles extremos relativos son $x = \pi/4$ y $x = \pi + \pi/4 = 5\pi/4$.

Como $f'(0+) = \cos(0+) - \sin(0+) = 1 - 0 > 0$, f es estrictamente creciente (\nearrow) en $(0, \pi/4)$.

Como $f'(\pi/2) = \cos(\pi/2) - \sin(\pi/2) = 0 - 1 < 0$, f es estrictamente decreciente (\searrow) en $(\pi/4, 5\pi/4)$.

Como $f'(3\pi/2) = \cos(3\pi/2) - \sin(3\pi/2) = 0 - (-1) = 1 > 0$, f es estrictamente creciente (\nearrow) en $(5\pi/4, 2\pi)$.

Por definición $x = \pi/4$ es un máximo relativo y vale $f(\pi/4) = \sin(\pi/4) + \cos(\pi/4) = (\sqrt{2})/2 + (\sqrt{2})/2 = \sqrt{2}$.

Por definición $x = 5\pi/4$ es un mínimo relativo y vale $f(5\pi/4) = \sin(5\pi/4) + \cos(5\pi/4) = -(\sqrt{2})/2 - (\sqrt{2})/2 = -\sqrt{2}$.

Calcularemos los puntos de inflexión por la curvatura, es decir por el estudio de la 2ª derivada $f''(x)$.

$$f(x) = \sin(x) + \cos(x); \quad f'(x) = \cos(x) - \sin(x); \quad f''(x) = -\sin(x) - \cos(x).$$

De $f''(x) = 0$, tenemos $-\sin(x) - \cos(x) = 0$, es decir $\cos(x) = -\sin(x)$. Sabemos que \sin y \cos coinciden y tienen signo opuesto en la bisectriz del II y IV cuadrante (la recta $y = -x$), por tanto $x = (\pi/2 + \pi/4) + k \cdot 2\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. En nuestro intervalo $(0, 2\pi)$ los posibles puntos de inflexión son $x = 3\pi/4$ y $x = 3\pi/2 + \pi/4 = 7\pi/4$.

Como $f''(\pi/2) = -\sin(\pi/2) - \cos(\pi/2) = -1 - 0 < 0$, f es cóncava (\cap) en $(0, 3\pi/4)$.

Como $f''(\pi) = -\sin(\pi) - \cos(\pi) = 0 - (-1) = 1 > 0$, f es convexa (\cup) en $(3\pi/4, 7\pi/4)$.

Como $f''(2\pi) = -\sin(2\pi) - \cos(2\pi) = 0 - 1 < 0$, f es cóncava (\cap) en $(7\pi/4, 2\pi)$.

Por definición $x = 3\pi/4$ es un punto de inflexión y vale $f(3\pi/4) = \sin(3\pi/4) + \cos(3\pi/4) = (\sqrt{2})/2 - (\sqrt{2})/2 = 0$.

Por definición $x = 7\pi/4$ es un punto de inflexión y vale $f(7\pi/4) = \sin(7\pi/4) + \cos(7\pi/4) = -(\sqrt{2})/2 + (\sqrt{2})/2 = 0$.

Ejercicio 2 opción A, Reserva B de 2019 (modelo 6)

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 6x - 8 & \text{si } x \leq 4 \\ x^2 - 6x + 8 & \text{si } x > 4 \end{cases}$.

(a) [1'5 puntos] Calcula los puntos de corte de la gráfica de f y la recta $y = 2x - 4$. Esboza el recinto que delimitan la gráfica de f y la recta.

(b) [1 punto] Calcula el área del recinto anterior.

Solución

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 6x - 8 & \text{si } x \leq 4 \\ x^2 - 6x + 8 & \text{si } x > 4 \end{cases}$.

(a)

Calcula los puntos de corte de la gráfica de f y la recta $y = 2x - 4$. Esboza el recinto que delimitan la gráfica de f y la recta.

Si $x < 4$, $f(x) = -x^2 + 6x - 8$. Igualando tenemos: $-x^2 + 6x - 8 = 2x - 4 \rightarrow 0 = x^2 - 4x + 4$. Resolviendo la ecuación $x^2 - 4x + 4 = 0$ tenemos $x = 2$ (doble), que está en $x < 4$. Punto $(2, f(2)) = (2, 0)$.

Si $x > 4$, $f(x) = x^2 - 6x + 8$. Igualando tenemos: $x^2 - 6x + 8 = 2x - 4 \rightarrow 0 = x^2 - 8x + 12$. Resolviendo la ecuación $x^2 - 8x + 12 = 0$ tenemos $x = 2$, no está en $x < 4$, y $x = 6$, está en $x > 4$. Punto $(6, f(6)) = (6, 8)$.

Si $x < 4$, $f(x) = -x^2 + 6x - 8$ cuya gráfica es un trozo de parábola así (\cap) porque el n° que multiplica a x^2 es negativo.

La abscisa de su vértice es la solución de $f'(x) = 0 = -2x + 6$, de donde $x = 3$, está en $x < 4$. Su vértice es el punto $V(3, f(3)) = V(3, 1)$.

Hemos visto antes que pasa por $(2, 0)$, además $f(4) = 0$, es decir otro punto es $(4, 0)$. Ya se puede esbozar.


Si $x > 4$, $f(x) = x^2 - 6x + 8$ cuya gráfica es un trozo de parábola así (\cup) porque el n° que multiplica a x^2 es positivo.

La abscisa de su vértice es la solución de $f'(x) = 0 = 2x - 6$, de donde $x = 3$, no está en $x > 4$. Su vértice sería el punto $V(3, f(3)) = V(3, -1)$.

Hemos visto antes que pasa por $(6, 8)$, además $f(4) = 0$, es decir otro punto es $(4, 0)$. Ya se puede esbozar.

La recta $y = 2x - 4$ hemos visto que pasa por los puntos $(2, 0)$ y $(6, 8)$.

Un esbozo de las gráficas sería:



(b)

Calcula el área del recinto anterior.

$$\text{Área} = \text{Área 1} + \text{Área 2} = \int_2^4 (2x - 4 - (-x^2 + 6x - 8)) dx + \int_4^6 (2x - 4 - (x^2 - 6x + 8)) dx =$$

$$= \int_2^4 (x^2 - 4x + 4) dx + \int_4^6 (-x^2 + 8x - 12) dx = \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x \right]_2^4 + \left[-\frac{x^3}{3} + 4x^2 - 12x \right]_4^6 =$$

$$= [(64/3 - 32 + 16) - (8/3 - 8 + 8)] + [(-216/3 + 144 - 72) - (-64/3 + 64 - 48)] u^2 = \mathbf{8/3 + 16/3 u^2 = 8 u^2}.$$

Ejercicio 3 opción A, Reserva B de 2019 (modelo 6)

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ m-1 & m & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ k \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

(a) [1'25 puntos] Estudia el rango de A según los valores de "m".

(b) [1'25 puntos] Sabiendo que para "m = 1" el sistema dado por $AX = B$ tiene solución, encuentra k y resuélvelo.

Solución

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ m-1 & m & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ k \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

(a)

Estudia el rango de A según los valores de "m".

Tenemos $\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} 1 & m & 1 \\ m-1 & m & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} F_1 - F_3 \\ \\ \\ \end{array} = \begin{vmatrix} 0 & m-1 & 0 \\ m-1 & m & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{Adjuntos} \\ \text{primera} \\ \text{fila} \end{array} = -(m-1) \cdot (m-1 - 0) = -(m-1)^2$.

De $\det(A) = 0$, tenemos $-(m-1)^2 = 0$, de donde $m-1 = 0$ es decir la solución es $m = 1$ (doble).**Si $m \neq 1$ (dos veces), $\det(A) \neq 0$, con lo cual $\text{rango}(A) = 3$.**

Si $m = 1$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ F_3 - F_1 \\ \end{array} \approx \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, es decir cómo nos quedan **dos filas** con números distinto de

cero, después de realizar las transformaciones elementales de Gauss, tenemos **$\text{rango}(A) = 2$** .

(b)

Sabiendo que para " $m = 1$ " el sistema dado por $AX = B$ tiene solución, encuentra k y resuélvelo.Hemos visto en el apartado (a) que si " $m = 1$ ", $\text{rango}(A) = 2$, luego no existe la inversa de la matriz A, por

tanto en el sistema $AX = B$, la matriz ampliada del sistema es $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$. Como me dicen que el sis-

tema tiene solución, por el Teorema de Rouché tiene que ser $\text{rango } A^* = 2$, para lo cual en A^* el siguiente

determinante $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{Adjuntos} \\ \text{primera} \\ \text{fila} \end{array} = 1(k-1) - 1(-1) = k$, tiene que ser cero. **Si $k = 0$ el sistema dado por la**

ecuación $AX = B$ tiene solución.Como para " $m = 1$ " tenemos $\text{rango}(A) = \text{rango}(A^*) = 2 <$ número de incógnitas, es un sistema compatible e indeterminado, y tiene más de una solución (en \mathbb{R} infinitas), por el Teorema de Rouché.

Por tener rango 2 utilizamos sólo dos ecuaciones, las dos primeras.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ y = 1 \end{cases} \text{ . Llamando } \mathbf{z} = \mathbf{b} \in \mathbb{R} \text{ tenemos } \mathbf{y} = \mathbf{1}, \text{ y entrando en la primera ecuación } \mathbf{x} = \mathbf{-1 - b}, \text{ y la solu-}$$

ción del sistema es $(x, y, z) = (-1 - b, 1, b)$, con $b \in \mathbb{R}$.**Ejercicio 4 opción A, Reserva B de 2019 (modelo 6)**

Considera la recta $r \equiv \frac{x-4}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{5}$ y el plano $\pi \equiv 2x + y - z + 3 = 0$.

(a) [1'25 puntos] Halla la ecuación general del plano perpendicular a π que contiene a r .(b) [1'25 puntos] Calcula la distancia entre r y π .**Solución**

Considera la recta $r \equiv \frac{x-4}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{5}$ y el plano $\pi \equiv 2x + y - z + 3 = 0$.

(a)

Halla la ecuación general del plano perpendicular a π que contiene a r .Para un plano necesitamos un punto, el $A(4,0,1)$ de la recta, y dos vectores independientes el vector director de la recta " r ", $\mathbf{u} = (2,1,5)$, y el vector de la dirección perpendicular del plano π , el vector $\mathbf{n} = (2,1,-1)$.

Plano pedido $\pi_1 \equiv \det(\mathbf{AX}, \mathbf{u}, \mathbf{n}) = 0 = \begin{vmatrix} x-4 & y & z-1 \\ 2 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{Adjuntos} \\ \text{primera} \\ \text{fila} \end{array} = (x-4)(-1-5) - (y)(-2-10) + (z-1)(2-2) =$

$$= -6x + 12y + 24 = \mathbf{-x + 2y + 4 = 0}.$$

(b)

Calcula la distancia entre r y π .

Calculamos la posición relativa de la recta r y el plano π . Si el producto escalar del director u con el normal n es cero la recta y el plano son paralelos.

Como $u \cdot n = (2, 1, 5) \cdot (2, 1, -1) = 4 + 1 - 5 = 0$, la recta y el plano son paralelos.

Como " r " y π son paralelos, la distancia de " r " a π es la distancia de un punto cualquiera de " r " a π , es decir:

$$d(r, \pi) = d(A, \pi) = \frac{|2(4) + (0) - (1) + 3|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{|10|}{\sqrt{6}} = \frac{10}{\sqrt{6}} u^1.$$

Opción B

Ejercicio 1 opción B, Reserva B de 2019 (modelo 6)

[2'5 puntos] Considera la función f definida por $f(x) = \frac{ax+b}{cx+1}$ para $cx+1 \neq 0$.

Determina a , b y c sabiendo que la recta $x = -1$ es una asíntota vertical a la gráfica de f y que $y = 2x + 4$ es la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$.

Solución

Considera la función f definida por $f(x) = \frac{ax+b}{cx+1}$ para $cx+1 \neq 0$.

Determina a , b y c sabiendo que la recta $x = -1$ es una asíntota vertical a la gráfica de f y que $y = 2x + 4$ es la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$.

Sabemos que las asíntotas verticales ($x = -1$) anulan el denominador y además $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x)] = \infty$.

En nuestro caso $c(-1) + 1 = 0$, de donde $c = 1$.

Como $y = 2x + 4$ es la recta tangente a la gráfica de f en $x = 1$, tenemos $f'(1) = y' = 2$, y además $f(1) = y(1) = 2(1) + 4 = 6$.

$$\text{Tenemos } f(x) = \frac{ax+b}{x+1}, \quad f'(x) = \frac{a(x+1) - (ax+b)1}{(x+1)^2} = \frac{ax+a - ax-b}{(x+1)^2} = \frac{a-b}{(x+1)^2}$$

$$\text{De } f'(1) = 2 \rightarrow 2 = \frac{a-b}{(1+1)^2} = \frac{a-b}{4} \rightarrow a-b = 8$$

$$\text{De } f(1) = 6 \rightarrow 6 = \frac{a+b}{1+1} = \frac{a+b}{2} \rightarrow a+b = 12. \text{ Sumando ambas ecuaciones } \rightarrow 2a = 20, \text{ luego } a = 10.$$

$$\text{De } 10 + b = 12, \text{ tenemos } b = 2.$$

Ejercicio 2 opción B, Reserva B de 2019 (modelo 6)

[2'5 puntos] Considera la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = -4x^2 + a$, siendo $a > 0$ un número real. Esboza el recinto limitado por la gráfica de f y la recta $y = 0$. Calcula a sabiendo que el área del recinto es 18.

Solución


Considera la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = -4x^2 + a$, siendo $a > 0$ un número real. Esboza el recinto limitado por la gráfica de f y la recta $y = 0$. Calcula a sabiendo que el área del recinto es 18.

La gráfica de $f(x) = -4x^2 + a$ es una parábola así (\cap) porque el n° que multiplica a x^2 es negativo. La abscisa de su vértice es la solución de $f'(x) = 0 = -8x$, de donde $x = 0$, y su vértice es $V(0, f(0)) = V(0, a)$.

$$\text{Para } f(x) = 0 \text{ tenemos } 4x^2 = a \rightarrow x^2 = a/4 \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{a}{4}} = \pm \frac{\sqrt{a}}{2}.$$

Sabemos que la recta $y = 0$ es el eje de abscisas OX.

Un esbozo de las gráficas sería:



$$\begin{aligned} \text{Área} = 18 &= \int_{-\sqrt{a}/2}^{\sqrt{a}/2} (-4x^2 + a) dx = \left\{ \begin{array}{l} \text{Por} \\ \text{simetría} \end{array} \right\} = 2 \cdot \int_0^{\sqrt{a}/2} (-4x^2 + a) dx = 2 \cdot \left[\frac{-4x^3}{3} + ax \right]_0^{\sqrt{a}/2} = \\ &= 2 \cdot \left[\frac{-4(\sqrt{a}/2)^3}{3} + a(\sqrt{a}/2) - 0 \right] = 2 \cdot \left(\frac{-4\sqrt{a}^3}{3 \cdot 2^3} + \frac{a\sqrt{a}}{2} \right) = 2 \cdot \left(\frac{-a\sqrt{a}}{6} + \frac{a\sqrt{a}}{2} \right) = \frac{2a\sqrt{a}}{3}, \text{ con lo cual } 18 \cdot 3 = 2a\sqrt{a}, \text{ es} \\ &\text{decir } 27 = a\sqrt{a}. \text{ Elevando al cuadrado } 27^2 = a^2 \cdot a = a^3 = (3^3)^2, \text{ luego } a = \sqrt[3]{(3^3)^3} = 3^2 = 9. \end{aligned}$$

Ejercicio 3 opción B, Reserva B de 2019 (modelo 6)

Considera el siguiente sistema de ecuaciones $\begin{cases} mx + (m + 1)z = m \\ my + z = m \\ y + mz = m \end{cases}$

- a) [1'75 puntos] Discute el sistema según los valores de "m".
- b) [0'75 puntos] Resuélvelo, si es posible, para m = 1.

Solución

Considera el siguiente sistema de ecuaciones $\begin{cases} mx + (m + 1)z = m \\ my + z = m \\ y + mz = m \end{cases}$

- a) Discute el sistema según los valores de "m".

Matriz de los coeficientes $A = \begin{pmatrix} m & 0 & m+1 \\ 0 & m & 1 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$, matriz ampliada $A^* = \begin{pmatrix} m & 0 & m+1 & m \\ 0 & m & 1 & m \\ 0 & 1 & m & m \end{pmatrix}$.

Tenemos $\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} m & 0 & m+1 \\ 0 & m & 1 \\ 0 & 1 & m \end{vmatrix}$ $\begin{array}{l} \text{Adjuntos} \\ \text{primera} \\ \text{columna} \end{array} = m \cdot (m^2 - 1) = m \cdot (m + 1) \cdot (m - 1)$.

De $\det(A) = 0 \rightarrow m \cdot (m + 1) \cdot (m - 1) = 0$, de donde $m = 0$, $m = 1$ y $m = -1$.

Si $m \neq 0$, $m \neq 1$ y $m \neq -1$, $\det(A) \neq 0$, $\text{rango}(A) = \text{rango}(A^*) = 3$ = número de incógnitas, **sistema compatible y determinado, y tiene solución única.** Por el Teorema de Rouchè.

Si $m = 0$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, matriz ampliada $A^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. En A como $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 1 = -1 \neq 0$, $\text{rango}(A) =$

$2 = \text{rango}(A^*)$, porque A^* tiene la cuarta columnas de ceros.

Como **$\text{rango}(A) = \text{rango}(A^*) = 2 < 3$** , el **sistema es compatible e indeterminado y tiene más de una solución.** Por el Teorema de Rouchè.

Si $m = 1$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, matriz ampliada $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. En A como $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 0 = 1 \neq 0$, $\text{rango}(A) =$

$2 = \text{rango}(A^*)$, porque A^* tiene la 2ª y 3ª fila iguales.

Como **$\text{rango}(A) = \text{rango}(A^*) = 2 < 3$** , el **sistema es compatible e indeterminado y tiene más de una solución.** Por el Teorema de Rouchè.

$$\text{Si } m = -1, A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ matriz ampliada } A^* = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{En } A \text{ como } \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 - 0 = 1 \neq 0, \text{ rango}(A) = 2. \text{ En } A^* \text{ como } \begin{vmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{Adjuntos} \\ \text{primera} = (-1)(1+1) = -2 \neq 0, \\ \text{columna} \end{array}$$

$$\text{rango}(A^*) = 3.$$

Como $\text{rango}(A) = 2 \neq \text{rango}(A^*) = 3$, el sistema es incompatible y no tiene solución. Por el Teorema de Rouché.

b)

Resuélvelo, si es posible, para $m = 1$.

Hemos visto en el apartado (a) que si $m = 1$, $\text{rango}(A) = \text{rango}(A^*) = 2 < 3$, el sistema es compatible e indeterminado y tiene más de una solución.

Por tener rango 2 utilizamos sólo dos ecuaciones (las dos primeras, que son con las que hemos calculado el menor de orden 2 de A distinto de cero)

$$\begin{cases} x + 2z = 1 \\ y + z = 1 \end{cases}. \text{ Llamando } z = b \in \mathbb{R} \text{ tenemos } y = 1 - b, \text{ y de la primera ecuación } x = 1 - 2b, \text{ y la solución del}$$

sistema es $(x, y, z) = (1-2b, 1-b, b)$, con $b \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 4 opción B, Reserva B de 2019 (modelo 6)

Se consideran los puntos $A(0, -1, 3)$, $B(2, 3, -1)$, y la recta $r \equiv \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$.

a) [1'25 puntos] Determina un punto C de r de forma que el triángulo ABC sea rectángulo en A .

b) [1'25 puntos] Calcula los puntos de r que equidistan de los puntos A y B .

Solución

Se consideran los puntos $A(0, -1, 3)$, $B(2, 3, -1)$, y la recta $r \equiv \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$.

a)

Determina un punto C de r de forma que el triángulo ABC sea rectángulo en A .

Tenemos $A(0, -1, 3)$ y $B(2, 3, -1)$, y ponemos "r" es forma vectorial $r \equiv (x, y, z) = (-2, 2, 3) + b(1, 2, 3) = (-2 + b, 2 + 2b, 3 + 3b)$ con $b \in \mathbb{R}$. Un punto genérico de "r" es $C(-2 + b, 2 + 2b, 3 + 3b)$.

Como nos dicen que ABC sea rectángulo en A , formamos los vectores \mathbf{AB} y \mathbf{AC} , que tienen que ser perpendiculares, luego su producto escalar (\bullet) tiene que ser cero. De dicha ecuación obtendremos los valores de "b" y el punto C pedido.

$$\mathbf{AB} = (2, 4, -4); \quad \mathbf{AC} = (-2 + b - 0, 2 + 2b + 1, 3 + 3b - 3) = (-2 + b, 3 + 2b, 3b)$$

$$\mathbf{AB} \bullet \mathbf{AC} = 0 = (2, 4, -4) \bullet (-2 + b, 3 + 2b, 3b) = 0 = -4 + 2b + 12 + 8b - 12b = 8 - 2b = 0, \text{ de donde } b = 8/2 = 4, \text{ y el punto "C" es } C(-2 + (4), 2 + 2(4), 3 + 3(4)) = C(2, 10, 15).$$

b)

Calcula los puntos de r que equidistan de los puntos A y B .

Un punto genérico de "r" era $C(-2 + b, 2 + 2b, 3 + 3b)$, me están pidiendo puntos tales que $d(A, C) = d(A, C)$, es decir $\|\mathbf{AC}\| = \|\mathbf{BC}\|$.

$$\text{Teníamos } \mathbf{AC} = (-2 + b, 3 + 2b, 3b).$$

$$\text{Análogamente } \mathbf{BC} = (-2 + b - 2, 2 + 2b - 3, 3 + 3b + 1) = (-4 + b, -1 + 2b, 4 + 3b).$$

$$\|\mathbf{AC}\| = \sqrt{(-2+b)^2 + (3+2b)^2 + (3b)^2} = \sqrt{4-4b+b^2+9+12b+4b^2+3b^2} = \sqrt{14b^2+8b+13}$$

$$\|\mathbf{BC}\| = \sqrt{(-4+b)^2 + (-1+2b)^2 + (4+3b)^2} = \sqrt{16-8b+b^2+1-4b+4b^2+16+24b+3b^2} = \sqrt{14b^2+12b+33}$$

Igualando $\|\mathbf{AC}\| = \|\mathbf{BC}\|$ y elevando al cuadrado tenemos $14b^2 + 8b + 13 = 14b^2 + 12b + 33$, de donde resulta $0 = 4b + 20$, es decir $b = -20/4 = -5$, y el punto de r que equidista de los puntos A y B es:

$$C(-2 + (-5), 2 + 2(-5), 3 + 3(-5)) = C(-7, -8, -12).$$