

Temperatura y energía interna

1. Ordena los siguientes valores de temperatura de mayor a menor: 482 °F; 102,1 °C; 303,2 °C; 319,16 K; 301,36 K; 233,6 °F.

2. Para medir la temperatura se utilizan diferentes dispositivos, siendo el más utilizado en la vida cotidiana el termómetro de mercurio.

- ¿En qué se basa el funcionamiento de un termómetro de mercurio?
- ¿Qué es un termopar? Investígalo en alguna enciclopedia o en Internet.
- Investiga qué es el termómetro de Galileo, qué es un pirómetro
- Los termómetros de alcohol, habituales en los laboratorios de ciencias, ¿podrán medir la temperatura de ebullición del agua? Recuerda que el punto de ebullición del alcohol etílico es de, aproximadamente, 78 °C.

3. El punto de fusión del oxígeno (O₂) es 50,4 K y su punto de ebullición, 90,2 K.

- ¿A qué temperaturas corresponden, expresadas en la escala Celsius?
- ¿Hasta qué temperatura se ha de enfriar un recipiente que contenga O₂ para que pase a estado líquido?
- ¿Puede el gas oxígeno pasar a estado sólido? Explícalo.

4. Contesta a estas cuestiones:

- ¿Qué se entiende por energía interna de un sistema material?
- ¿Podemos afirmar que, para un mismo sistema, cuanto mayor sea su masa, mayor será su energía interna? Justifica tu respuesta.

5. Cuando un gas encerrado en un recipiente de volumen fijo se calienta, se observa un aumento de temperatura y de presión. Explica, basándote en este hecho experimental, qué ocurre con su energía interna.

6. En una película norteamericana el protagonista hace referencia a la temperatura de un bloque de hielo y dice que es de 14°. ¿Habrá un error en la traducción? ¿Cuál es la temperatura del bloque?

Sol: -10 °C

7. ¿A qué temperatura un termómetro graduado en escala Fahrenheit indica el mismo valor numérico que uno graduado en escala Celsius?

Sol: -40

8. Un termómetro centígrado muestra una temperatura de 75 °C. ¿Cuál debe ser la lectura Fahrenheit en el mismo lugar?

Sol: 167 °F

9. Convierte los siguientes valores de temperaturas en grados Fahrenheit en grados Celsius: 86 °F; 122 °F; 158 °F; 176 °F; 400 °F.

10 Convierte los siguientes valores de temperaturas en grados Celsius en grados Fahrenheit: 65,5 °C; 35 °C; 168,5 °C; -15 °C; -120 °C.

11. Convierte los siguientes valores de temperaturas en grados Celsius en grados Kelvin: 87 °C; 129 °C; 358 °C; 427 °C; 222 °C.

El calor y su propagación. Calor y trabajo

12. Contesta brevemente a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué se entiende por calor?
- ¿Podemos afirmar que, cuanto mayor es la temperatura de un cuerpo, este posee más calor?
- ¿Qué condición debe cumplirse para que exista transferencia de calor?

13. Define el julio y la caloría. Si un producto alimenticio tiene un valor energético de 89 kJ por cada 100 g, ¿qué cantidad de este alimento debe ingerir una persona que no quiera exceder 53 kcal al consumirlo?

Sol: 249 g

14. ¿En qué consiste el equilibrio térmico? Busca tres ejemplos cotidianos en los que se ponga de manifiesto.

15. Resume esquemáticamente las distintas formas de transferencia de calor que hay, poniendo en cada caso un ejemplo.

16. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando en cada caso tu respuesta:

- La conducción y la convección son formas de transferencia de calor que no tienen lugar en el vacío.
- La radiación es una transferencia de energía mediante ondas electromagnéticas.
- En un sólido no puede tener lugar la propagación del calor por convección.
- Los metales no son buenos conductores del calor.

17. En los edificios de viviendas es habitual construir un doble muro, de modo que quede una pequeña cámara de aire entre el muro de la fachada y la pared interior de la vivienda. ¿Qué justificación puede tener esto desde el punto de vista físico?

18. Un adulto debe consumir 2500 kcal en su dieta diaria. ¿A cuántos kJ equivale esa cantidad de energía? Si una persona de 70 kg quiere consumir el 5 % de esa energía montando en bicicleta, ¿cuánto tiempo deberá ejercitarse en dicha actividad, si por cada 10 minutos de paseo y kg de masa corporal consume 1,5 kcal?

Sol: 1045 kJ; 12 min

19. Un motor de una grúa consume $3,5 \cdot 10^5$ J de energía para subir una carga de 700 kg desde el suelo hasta una altura de 20 m. ¿Qué porcentaje de energía se ha transferido al medio en forma de calor, debido a las pérdidas por fricción o rozamiento del motor? Indica su valor, expresado en calorías.

Sol: 61%; $2,128 \cdot 10^5$ kJ

Efectos del calor. Aumento de temperatura

20. El efecto de aumento de la temperatura al aportar calor a un sistema es bastante evidente. ¿Podrías explicarlo desde el punto de vista microscópico? Recuerda que la temperatura está relacionada con la energía cinética de las partículas.

21. El calor específico del mercurio es 0,14 J/g·K. ¿Qué significa este dato? ¿Cuál es el calor específico del mercurio, expresado en cal/g·K?

Sol: $3,349 \cdot 10^{-2}$ cal/g·K

22. Un banco de granito, que se encuentra en el parque a la intemperie, ha aumentado su temperatura desde $18\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ por la acción de los rayos del sol. Sabiendo que el calor específico del granito es $0,192\text{ kcal/kg}\cdot\text{K}$, y que el banco tiene una masa de 490 kg , calcula la cantidad de calor absorbida en el proceso.

Sol: $1,062\cdot 10^4\text{ kJ}$

23. En casa de María del Mar hay un calentador eléctrico de 100 L de capacidad, que se llena inicialmente con agua a $16\text{ }^{\circ}\text{C}$ para calentarla hasta que su temperatura final sea $65\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sabiendo que el calor específico del agua es de $1\text{ cal/g}\cdot\text{K}$ y que su densidad es de 1000 kg/m^3 , calcula:

a) La cantidad de calor necesario para calentar el agua contenida en el aparato.

c) El coste del proceso, suponiendo que el rendimiento de la resistencia es del 85% y que el kWh de energía eléctrica se paga a 9 céntimos de euro.

Sol: $2,048\cdot 10^4\text{ kJ}$; $0,60\text{ €}$

24. Iván tiene un acuario de peces tropicales de 105 L de capacidad, que está a una temperatura de $28,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. En una limpieza rutinaria, extrae un tercio del agua contenida y la reemplaza por agua limpia a $15\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es la temperatura del acuario, una vez alcanzado el equilibrio térmico? ¿Qué calor debe suministrarse para volver a alcanzar la temperatura inicial?

Sol: $24\text{ }^{\circ}\text{C}$; $1,975\cdot 10^3\text{ kJ}$

25. En un calorímetro ideal que contiene 300 g de agua a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ se introduce un cuerpo de calor específico desconocido que se encuentra a una temperatura de $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ y tiene una masa de 800 g . Si la temperatura a la que se establece el equilibrio térmico es $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ calcular el calor específico del cuerpo.

Sol: $522,5\text{ J/kg}\cdot\text{K}$

26. En un calorímetro real que tiene un equivalente en agua de 20 g y contiene 380 g de agua en equilibrio a $10\text{ }^{\circ}\text{C}$, se introduce un trozo de aluminio a $400\text{ }^{\circ}\text{C}$. Si el equilibrio térmico se restablece a una temperatura de $80\text{ }^{\circ}\text{C}$, calcular la masa del cuerpo de aluminio. Dato: $c_{\text{eAl}} = 920\text{ J/kg}\cdot\text{K}$.

Sol: $0,397\text{ kg}$

27. Calcular la cantidad de calor que deben ceder 1600 g de agua que se encuentran a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ para disminuir su temperatura hasta $10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Sol: $6,09\cdot 10^5\text{ J}$

28. Un cuerpo de 200 g absorbe 5 kJ y su temperatura aumenta de $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $90\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determinar el calor específico del mismo.

Sol: $312,5\text{ J/kg}\cdot\text{K}$

29. Se colocan $0,5\text{ kg}$ de vidrio que está a $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ en contacto térmico con 200 g de agua a $29\text{ }^{\circ}\text{C}$. Si solo intercambian calor entre ellos, calcular la temperatura de equilibrio de la mezcla. $c_v = 669\text{ J/kg}\cdot\text{K}$

Sol: $88\text{ }^{\circ}\text{C}$

30. Indicar qué requiere mayor transformación de energía: levantar un cuerpo de plomo de 5 kg desde el piso hasta una altura de 10 m a velocidad constante o aumentar la temperatura del mismo cuerpo en $1\text{ }^{\circ}\text{C}$. $c_{\text{ePb}} = 129\text{ J/kg}\cdot\text{K}$

Sol: aumentar la temperatura del cuerpo

31. Un cuerpo de 200 g que está a una temperatura de $120\text{ }^{\circ}\text{C}$, se introduce dentro de un calorímetro cuyo equivalente en agua es 30 g que contiene 500 g de agua a $15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Si la temperatura de equilibrio resulta de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, calcular el calor específico del cuerpo.

Sol: $554\text{ J/kg}\cdot\text{K}$

Efectos del calor. Dilatación de sólidos y líquidos

32. Contesta brevemente a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué es la dilatación y por qué se produce?

b) ¿Para qué sirven las juntas de dilatación?

c) ¿Qué ocurre con la temperatura durante un cambio de estado?

d) ¿A qué llamamos calor latente de fusión?

33. Un cable de cobre tiene una longitud de 15 m, cuando la temperatura ambiente es de 20 °C. Si al circular una corriente eléctrica por él se calienta a una temperatura de 420 °C. ¿Cuánto se alargará? Dato: Coeficiente de dilatación del cobre: $\lambda = 17 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

Sol: 102 mm

34. Un vaso de precipitado de vidrio pirex que tiene una capacidad de 2000 cm³ está completamente lleno de alcohol a una temperatura de 0 °C. Calcular cuánto alcohol se derramará al calentarlo hasta 70 °C si se supone que la evaporación es despreciable. Datos: Coeficientes de dilatación del alcohol y vidrio: $\lambda_A = 11 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$; $\lambda_V = 3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.

Sol: 152,74 cm³ de alcohol

35. La longitud de una columna de mercurio de un termómetro es de 4 cm cuando el termómetro se sumerge en agua con hielo y 24 cm cuando el termómetro se coloca en agua hirviendo.

a) ¿Cuál es su longitud cuando se lo coloca en una habitación a 22 °C .

b) Si cuando se introduce el termómetro en un líquido la columna alcanza una altura de 25,4 cm. ¿Cuál es la temperatura del líquido?

Sol: 8,4 cm; 127 °C

36. Calcular la variación de longitud de un cable de latón ($\lambda = 2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) de 10 m cuando su temperatura pasa de 20 °C a 70 °C.

Sol: 1 cm

37. Un recipiente de cinc ($\lambda_{\text{Zn}} = 2,9 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) está lleno de glicerina a 100 °C, teniendo una capacidad de 10 L a esa temperatura. Si se enfría hasta 0 °C, calcular la el volumen de glicerina a 0 °C que hay que añadir para que dicho recipiente quede completamente lleno ($\alpha_{\text{glicerina}} = 5,3 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$)

Sol: 443 cm³

38. Un alambre de acero ($\lambda_{\text{acero}} = 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) mide 100 m de largo cuando la temperatura es de 30 °C. Encontrar su cambio de longitud si la temperatura baja a 5 °C.

Sol: 2,75 cm

39. Calcular la de longitud de un cable de cobre ($\lambda_{\text{Cu}} = 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) que mide 20 m a 20 °C cuando su temperatura pasa a 70 °C.

Sol: 20,02 m

40. Se ha medido la dilatación de una barra de metal de un metro de longitud a 0 °C, obteniéndose a 50 °C una dilatación de 0,07 cm. Determinar el coeficiente de dilatación lineal e indicar de qué metal podría tratarse.

Sol: $1,4 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ y será quizás oro

41. Cada riel de acero ($\lambda_{\text{acero}} = 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) de una vía de ferrocarril mide 15 m a 50 °F. Determinar la separación que debe dejarse entre dos rieles consecutivos para que no se deformen por efecto del calor, si la temperatura oscila entre invierno y verano de -4 ° a 42 °C.

Sol: 7,59 mm o mejor 5,28 mm

42. Calcular el volumen de una lata cilíndrica de hierro ($\lambda_{\text{Fe}} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) a 100 °C, si a 0 °C tiene 20 cm de diámetro y 70 cm de altura.

Sol: 22,07 dm³

43. Se tiene una chapa cuadrada de aluminio ($\lambda_{\text{Al}} = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) de 20 cm de lado a 30 °C ¿A qué temperatura la superficie será 34 mm² mayor?

Sol: 65,4 °C

44. Una esfera maciza de latón cuyo radio a 0 °C es de 5 cm se calienta hasta los 150 °C. Calcula su aumento de volumen sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal del latón es $\alpha = 19 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.

Sol: 0,44 cm³

45. Los tendidos eléctricos no tienen juntas que permitan su dilatación, por eso entre cada dos postes el tendido no va en línea recta, sino que el hilo forma una pequeña curva. Calcula la disminución de longitud de un cable de cobre ($\alpha = 1,67 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) que mide 100 km en verano a 35°C si en invierno la temperatura desciende a 0°C .

Sol: 58,45 m

Efectos del calor. Dilatación de gases

46. Un recipiente contiene 36 L de oxígeno a una presión de 3 atm ¿Cuál será su volumen si la presión aumenta a 27 atm.

Sol: 4 L

47. Calcular la densidad de 320 g del oxígeno a la temperatura de 27°C y a la presión de 4 atm.

Sol: 5,2 g/L

48. Representar en un gráfico de ejes cartesianos donde p sea el eje de ordenadas y V el de abscisas (diagrama pV) una evolución isobárica, otra isotérmica y otra isocora.

49. Un gas ocupa 1500 cm^3 a 22°C y una atmósfera de presión. Calcular el volumen que ocupará a: 47°C y 1 atm; 2°C y 6 atm; 62°C y 6 atm.

Sol: 1627 cm^3 ; $233,1 \text{ cm}^3$; $283,9 \text{ cm}^3$

50. En un recipiente se tienen 16,4 L de un gas ideal a 47°C y una presión de una atm. Si el gas se expande hasta ocupar un volumen de 22 L y la presión se reduce a 0,8 atm, determinar la temperatura final del sistema.

Sol: $70,4^\circ\text{C}$

51. A qué temperatura se debe calentar un gas que se encuentra en un frasco abierto, a 12°C para que salgan de él $\frac{3}{8}$ del aire que contiene.

Sol: $118,8^\circ\text{C}$

Efectos del calor. Cambios de estado

52. El calor latente de fusión del plomo es de $23,2 \text{ kJ/kg}$. De acuerdo con este dato, ¿qué cantidad de calor debemos suministrar para fundir 30 g de plomo? ¿Cuánto plomo podemos fundir aportando 2 kJ?

Sol: 696 J; 8,62 g

53. Calcular cuánto calor hay que suministrarle a 2,5 kg de hielo que se encuentran a 0°C para calentarlo hasta 50°C . Dato: $L_f = 3,33 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$

Sol: $1,35 \cdot 10^6 \text{ J}$

54. Un calorímetro que tiene un equivalente en agua de 50 g y contiene 650 g de agua a una temperatura de 20°C . Si se coloca en su interior 300 g de hielo a 0°C . Calcular cuál será el estado final de la mezcla.

Sol: Se fundirán 175 g de hielo

55. En un calorímetro (equivalente en agua = 20 g) que contiene 1180 g de agua a 25°C se colocan 100 g de vapor de agua a 100°C . Calcular la temperatura final del sistema. Dato: $L_v = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$

Sol: $72,3^\circ\text{C}$