

## EXAMEN DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 3º ESO

**EJERCICIO 1** La probabilidad de que un jugador de baloncesto enceste un tiro libre es del 90%. Si un jugador tira dos tiros libres, halla la probabilidad de que : *1.5 puntos*

- a) Enceste los dos      b) No enceste ninguno      c) Enceste exactamente uno

**EJERCICIO 2** En una clase de 30 alumnos, las  $\frac{3}{5}$  partes son chicas y la tercera parte aprueban todo en Junio. Se sabe además que la mitad de los chicos no aprueba en Junio. Halla la probabilidad de que un alumno elegido al azar: *2 puntos*

- a) Sea chica y apruebe todo    b) Sea chico y no apruebe todo    c) Sea chica sabiendo que aprueba todo    d) Apruebe todo sabiendo que es chico    e) No apruebe

**EJERCICIO 3** Una caja contiene 4 bolas rojas, 2 verdes y 1 negra. Se extraen simultáneamente dos bolas. Halla la probabilidad de que: a) Sean las dos negras b) Sean del mismo color c) Sean dos rojas y una negra. *1,5 puntos*


**EJERCICIO 4** Se ha calculado el índice de masa corporal de 200 personas y se han obtenido los siguientes resultados :

Intervalo	$f_i$						
[17,21)	13						
[21,25)	80						
[25,29)	75						
[29,33)	23						
[33,37)	9						
	200						

- a. Calcula la media y la desviación típica de la distribución  
 b. Calcula los cuartiles de la distribución gráficamente.  
 c. Si un IMC normal es el que se encuentra entre 20 y 25, halla gráficamente que porcentaje de personas

tienen un IMC normal.

- d. Si un IMC por debajo de 20 se asocia a desnutrición, halla de forma exacta, el tanto por ciento de personas desnutridas. *5 puntos*



## SOLUCIONES

EJERCICIO 1 Si  $E_1$ ="Encestar tiro 1" y  $E_2$  = "Encestar tiro 2",

a)  $P(\text{Encestar los 2}) = P(E_1 \text{ y } E_2) = 0'9 \times 0'9 = 0'81$

b)  $P(\text{No encestar ninguno}) = P(\overline{E_1} \text{ y } \overline{E_2}) = 0'1 \times 0'1 = 0'01$

c)  $P((E_1 \text{ y } \overline{E_2}) \text{ o } (\overline{E_1} \text{ y } E_2)) = 0'9 \times 0'1 + 0'1 \times 0'9 = 0'18$

EJERCICIO 2

	Chica	Chico	
Aprueba	4	6	10
No aprueba	14	6	20
	18	12	30

a)  $P(\text{chica y apruebe}) = 4/30$     b)  $P(\text{Chico y no apruebe}) = 6/30$

c)  $P(\text{chica si se sabe que aprueba}) = 4/10$

d)  $P(\text{apruebe si se sabe que es chico}) = 6/12$

e)  $P(\text{no apruebe}) = 20/30$

EJERCICIO 3 Sacar dos bolas a la vez = Sacar dos bolas, una tras otra, sin reemplazamiento

a)  $P(2 \text{ Negras}) = 0$  ( No hay dos bolas negras en la caja)

b)  $P(\text{Roja y roja o Verde y verde}) = \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} + \frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{14}{42}$

c)  $P(2 \text{ rojas y } 1 \text{ negra}) = 0$  porque se sacan dos bolas y no tres

EJERCICIO 4

Intervalo	$f_i$	$x_i$	$x_i f_i$	$X_i^2 f_i$	$fr_i$	$Fr_i$	
[17,21)	13	19	247	4693	6,5%	6,5%	
[21,25)	80	23	1840	42320	40%	46.5%	
[25,29)	75	27	2025	54675	37.5%	84%	
[29,33)	23	31	713	22103	11.5%	95.5%	
[33,37)	9	35	315	11025	4.5%	100%	
	200		5140	134816			

a)  $\bar{X} = \frac{5140}{200} = 25.7$      $\sigma = \sqrt{\frac{134816}{200} - 25.7^2} = \sqrt{13.59} = 3.69$

Los apartados b) c) y d) se basan en el histograma de frecuencias acumuladas que aparece a continuación :

b) Aproximadamente  $Q_1 = 23$  ,  $Q_2 = 26$  ,  $Q_3 = 28$

c)  $20 = C_5$  aproximadamente y  $25 = C_{46.5}$  luego el porcentaje de personas con IMC entre 20 y 25 está alrededor del  $46.5 - 5 = 41.5$  %

d) El IMC 20 corresponde al primer tramo de la poligonal que es una recta que pasa por los puntos (17,0) y por (21, 6.5). Su ecuación es :

$$y - 0 = \frac{6.5}{4}(x - 17)$$

Haciendo en la ecuación anterior  $x = 20$  :  $y = 5.875\%$

