

1º Calcula el límite de las siguientes funciones:

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{x^2 + x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4x + 4}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - x + 1}$

g) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4x + 4}$

i) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4}$

k) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 9}$

m) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\sqrt{9x^2 + 2x - 1} - (3x + 1) \right]$

o) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 - 3x + 1} - x$

q) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4}}$ (racionaliza)

s) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} (\sqrt{x+a} - \sqrt{x})$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x^2 - 5x + 6}$

f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x^2 + 2x - 8}$

h) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{3x - 3} - \frac{2 + 4x}{6}$

j) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\sqrt{x^2 + 3x - 1} - x \right]$

l) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{-4x^2 + 3x - 3}$

n) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 1}{3x - 3} - \frac{2 + 4x}{6}$

p) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a}$

r) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h}$

t) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{\sqrt{x} - 2}$

2º Calcula el dominio de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt{\frac{2x+4}{9-x^2}}$

c) $f(x) = \ln\left(\frac{x^2-4}{x+2}\right)$

e) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$

b) $f(x) = \sqrt{-x^2 + 5x - 6}$

d) $f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x-3}$

f) $f(x) = \sqrt{\frac{3x+6}{x^2-4}}$

3º Dadas $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ y $g(x) = \sqrt{x^2-3}$. Halla:

a) $f(g(x))$


b) $f^{-1}(x)$

4º Representa gráficamente las funciones:

a) $f(x) = |-x^2 + 6x|$

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \leq 2 \\ -x+3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

5º Dadas las funciones $f(x) = \sqrt{x-1}$ y $g(x) = x^2$. Calcula el dominio de $f(x)$. Calcula las funciones $f(g(x))$, $f(f(x))$ y $g(f(x))$.



6º Dadas las funciones: $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ y $g(x) = \frac{2x+1}{3x-2}$. Representálas y calcula $f(g(x))$ y $g^{-1}(x)$.

7º Representa las funciones $f(x) = -x^2 + 4x - 4$ $g(x) = |x^2 + 4x|$ $h(x) = \log \frac{1}{x}$

8º Representa gráficamente las funciones:

a) $f(x) = 2 \cdot 5^{-x}$ a partir de la gráfica de $f(x) = 5^x$

b) $f(x) = 3 + \log_2(x - 5)$ a partir de la gráfica de $f(x) = \log_2 x$

9º Un elemento radioactivo se desintegra en función del tiempo t , medido en segundos, según la expresión

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$N(t)$: número de átomos radioactivos en el instante t ;

N_0 : número de átomos radioactivos en el instante inicial $t=0$;

λ : constante de desintegración, que dependerá del elemento.

a) Halla el periodo de semidesintegración, T , definido como el intervalo de tiempo que ha de transcurrir para que el número inicial de átomos se reduzca a la mitad.

b) Calcula el periodo de semidesintegración del ${}^{90}_{38}\text{Sr}$, $\lambda = 7,8219 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$.

c) Una preparación radioactiva tiene una constante igual a $2,31 \cdot 10^{-3} \text{ h}^{-1}$ (h son horas). Calcula el tiempo que ha de transcurrir para que se desintegre un 60% de la masa inicial de la preparación.

10º En un determinado modelo de coche, el consumo de gasolina, para velocidades comprendidas entre 20 y 160 km/hora viene determinado por la función:

$$C(x) = 8 - 0,045x + 0,00025x^2$$

$C(x)$ viene expresado en litros consumidos cada 100 km. Calcula:

a) representa la gráfica de la función,

b) ¿cuántos litros cada 100 km consume a los 120 km/hora?

c) ¿A qué velocidad consume menos y cuántos consume?

d) ¿A qué velocidad se debe conducir para consumir 10 litros cada 100 km?

11º Las escalas de temperatura en grados Celsius (°C) y Fahrenheit (°F) se relacionan mediante la fórmula:

$$C(F) = \frac{5}{9}(F - 32),$$

a) ¿cuántos grados Celsius son 41 °F? ¿y 132 °F?

b) ¿cuántos grados Fahrenheit son 20 °C? ¿y 100 °C?

c) Halla la función que relaciona que permite cambiar de Celsius a Fahrenheit.

d) Representa ambas funciones mediante sus puntos de corte con los ejes.

(P) (a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{x^2 + x}$

• valor numérico

numerador: $(-1)^3 + 2 \cdot (-1)^2 - (-1) - 2 = -1 + 2 + 1 - 2 = 0$

denominador: $(-1)^2 + (-1) = 1 - 1 = 0$

} $\rightarrow \boxed{\left(\frac{0}{0}\right)}$

• se descomponen en factores primos tanto el numerador como el denominador de la fracción. Observa que -1 es una raíz de ambos polinomios. Aplicando la regla de Ruffini

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & 2 & -1 & -2 \\ & & -1 & -1 & 2 \\ \hline & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \rightarrow (x+1) \cdot (x^2 + x - 2)$$

El denominador es sencillo: factor común a x
 $x^2 + x = x \cdot (x+1)$.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1) \cdot (x^2 + x - 2)}{x \cdot (x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x - 2}{x}$$

• valor numérico

$$(-1)^2 + (-1) - 2 = +1 - 1 - 2 = -2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{x^2 + x} = \frac{-2}{-1} = \boxed{2}$$

M

$$\textcircled{b} \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} \cdot (\sqrt{x+a} - \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2+ax} - x = \boxed{(\infty - \infty)}$$

• se multiplica y divide por el conjugado

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+ax} - x) \cdot (\sqrt{x^2+ax} + x)}{\sqrt{x^2+ax} + x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+ax})^2 - x^2}{\sqrt{x^2+ax} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+ax - x^2}{\sqrt{x^2+ax} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax}{\sqrt{x^2+ax} + x} = \boxed{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}$$

• se divide cada término por la mayor potencia del denominador, en este caso es x .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{ax}{x}}{\frac{\sqrt{x^2+ax}}{x} + \frac{x}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{\sqrt{1+\frac{a}{x}} + 1} = \frac{a}{1+1} = \boxed{\frac{a}{2}}$$

\textcircled{c} Valor numérico.

$$\left. \begin{aligned} 2^2 - 2 - 2 &= 4 - 2 - 2 = 0 \\ 2^2 - 4 \cdot 2 + 4 &= 4 - 8 + 4 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4x + 4} = \boxed{\left(\frac{0}{0}\right)}$$

• se factoriza mediante la regla de Ruffini observando que 2 es una raíz del numerador y del denominador.

$$\begin{array}{r|rrr} 2 & 1 & -1 & -2 \\ & & 2 & 2 \\ \hline & 1 & 1 & 0 \end{array} \rightarrow (x-2) \cdot (x+1) \quad \begin{array}{r|rrr} 2 & 1 & -4 & 4 \\ & & 2 & -4 \\ \hline & 1 & -2 & 0 \end{array} \rightarrow (x-2) \cdot (x-2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2) \cdot (x+1)}{(x-2) \cdot (x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{x-2} = \boxed{\left(\frac{3}{0}\right)}$$

M

• Se calculan los límites laterales.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2^+ \\ x > 2}} \frac{x+1}{x-2} = \left(\frac{3}{0^+} \right) = +\infty$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2^- \\ x < 2}} \frac{x+1}{x-2} = \left(\frac{3}{0^-} \right) = -\infty$$

como son diferentes \Rightarrow

no tiene límite.

d) Valor numérico en $x=2$

$$\begin{aligned} 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 2 + 6 &= 8 - 16 + 2 + 8 = 0 \\ 2^2 - 5 \cdot 2 + 6 &= 4 - 10 + 6 = 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x^2 - 5x + 6} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

• se descomponen numerador y denominador; observa que 2 es una raíz de ambos polinomios. Empleando la regla de Ruffini

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -4 & 1 & 6 \\ & & 2 & -4 & -6 \\ \hline & 1 & -2 & -3 & 0 \end{array} \rightarrow (x-2) \cdot (x^2 - 2x - 3)$$

$$\begin{array}{r|rrr} 2 & 1 & -5 & 6 \\ & & 2 & -6 \\ \hline & 1 & -3 & 0 \end{array} \rightarrow (x-2) \cdot (x-3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2) \cdot (x^2 - 2x - 3)}{(x-2) \cdot (x-3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x - 3}{x-3} = \frac{-3}{-1} = \boxed{3}$$

• valor numérico en $x=2$

$$2^2 - 2 \cdot 2 - 3 = 4 - 4 - 3 = -3 ; 2 - 3 = -1$$

M

$$\textcircled{c} \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{x^2-x+1} = \boxed{(\infty - \infty)}$$

• se multiplica y divide por el conjugado

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{x^2-x+1}) \cdot (\sqrt{x^2+x+1} + \sqrt{x^2-x+1})}{\sqrt{x^2+x+1} + \sqrt{x^2-x+1}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+x+1})^2 - (\sqrt{x^2-x+1})^2}{\sqrt{x^2+x+1} + \sqrt{x^2-x+1}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x+1 - (x^2-x+1)}{\sqrt{x^2+x+1} + \sqrt{x^2-x+1}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x+1 - x^2+x-1}{\sqrt{x^2+x+1} + \sqrt{x^2-x+1}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+x+1} + \sqrt{x^2-x+1}} = \boxed{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}$$

• se divide cada término por la mayor potencia del denominador: $\sqrt{x^2} = \boxed{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{x}}{\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x} + \frac{\sqrt{x^2-x+1}}{x}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} + \sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}} = \frac{2}{1+1} = \boxed{1}$$

f) Valor numérico en $x=2$

$$\left. \begin{aligned} 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 2 + 6 &= 8 - 16 + 2 + 6 = 0 \\ 2^2 + 2 \cdot 2 - 8 &= 4 + 4 - 8 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x^2 + 2x - 8} = \boxed{\frac{0}{0}}$$

• se descompone tanto el numerador como el denominador. Observa que 2 es una raíz de ambos polinomios. Empleando la regla de Ruffini

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -4 & 1 & 6 \\ & & 2 & -4 & -6 \\ \hline & 1 & -2 & -3 & 0 \end{array} \rightarrow (x-2) \cdot (x^2 - 2x - 3)$$

$$\begin{array}{r|rrr} 2 & 1 & 2 & -8 \\ & & 2 & +8 \\ \hline & 1 & 4 & 0 \end{array} \rightarrow (x-2) \cdot (x+4)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2) \cdot (x^2 - 2x - 3)}{(x-2) \cdot (x+4)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x - 3}{x+4} = \frac{-3}{6} = \boxed{\frac{-1}{2}}$$

• Valor numérico en $x=2$

$$\left. \begin{aligned} 2^2 - 2 \cdot 2 - 3 &= 4 - 4 - 3 = -3 \\ 2 + 4 &= 6 \end{aligned} \right\} \cdot$$

g) • Valor numérico en $x=-2$

$$\left. \begin{aligned} (-2)^2 - (-2) - 2 &= 4 + 2 - 2 = 4 \\ (-2)^2 - 4 \cdot (-2) + 4 &= 4 + 8 + 4 = 16 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4x + 4} = \frac{4}{16} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

M

$$\textcircled{h} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{3x-3} - \frac{2+4x}{6} = \boxed{(\infty - \infty)}$$

• observa que es una diferencia de fracciones algebraicas

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{3x-3} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x^2+1}{x}}{\frac{3x-3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + \frac{1}{x}}{3 - \frac{3}{x}} = \frac{\infty}{3} = \boxed{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+4x}{6} = \frac{\infty}{6} = \boxed{\infty}$$

• para resolver la indeterminación efectuamos la diferencia de ambos miembros.

$$\frac{2x^2+1}{3x-3} - \frac{2+4x}{6} = \frac{(2x^2+1) \cdot 6}{(3x-3) \cdot 6} - \frac{(2+4x) \cdot (3x-3)}{6 \cdot (3x-3)}$$

$$= \frac{12x^2 + 6 - (6x - 6 + 12x^2 - 12x)}{6 \cdot (3x-3)} =$$

$$= \frac{12x^2 + 6 - 6x + 6 - 12x^2 + 12x}{18x - 18}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12+6x}{18x-18} = \boxed{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}$$

• se divide por la mayor potencia del denominador: \boxed{x}

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{12+6x}{x}}{\frac{18x-18}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{12}{x} + 6}{18 - \frac{18}{x}} = \frac{6}{18} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

(i) • valor numérico en $x = -2$

$$\left. \begin{aligned} (-2)^2 + 5 \cdot (-2) + 6 &= 4 - 10 + 6 = 0 \\ (-2)^2 - 4 &= 4 - 4 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 4} = \boxed{\frac{0}{0}}$$

• se descomponen tanto el numerador como el denominador en factores primos. Observa que $x = -2$ es una raíz de ambos polinomios. Se emplea la regla de Ruffini

$$\begin{array}{r|rrr} -2 & 1 & 5 & 6 \\ & & -2 & -6 \\ \hline & 1 & 3 & 0 \end{array} \Rightarrow (x+2) \cdot (x+3)$$

$$\begin{array}{r|rrr} -2 & 1 & 0 & -4 \\ & & -2 & 4 \\ \hline & 1 & -2 & 0 \end{array} \Rightarrow (x+2) \cdot (x-2)$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2) \cdot (x+3)}{(x+2) \cdot (x-2)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+3}{x-2} = \frac{-2+3}{-2-2} = \boxed{\frac{1}{-4}}$$

observa que $(x^2 - 4)$ se podría haber descompuesto como una identidad notable

$$x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$$

$$a^2 - b^2 = (a+b) \cdot (a-b)$$

M

$$j) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 3x - 1} - x = \boxed{(\infty - \infty)}$$

• se multiplica y divide por el conjugado.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 3x - 1} - x) \cdot (\sqrt{x^2 + 3x - 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 3x - 1} + x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 3x - 1})^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x - 1} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 3x - 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x - 1} + x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x - 1}{\sqrt{x^2 + 3x - 1} + x} = \boxed{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}$$

• se dividen todos los términos por la mayor potencia del denominador. $\sqrt{x^2} = \boxed{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x-1}{x}}{\frac{\sqrt{x^2+3x-1}}{x} + \frac{x}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}} + 1} = \frac{3}{1+1} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

k) Valor numérico en $x = 3$

$$3^2 - 6 \cdot 3 + 9 = 9 - 18 + 9 = 0 ; 3^2 - 9 = 9 - 9 = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 9} = \boxed{\frac{0}{0}}$$

Se factorizan el numerador y el denominador

$$\begin{array}{r|rrr} 3 & 1 & -6 & 9 \\ & & 3 & -9 \\ \hline & 1 & -3 & 0 \end{array} \rightarrow (x-3) \cdot (x-3) \quad \text{y} \quad x^2 - 9 = (x+3) \cdot (x-3)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3) \cdot (x-3)}{(x+3) \cdot (x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x+3} = \frac{3-3}{3+3} = \boxed{0}$$

$$\textcircled{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{-4x^2 + 3x - 3} = \boxed{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}$$

• se divide por la mayor potencia del denominador : x^2

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{3x^2 - 2x + 1}{x^2}}{\frac{-4x^2 + 3x - 3}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{-4 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2}} = \frac{3}{-4} = \boxed{-\frac{3}{4}}$$

$$\textcircled{m} \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{9x^2 + 2x - 1} - (3x + 1) = \boxed{(\infty - \infty)}$$

• se multiplica y divide por el conjugado.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[\sqrt{9x^2 + 2x - 1} - (3x + 1)] \cdot [\sqrt{9x^2 + 2x - 1} + (3x + 1)]}{\sqrt{9x^2 + 2x - 1} + (3x + 1)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{9x^2 + 2x - 1})^2 - (3x + 1)^2}{\sqrt{9x^2 + 2x - 1} + (3x + 1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^2 + 2x - 1 - (9x^2 + 6x + 1)}{\sqrt{9x^2 + 2x - 1} + (3x + 1)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^2 + 2x - 1 - 9x^2 - 6x - 1}{\sqrt{9x^2 + 2x - 1} + (3x + 1)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x - 2}{\sqrt{9x^2 + 2x - 1} + (3x + 1)} = \boxed{\left(\frac{-\infty}{\infty}\right)}$$

• se divide por la mayor potencia del denominador : x

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-4x - 2}{x}}{\frac{\sqrt{9x^2 + 2x - 1}}{x} + \frac{3x + 1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4 - \frac{2}{x}}{\sqrt{9 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}} + 3 + \frac{1}{x}} = \frac{-4}{\sqrt{9 + 3}} = \boxed{-\frac{2}{3}}$$

$$\textcircled{v} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2+1}{3x-3} - \frac{2+4x}{6} = -\infty - (-\infty) = -\infty + \infty = \boxed{(\infty - \infty)}$$

• Observa.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2+1}{3x-3} = \left(\frac{\infty}{-\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2x^2+1}{x}}{\frac{3x-3}{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \frac{1}{x}}{3 - \frac{2}{x}} = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2+4x}{6} = \frac{-\infty}{6} = -\infty$$

• Se efectúa la diferencia de las fracciones

$$\frac{2x^2+1}{3x-3} - \frac{2+4x}{6} = \frac{(2x^2+1) \cdot 6}{(3x-3) \cdot 6} - \frac{(2+4x) \cdot (3x-3)}{6 \cdot (3x-3)} =$$

$$= \frac{(2x^2+1) \cdot 6 - (2+4x) \cdot (3x-3)}{6 \cdot (3x-3)} = \frac{12x^2+6 - (6x-6+12x^2-12x)}{18x-18}$$

$$= \frac{12x^2+6-6x+6-12x^2+12x}{18x-18} \rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{12+6x}{18x-18} = \left(\frac{-\infty}{-\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{12+6x}{x}}{\frac{18x-18}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{12}{x} + 6}{18 - \frac{18}{x}} = \frac{6}{18} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

$$\textcircled{O} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 3x + 1} - x = \infty - (-\infty) = \boxed{\infty}.$$

$$\textcircled{P} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \left(\frac{0}{0}\right) \quad (\text{al calcular los valores numéricos: } \begin{matrix} \sqrt{a} - \sqrt{a} = 0 \\ a - a = 0. \end{matrix})$$

• se multiplica y divide por el conjugado.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{a}) \cdot (\sqrt{x} + \sqrt{a})}{(x - a) \cdot (\sqrt{x} + \sqrt{a})} =$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{a})^2}{(x - a) \cdot (\sqrt{x} + \sqrt{a})} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{(x - a) \cdot (\sqrt{x} + \sqrt{a})} =$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} = \boxed{\frac{1}{2\sqrt{a}}} = \frac{1}{2\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \boxed{\frac{\sqrt{a}}{2a}}.$$

$$\textcircled{Q} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4}} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2) \cdot \sqrt{x^2 - 4}}{\sqrt{x^2 - 4} \cdot \sqrt{x^2 - 4}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2) \cdot \sqrt{x^2 - 4}}{x^2 - 4} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

[descomponiendo $x^2 - 4 = (x + 2) \cdot (x - 2)$].

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2) \cdot \sqrt{x^2 - 4}}{(x + 2) \cdot (x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x + 2} = \frac{0}{4} = \boxed{0}$$

$$\textcircled{R} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h + h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (4 + h) = \boxed{4}$$

$$\textcircled{5} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} = \left(\frac{0}{0} \right)$$


Se calculan los límites laterales.

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0^+ \\ h > 0}} \frac{|h|}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0^+ \\ h > 0}} \frac{h}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0^+ \\ h > 0}} 1 = 1.$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0^- \\ h < 0}} \frac{|h|}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0^- \\ h < 0}} \frac{-h}{h} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0^- \\ h < 0}} (-1) = -1.$$

$\boxed{\neq} \Rightarrow$ no tiene

La gráfica de $f(x) = \frac{|x|}{x}$ es



$$\textcircled{6} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{\sqrt{x} - 2} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

Valor numérico: $4^2 - 16 = 0$
 $\sqrt{4} - 2 = 0$.


• se multiplica y divide por el conjugado.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x^2 - 16) \cdot (\sqrt{x} + 2)}{(\sqrt{x} - 2) \cdot (\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x^2 - 16) \cdot (\sqrt{x} + 2)}{(\sqrt{x})^2 - 2^2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x^2 - 16) \cdot (\sqrt{x} + 2)}{x - 4} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

Factorizando $(x^2 - 16)$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x+4) \cdot (x-4) \cdot (\sqrt{x} + 2)}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4} (x+4) \cdot (\sqrt{x} + 2) = 8 \cdot 4 = \boxed{32}$$



2. a) $f(x) = \sqrt{\frac{2x+4}{9-x^2}}$

$$\text{Dom } f(x) = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{2x+4}{9-x^2} \geq 0 \right\}$$

El problema se reduce a resolver una inecuación.

- Buscamos los factores y raíces del numerador y denominador

$$(2x+4) = 2 \cdot (x+2) \rightarrow \text{raíz } -2$$

$$9-x^2 = (3-x) \cdot (3+x) \rightarrow \text{raíces } 3 \text{ y } -3.$$


- Tabla de signos. (*)

	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, -2)$	-2	$(-2, 3)$	3	$(3, \infty)$
$(x+2)$	-	-1	-	0	+	5	+
$(3-x)$	+	6	+	5	+	0	-
$(3+x)$	-	0	+	1	+	6	+
$\frac{2x+4}{9-x^2}$	+	no existe	-	0	+	no existe	-


Solución:

$$\text{Dom } f(x) = (-\infty, -3) \cup [-2, 3)$$

- (*) Observación: si colocas en el eje real es muy sencillo establecer



¡Cuidado con el factor $(3-x)$!



(b) $f(x) = \sqrt{-x^2 + 5x - 6}$

$$\text{Dom } f(x) = \{ x \in \mathbb{R} : -x^2 + 5x - 6 \geq 0 \}$$

El problema se reduce a resolver una ecuación.

$$-x^2 + 5x - 6 \geq 0 \Leftrightarrow (*)$$

$$\boxed{x^2 - 5x + 6 \leq 0}$$

• Factorización:

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{cases} 3 \\ 2 \end{cases}$$

$$(x-3) \cdot (x-2) \leq 0.$$


• Tabla de signos

	$(-\infty, 2)$	2	$(2, 3)$	3	$(3, \infty)$
$(x-2)$	-	0	+	+	+
$(x-3)$	-	-	-	0	+
$x^2 - 5x + 6$	+	0	-	0	+

Solución:

$$\text{Dom } f(x) = [2, 3].$$

(*) Observación: siempre es más sencillo trabajar con el coeficiente de mayor grado positivo. Se suelen cometer menos errores.



c) $f(x) = \ln\left(\frac{x^2-4}{x+2}\right)$

$$\text{Dom } f(x) = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{x^2-4}{x+2} > 0 \right\}$$

Se puede simplificar la fracción algebraica $\frac{x^2-4}{x+2} = \frac{(x+2) \cdot (x-2)}{x+2}$.

$$f(x) = \ln(x-2)$$

$$\text{Dom } f(x) = \left\{ x \in \mathbb{R} : x-2 > 0 \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R} : x > 2 \right\} = (2, \infty).$$

d) $f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x-3}$

$$\text{Dom } f(x) = \left\{ x \in \mathbb{R} : 9-x^2 \geq 0 \right\} \cap \left\{ x \in \mathbb{R} : x-3 \neq 0 \right\}. (*)$$

$$9-x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2-9 \leq 0 \Leftrightarrow \boxed{(x+3) \cdot (x-3) \leq 0}$$


	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 3)$	3	$(3, \infty)$
$x+3$	-	0	+	6	+
$x-3$	-	-6	-	0	+
x^2-9	+	0	-	0	+

Solución $[-3, 3]$.

Hemos de eliminar el valor $x=3$ (amplia al denominador)

$$\Rightarrow \text{Dom } f(x) = [-3, 3)$$

(*) Es la intersección porque debe existir el numerador "y" el denominador. Deben ser los valores de x comunes de ambas partes de la función.



e) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$

$\text{Dom } f(x) = \{x \in \mathbb{R} : 4-x^2 > 0\}$

$4-x^2 > 0 \Leftrightarrow x^2-4 < 0 \Leftrightarrow (x+2) \cdot (x-2) < 0$

↑ identidad notable $a^2-b^2 = (a+b) \cdot (a-b)$.

• Tabla de signos

	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, \infty)$
$(x+2)$	-	0	+	+	+
$(x-2)$	-	-	-	0	+
x^2-4	+	0	-	0	+

Solución: $\text{Dom } f(x) = (-2, 2)$

f) $f(x) = \sqrt{\frac{3x+6}{x^2-4}} = \sqrt{\frac{3(x+2)}{(x+2)(x-2)}} = \sqrt{\frac{3}{x-2}} \quad (*)$

$\text{Dom } f(x) = \{x \in \mathbb{R} : x-2 > 0\} = (2, \infty)$.

Observación: $\frac{3 \cdot (x+2)}{(x+2) \cdot (x-2)} = \frac{3}{x-2}$

se puede simplificar, $\frac{x+2}{x+2} = 1$, porque $x \neq -2$.

3.

$$(a) f(g(x)) = f(\sqrt{x^2-3}) = \frac{\sqrt{x^2-3} + 1}{\sqrt{x^2-3} - 1}$$

(b) Una función tiene inversa si es inyectiva.

$$\bullet f(a) = f(b) \rightarrow \frac{a+1}{a-1} = \frac{b+1}{b-1} \Leftrightarrow (a+1) \cdot (b-1) = (a-1) \cdot (b+1)$$

$$\Leftrightarrow a \cdot b - a + b - 1 = a \cdot b + a - b - 1 \Leftrightarrow -a + b = a - b$$

$$\Leftrightarrow 2b = 2a \Leftrightarrow \boxed{b = a} \text{ . no es inyectiva.}$$

• cálculo de la inversa

$$y = \frac{x+1}{x-1} \quad y = f(x)$$

$$x = \frac{y+1}{y-1} \quad y = f^{-1}(x)$$

$$x \cdot (y-1) = (y+1) \Leftrightarrow x \cdot y - x = y + 1 \Leftrightarrow$$


$$x \cdot y - y = 1 + x \Leftrightarrow y \cdot (x-1) = 1 + x \Rightarrow$$

$$y = \frac{1+x}{x-1} \Leftrightarrow \boxed{f^{-1}(x) = \frac{1+x}{x-1}}$$

Observación: esto no es necesario para el problema. Vamos a comprobar la solución.

$$(f \circ f^{-1})(x) = f[f^{-1}(x)] = \frac{\frac{1+x}{x-1} + 1}{\frac{1+x}{x-1} - 1} = \frac{\frac{1+x+x-1}{x-1}}{\frac{1+x-x+1}{x-1}} = \frac{2x}{2} = x \bullet$$

$$\boxed{\text{Observa } f = f^{-1}}$$



④

• Recuerda cómo se representa una parábola incompleta.

$$y = ax^2 + bx$$

1) ramas: $a > 0$ \square positivas, $a < 0$ \square negativas.



2) raíces: $y = 0 \rightarrow ax^2 + bx = 0 \rightarrow x_1 = 0 \quad x_2 = -\frac{b}{a}$.

3) eje de simetría y vértice: $x = -\frac{b}{2a} \quad V = \left(-\frac{b}{2a}, y\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$.

• Recuerda cómo se representa $|f(x)|$ si conocemos $f(x)$.

- la parte positiva es la misma.

- la parte negativa (por debajo del eje Ox) \rightarrow la opuesta:



① $f(x) = |-x^2 + 6x|$.

• $y = -x^2 + 6x$.

$a = -1$ ramas negativas. \wedge

raíces $-x^2 + 6x = 0 \rightarrow x \cdot (-x + 6) = 0$

$\rightarrow x_1 = 0 \quad x_2 = 6 \rightarrow$ puntos de corte



$\underbrace{(0,0)}_A$ y $\underbrace{(6,0)}_S$

eje de simetría: $x_v = 3$


vértice $V = (3, y(3)) = (3, 9)$

$y(3) = -3^2 + 6 \cdot 3 = 9$

Con los puntos A, S y V se pueden dibujar tanto $-x^2 + 6x$ como $|-x^2 + 6x|$.



$$f(x) = -x^2 + 6x$$



$$f(x) = |-x^2 + 6x|$$

ⓑ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \leq 2 \\ -x+3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$


$y = \frac{1}{x}$ es la hipérbola equilátera.


$y = -x + 3$ es una recta.

De la recta calculamos 2 puntos. Uno de ellos será siempre el punto frontera.

x	y
2	1
3	0

También se calcula el valor frontera de la hipérbola $\frac{x}{y} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 0,5$.





7º

$$f(x) = -x^2 + 4x - 4$$

Ramas $a = -1 < 0$ negativas.

Un punto y m simétrico

	x	y
A	0	-4
S	4	-4


$$-x^2 + 4x - 4 = -4 \Leftrightarrow -x^2 + 4x = 0$$

$$\Leftrightarrow x \cdot (-x + 4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 & A = (0, f(0)) \\ x_2 = 4 & S = (4, f(4)) \end{cases}$$

Vértice y eje de simetría.

	x	y
V	2	f(2)

$$f(2) = -2^2 + 4 \cdot 2 - 4 = -4 + 8 - 4 = 0 \Rightarrow V = (2, 0)$$



$$g(x) = |x^2 + 4x|$$


Primero se representará $y = x^2 + 4x$

Ramas $a = 1 > 0$

Un punto y m simétrico



	x	y
A	0	0
S	-4	0

$$x^2 + 4x = 0$$



Vértice y eje de simetría



$$V \begin{array}{c|c} x & y \\ \hline -2 & f(-2) \end{array} \quad f(-2) = (-2)^2 + 4 \cdot (-2) = 4 - 8 = -4. \Rightarrow V = (-2, -4)$$



$$h(x) = \log \frac{1}{x}$$

$$\log \frac{1}{x} = \log 1 - \log x = -\log x$$

$\Rightarrow h(x)$ es la OPUESTA de la función $f(x) = \log x$.



9º

a) $N(T) = \frac{N_0}{2}$ condición: al cabo de un tiempo T el número de átomos es la mitad de los iniciales.

$$N(T) = N_0 \cdot e^{-\lambda T} = \frac{N_0}{2} \quad \text{ec. exponencial.}$$

$$\Leftrightarrow e^{-\lambda T} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \ln e^{-\lambda T} = \ln \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\lambda T = -\ln 2$$

$$\Leftrightarrow \lambda T = \ln 2 \Rightarrow T = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

b) si $\lambda = 7,8219 \cdot 10^{-10} \Rightarrow T = \frac{\ln 2}{7,8219 \cdot 10^{-10}} \approx 8,8612 \cdot 10^8$ segundos

c) para este caso $\lambda = 2,31 \cdot 10^{-3} \text{ h}^{-1}$.

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

Sea T el tiempo pedido. Para $t = T$ el número de átomos es el 60% de los iniciales, es decir,

$$N(T) = 0,60 \cdot N_0$$

$$\Rightarrow 0,60 \cdot N_0 = N_0 \cdot e^{-\lambda T} \quad \text{ecuación a resolver.} \Leftrightarrow$$

$$e^{-\lambda T} = 0,60 \Leftrightarrow \ln e^{-\lambda T} = \ln 0,60 \Leftrightarrow$$

$$-\lambda T = \ln 0,60 \Rightarrow T = \frac{\ln 0,60}{-\lambda} = -\frac{\ln 0,60}{2,31 \cdot 10^{-3}}$$

$$T \approx 221,14 \text{ horas}$$

10° (a) Se trata de una parábola

Ramas : $a = 0,00025 > 0$ POSITIVAS

Vértice y eje de simetría.

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-0,045)}{2 \cdot 0,00025} = 90. \rightarrow \boxed{V = (90, C(90)) = (90, 5,975)}$$

$$C(90) = 8 - 0,045 \cdot 90 + 0,00025 \cdot 90^2 = 5,975$$

Puntos de corte con los ejes

Eje Y: $x=0 \rightarrow y=8. \rightarrow \boxed{A = (0,8)}$


Eje X: $y=0 \rightarrow 0,00025x^2 - 0,045x + 8 = 0 \rightarrow$

$$x = \frac{0,045 \pm \sqrt{0,045^2 - 4 \cdot 0,00025 \cdot 8}}{2 \cdot 0,00025} = \text{no tiene.}$$

Punto simétrico de A: $y=8 \rightarrow 0,00025x^2 - 0,045x + 8 = 8 \Leftrightarrow$

$$0,00025x^2 - 0,045x = 0 \Leftrightarrow x \cdot (0,00025x - 0,045) = 0 \Rightarrow$$

$$x_1 = 0 (A) \text{ y } x_2 = 180 (S) : \boxed{S = (180,8)}$$



(b) $x=120 \rightarrow C(120) = 8 - 0,045 \cdot 120 + 0,00025 \cdot 120^2 = 6,2$ litros.

(c) Corresponde al mínimo de la función: vértice
 velocidad 90 km/hora
 consumo 5,975 litros/100 km.

(d) $C(x) = 10 \Leftrightarrow$

$$\boxed{8 - 0,045x + 0,00025x^2 = 10} \Leftrightarrow$$

Ecuación de 2º grado

$$0,00025x^2 - 0,045x - 2 = 0$$

$$x = \frac{0,045 \pm \sqrt{0,045^2 - 4 \cdot 0,00025 \cdot (-2)}}{2 \cdot 0,00025} = \frac{0,045 \pm 0,063}{0,0005}$$

Se obtienen 2 soluciones:

⊕ $x_1 = 126$ Km/hora

⊖ $x_2 = -36$ km/hora (no tiene sentido).

Solución: 126 km/hora.

11º Con la simbología habitual

$C = y$ (grados celsius)

$F = x$ (grados fahrenheit)

$$C = \frac{5}{9}(F - 32) \Leftrightarrow \boxed{y = \frac{5}{9}(x - 32)}$$

a) si $x = 41^\circ F \rightarrow y = \frac{5}{9}(41 - 32) = 5^\circ C$

si $x = 132^\circ F \rightarrow y = \frac{5}{9}(132 - 32) = 55,6^\circ C$

b) si $y = 20^\circ C \rightarrow 20 = \frac{5}{9}(x - 32) \Rightarrow x = \frac{20 \cdot 9}{5} + 32 = 68^\circ F.$

si $y = 100^\circ C \rightarrow 100 = \frac{5}{9}(x - 32) \Rightarrow x = \frac{9 \cdot 100}{5} + 32 = 212^\circ F.$

c) se trata de hallar la función inversa de $y (= f(x))$.

• ¿es inyectiva? Si por ser una función lineal.

$$f(b) = f(a) \Rightarrow \frac{5}{9}(b - 32) = \frac{5}{9}(a - 32) \Leftrightarrow \frac{5b}{9} - \frac{5 \cdot 32}{9} = \frac{5a}{9} - \frac{5 \cdot 32}{9}$$

$$\Leftrightarrow \frac{5b}{9} = \frac{5a}{9} \Rightarrow b = a.$$

• $x = \frac{5}{9}(y - 32)$ $y = f^{-1}(x)$

$$\Rightarrow \frac{9x}{5} = y - 32 \Rightarrow y = \frac{9x}{5} + 32 \Rightarrow \boxed{f^{-1}(x) = \frac{9}{5}x + 32}$$

d)

$y = \frac{5}{9}(x - 32)$ de Fahrenheit a Celsius


Eje X: $y = 0 \rightarrow x = 32$ A(32, 0)

Eje Y: $x = 0 \rightarrow y = -18$ B(0, -18)

$y = \frac{9}{5}x + 32$ de Celsius a Fahrenheit.

Eje X: $y = 0 \rightarrow x = -18$ C(-18, 0)

Eje Y: $x = 0 \rightarrow y = 32$ D(0, 32)



5° $f(x) = \sqrt{x-1}$

$\text{Dom } f(x) = \{x \in \mathbb{R} : x-1 \geq 0\} = [1, \infty)$

$x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1 \rightarrow [1, \infty)$

• $f[g(x)] = \sqrt{g(x)-1} = \sqrt{x^2-1}$

• $f[f(x)] = \sqrt{f(x)-1} = \sqrt{\sqrt{x-1}-1}$

• $g[f(x)] = (\sqrt{x-1})^2 = x-1$

6° Representación gráfica.

• PARÁBOLA. $y = 3x^2 - 4x + 1$.

Ramas $a = 3 > 0$ positivas \cup


Dos puntos:


	x	y
A	0	1
S'	4/3	1

$3x^2 - 4x + 1 = 1 \rightarrow 3x^2 - 4x = 0 \rightarrow x \cdot (3x - 4) = 0$
 $\Rightarrow x_1 = 0 (A) \quad x_2 = \frac{4}{3} (S')$

Vértice y eje de simetría.

$x_v = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \rightarrow f\left(\frac{2}{3}\right) = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right) + 1 = -\frac{1}{3}$. $V = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$.





Departamento de Matemáticas

• HIPÉRBOLA $y = \frac{2x+1}{3x-2}$

Se efectúa la división

$$\begin{array}{r} 2x+1 \\ -2x+\frac{4}{3} \\ \hline \frac{5}{3} \end{array} \quad \frac{3x-2}{\frac{2}{3}} \Rightarrow \frac{2x+1}{3x-2} = \frac{2}{3} + \frac{\frac{5}{3}}{3x-2}$$

asíntotas


vertical $x = \frac{2}{3}$ ($3x-2=0$)

horizontal $y = \frac{2}{3}$. ($\frac{2}{3} + \frac{k}{x-a}$) $k = \frac{5}{3} > 0 \rightarrow 1^{er}$ y 3^{er} cuadrante.

Puntos de corte con los ejes.


Eje X: $y = 0 \rightarrow 2x+1=0 \rightarrow x = -\frac{1}{2}$ A(-1/2, 0)

Eje Y: $x = 0 \rightarrow y = -\frac{1}{2} \rightarrow B(0, -1/2)$.



• COMPOSICIÓN.

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= 3 \left(\frac{2x+1}{3x-2} \right)^2 - 4 \cdot \left(\frac{2x+1}{3x-2} \right) + 1 = \\ &= \frac{3(2x+1)^2 - 4 \cdot (2x+1) \cdot (3x-2) + (3x-2)^2}{(3x-2)^2} \\ &= \frac{-3x^2 + 4x + 15}{9x^2 - 12x + 4} \end{aligned}$$



• FUNCIÓN INVERSA

Ⓐ $g(x)$ es inyectiva

$$g(b) = g(a) \rightarrow \frac{2b+1}{3b-2} = \frac{2a+1}{3a-2} \Leftrightarrow$$

$$(2b+1) \cdot (3a-2) = (3b-2) \cdot (2a+1) \Leftrightarrow$$

$$\underbrace{6ab} - 4b + 3a - 2 = \underbrace{6ab} + 3b - 4a - 2 \Leftrightarrow$$

$$7b = 7a \Rightarrow b = a \Rightarrow \text{es inyectiva} \Rightarrow \text{SI TIENE INVERSA.}$$

Ⓑ cálculo de la función inversa.

$$y = \frac{2x+1}{3x-2} \quad y = g(x)$$

$$x = \frac{2y+1}{3y-2} \quad y = g^{-1}(x).$$

(re despeje y de la última igualdad)

$$(3y-2) \cdot x = 2y+1 \Leftrightarrow$$

$$3yx - 2x = 2y+1 \Leftrightarrow$$

$$3yx - 2y = 2x+1 \Leftrightarrow$$

$$y \cdot (3x-2) = 2x+1 \Rightarrow y = \frac{2x+1}{3x-2} \Rightarrow \boxed{g^{-1}(x) = \frac{2x+1}{3x-2}}$$