

---

## EXAMEN FINAL

---

### 1ª EVALUACIÓN:

- Dado  $\alpha \in 4^\circ$  cuadrante tal que  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{11}}{6}$ , hallar:
  - sen  $2\alpha$  mediante identidades trigonométricas (resultados racionalizados; no vale utilizar decimales)
  - cos  $\alpha/2$
  - tg  $(\alpha+135^\circ)$
  - sen  $(\alpha-3570^\circ)$
  - Obtener  $\alpha$  con la calculadora.
- Resolver el triángulo de datos  $A=40^\circ$ ,  $b=7m$ ,  $c=10m$
  - Hallar su área.
- Una antena de radio es vista por dos observadores separados entre sí 150 m. Ambos observadores y la antena están alineados. Los ángulos que las visuales forman con el suelo son  $75^\circ$  y  $55^\circ$ . Calcular las distancias de cada observador a la antena y la altura de ésta.
- Desarrollar y simplificar al máximo:  $\left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^5$
  - Comprobar el resultado.



### 2ª EVALUACIÓN:

- Dados  $\vec{u} = (3,1)$ ,  $\vec{v} = (a,-1/2)$  y  $\vec{w} = (-3,2)$ , se pide:
  - Hallar  $a$  para que  $\vec{v}$  sea unitario. Comprobar gráficamente el resultado.
  - Hallar  $a$  para que  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  sean  $\parallel$ . Justificar gráficamente la solución obtenida.
  - Hallar  $a$  para que  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  sean  $\perp$ . Justificar gráficamente la solución obtenida.
  - Hallar un vector  $\perp$  a  $\vec{u}$  y unitario.
  - Hallar el ángulo que forman  $\vec{u}$  y  $\vec{w}$
- Dadas las rectas  $r: 2x-3y+5=0$  y  $s: y=2x-1$ 
  - Hallar la ecuación de la recta  $r' \parallel$  a  $r$  que pasa por  $P(-3,2)$ , expresándola en todas las formas conocidas.
  - Hallar la ecuación de la recta  $\perp$  a  $s$  que pasa por el origen, en forma general.
  - Hallar el ángulo que forman  $r$  y  $s$
  - Hallar la distancia entre  $r$  y  $r'$
- Operar en forma binómica:  $\frac{1 - (2 + 3i)^2 (1 - 2i)}{2i^{77} - i^{726}}$
  - Operar en polar, y pasar el resultado a binómica:  $\frac{(2\sqrt{3} - 2i)^8}{(-4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}i)^6}$
- Calcular  $\sqrt[3]{\frac{i^6 + i^{-6}}{-2i}}$
  - Dibujar las raíces.
  - Comprobar, en forma polar, la raíz  $\in 3^{\text{er}}$  cuadrante.

### 3ª EVALUACIÓN:

1. Dada  $f(x) = \begin{cases} \frac{5}{x-5} & \text{si } x \leq 0 \\ \sqrt{x+1} & \text{si } 0 < x \leq 3 \\ \frac{10}{x+2} & \text{si } x > 3 \end{cases}$

- a) Representarla gráficamente.
- b) Indicar su Dom(f) e Im(f)
- c) Intervalos de crecimiento. M y m
- d) Estudiar su continuidad
- e) Ecuación de las posibles asíntotas.
- f) Hallar la antiimagen de  $y=3/2$
- g) Hallar analíticamente  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

2. a) Hallar  $\log_5 \frac{25}{\sqrt[5]{125}}$       b) Hallar  $\log \sqrt[3]{2,4}$  en función de  $\log 2$  y  $\log 3$

c) Resolver:  $2 \cdot 9^x - 3^{x+2} + 4 = 0$

3. Calcular: a)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 + 9x^2 + 12x + 4}{x^3 + 7x^2 + 16x + 12}$       b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 + 9x^2 + 12x + 4}{x^3 + 7x^2 + 16x + 12}$       c)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 - 5x} - 2x)$

4. a) Hallar la derivada de  $f(x)=x^3$  en  $x=1$  aplicando la definición, es decir, mediante un límite.

b) Derivar  $y = \frac{2}{(x^2 + x + 1)^3}$  y simplificar.      c) Ídem:  $y = \frac{x^5}{5} - \frac{1}{2x} + \frac{2}{x^2}$       d) Ídem:  $y = \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)^3$

e) Ídem:  $y = -\sqrt[5]{2x^4 + 1} + 2\sqrt{x^2 - 2}$

www.yoquieroaprobar.es