

# 5 Primitiva de una función

## EJERCICIOS PROPUESTOS

1 y 2. Ejercicios resueltos.

3. Utiliza la tabla de derivadas para calcular estas integrales:

$$\text{a) } \int x^r dx = \frac{1}{r+1} x^{r+1} + C \quad (r \in \mathbb{R}, r \neq -1)$$

$$\text{b) } \int x^{-1} dx = \ln|x| + C$$

$$\text{c) } \int e^x dx = e^x + C$$

$$\text{d) } \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a \in \mathbb{R} > 0, a \neq 1)$$

$$\text{e) } \int \cos x dx = \text{sen}x + C$$

$$\text{f) } \int \text{sen}x dx = -\text{cos}x + C$$

$$\text{g) } \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsenx + C$$

$$\text{h) } \int \frac{1}{1+x^2} dx = \text{arctg}x + C$$

4. Calcula las siguientes integrales indefinidas.

$$\text{a) } \int (\text{sen}x - e^x + \sqrt{x}) dx = -\text{cos}x - e^x + \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C = -\text{cos}x - e^x + \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$$

$$\text{b) } \int \left( \sqrt[3]{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \frac{x^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} - \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C = \frac{3}{4}\sqrt[3]{x^4} + \frac{1}{x} + C$$

$$\text{c) } \int \sqrt[3]{x^2} \sqrt{x} dx = \int \sqrt[6]{x^5} dx = \frac{x^{\frac{5}{6}+1}}{\frac{5}{6}+1} + C = \frac{6}{11}\sqrt[6]{x^{11}} + C$$

5. **Calcula, en cada caso, la función  $f(x)$  que verifica las condiciones dadas.**

a)  $f'(x) = \cos x + x\sqrt{x}$  y  $f(\pi) = 0$

$$f(x) = \int (\cos x + x\sqrt{x}) dx = \int (\cos x + x^{\frac{3}{2}}) dx = \text{sen}x + \frac{2}{5}\sqrt{x^5} + C$$

Para calcular  $C$  utilizamos,  $f(\pi) = 0 \Rightarrow 0 = \text{sen}\pi + \frac{2}{5}\sqrt{\pi^5} + C \Rightarrow C = -\frac{2}{5}\sqrt{\pi^5}$

$$f(x) = \text{sen}x + \frac{2}{5}\sqrt{x^5} - \frac{2}{5}\sqrt{\pi^5}$$

b)  $f'(x) = \frac{3}{1+x^2} - e^x$  y  $f(0) = 1$

$$f(x) = 3 \int \frac{1}{1+x^2} dx - \int e^x dx = 3\text{arctg}x - e^x + C$$

Calculamos  $C$ ,  $f(0) = 3\text{arctg}0 - e^0 + C = 1 \Rightarrow C = 2$

$$f(x) = 3\text{arctg}x - e^x + 2$$

c)  $f'(x) = x - 2\cos x$  y la gráfica de  $f$  corta a la bisectriz del II cuadrante en el punto de abscisa  $x = \pi$ .

$$f(x) = \int (x - 2\cos x) dx = \frac{1}{2}x^2 - 2\text{sen}x + C$$

Sabemos que  $f(\pi) = -\pi \Rightarrow f(\pi) = \frac{1}{2}\pi^2 - 2\text{sen}\pi + C = -\pi \Rightarrow C = -\frac{1}{2}\pi^2 - \pi$ .

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2\text{sen}x - \frac{1}{2}\pi^2 - \pi$$

6. **Prueba que  $F(x) = \text{sen}^2 x$  y  $G(x) = -\frac{\cos 2x}{2}$  son primitivas de  $f(x) = \text{sen}(2x)$ . ¿En qué constante se diferencian? (Recuerda que  $\text{sen}2\alpha = 2\text{sen}\alpha\cos\alpha$ ).**

Bastará comprobar que las derivadas de  $F$  y de  $G$  coinciden con  $f$ .

En efecto, esto es así ya que:

$$F'(x) = 2\text{sen}x \cos x = \text{sen}2x \quad \text{y} \quad G'(x) = \frac{2\text{sen}2x}{2} = \text{sen}2x$$

Para encontrar la constante que las diferencias restamos ambas expresiones:

$$F(x) - G(x) = \text{sen}^2 x + \frac{\cos 2x}{2} = \text{sen}^2 x + \frac{\cos^2 x - \text{sen}^2 x}{2} = \frac{\cos^2 x + \text{sen}^2 x}{2} = \frac{1}{2}$$

7. **Ejercicio resuelto.**

8. Calcula las siguientes integrales indefinidas.

$$a) \int \frac{t+1}{\sqrt{3t^2+6t-5}} dt = \int \frac{6t+6}{6\sqrt{3t^2+6t-5}} dt = \frac{1}{3} \int \frac{6t+6}{2\sqrt{3t^2+6t-5}} dt = \frac{\sqrt{3t^2+6t-5}}{3} + C$$

$$b) \int \frac{1-x}{1-\sqrt{x}} dx = \int \frac{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}{1-\sqrt{x}} dx = \int (1+\sqrt{x}) dx = x + \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$$

$$c) \int (x^3+1)^{12} \cdot 4x^2 dx = \frac{4}{3} \int (x^3+1)^{12} \cdot 3x^2 dx = \frac{4}{39} (x^3+1)^{13} + C$$

$$d) \int \frac{\text{sen}(\ln t)}{t} dt = -\cos(\ln t) + C$$

$$e) \int \frac{e^{3s}}{1+e^{6s}} ds = \frac{1}{3} \int \frac{3e^{3s}}{1+(e^{3s})^2} ds = \frac{1}{3} \text{arctg}(e^{3s}) + C$$

$$f) \int \frac{8x}{\sqrt{1-9x^4}} dx = \int \frac{8x}{\sqrt{1-(3x^2)^2}} dx = \frac{8}{6} \int \frac{6x}{\sqrt{1-(3x^2)^2}} dx = \frac{4}{3} \arcsen(3x^2) + C$$

9. Halla las primitivas de las siguientes funciones.

a)  $f(x) = 2x(\text{sen } x^2)(\cos^4 x^2)$

b)  $g(x) = \text{tg}(3x+2)$

$$a) \int 2x(\text{sen } x^2)(\cos^4 x^2) dx = -\frac{1}{5} \int 2x(-\text{sen } x^2)(5 \cos^4 x^2) dx = -\frac{1}{5} \cos^5 x^2 + C$$

$$b) \int \text{tg}(3x+2) dx = -\frac{1}{3} \int \frac{-3 \text{sen}(3x+2)}{\cos(3x+2)} dx = -\frac{1}{3} \ln |\cos(3x+2)| + C$$

10. Calcula las derivadas de  $f(x) = \text{tg}^2 x$  y  $g(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ , simplificalas al máximo y explica qué observas.

$$f'(x) = 2 \text{tg } x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{2 \text{sen } x}{\cos^3 x} \text{ y } g'(x) = \frac{2 \text{sen } x}{\cos^3 x}$$

Sus derivadas son iguales, luego son dos primitivas de  $h(x) = \frac{2 \text{sen } x}{\cos^3 x}$ . Como  $f(x) = g(x) + C$ , mirando su valor en  $x = 0$  tenemos que  $0 = f(0) = g(0) + C = 1 + C$ .

11. Ejercicio interactivo.

12. Ejercicio resuelto.

## 13. Obtén las siguientes integrales indefinidas.

a)  $\int (x^2 - 5x + 1) \cos x \, dx$

$f$	$g'$
$x^2 - 5x + 1$	$\cos x$
$2x - 5$	$\operatorname{sen} x$
$2$	$-\cos x$
$0$	$-\operatorname{sen} x$

$$\int (x^2 - 5x + 1) \cos x \, dx = (x^2 - 5x + 1) \operatorname{sen} x - (2x - 5)(-\cos x) + 2(-\operatorname{sen} x) + C = (x^2 - 5x - 1) \operatorname{sen} x + (2x - 5) \cos x + C$$

b)  $\int \operatorname{arctg} x \, dx$

$f$	$g'$
$\operatorname{arctg} x$	$1$
$\frac{1}{1+x^2}$	$x$

$$\int \operatorname{arctg} x \, dx = x \cdot \operatorname{arctg} x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx = x \cdot \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

c)  $\int \operatorname{arcsen} x \, dx$

$f$	$g'$
$\operatorname{arcsen} x$	$1$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{\frac{x+5}{x}} \, dx &= \int \frac{-10t^2}{(t^2-1)^2} \, dt = -\frac{5}{2} \int \frac{1}{(t-1)^2} \, dt + \frac{5}{2} \int \frac{-1}{(t-1)^2} \, dt + \frac{5}{2} \int \frac{1}{(t+1)^2} \, dt + \frac{5}{2} \int \frac{-1}{(t+1)^2} \, dt = \\ &= \frac{5}{2} \left( -\ln|t-1| + \frac{1}{t-1} + \ln|t+1| + \frac{1}{t+1} \right) + C = \frac{5}{2} \left( -\ln \left| \sqrt{\frac{x+5}{x}} - 1 \right| + \frac{1}{\sqrt{\frac{x+5}{x}} - 1} + \ln \left| \sqrt{\frac{x+5}{x}} + 1 \right| + \frac{1}{\sqrt{\frac{x+5}{x}} + 1} \right) + C = \\ &= \frac{5}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x+5} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+5} - \sqrt{x}} \right| + \sqrt{x(x+5)} + C \end{aligned}$$

d)  $\int x \operatorname{sen}(2x) \, dx$

$f$	$g'$
$x$	$\operatorname{sen}(2x)$
$1$	$-\frac{1}{2} \cos(2x)$
$0$	$-\frac{1}{4} \operatorname{sen}(2x)$

$$\int x \operatorname{sen}(2x) \, dx = -\frac{1}{2} x \cos(2x) + \frac{1}{4} \operatorname{sen}(2x) + C$$

e)  $\int (x^7 - 3x + 1) \operatorname{sen} x \, dx$

$f$	$g'$
$x^7 - 3x + 1$	$\operatorname{sen} x$
$7x^6 - 3$	$-\cos x$
$42x^5$	$-\operatorname{sen} x$
$210x^4$	$\cos x$
$840x^3$	$\operatorname{sen} x$
$2520x^2$	$-\cos x$
$5040x$	$-\operatorname{sen} x$
$5040$	$\cos x$
$0$	$\operatorname{sen} x$

$$\int (x^7 - 3x + 1) \operatorname{sen} x \, dx = (x^7 - 3x + 1)(-\cos x) - (7x^6 - 3)(-\operatorname{sen} x) + 42x^5 \cos x - 210x^4 \operatorname{sen} x + 840x^3(-\cos x) - 2520x^2(-\operatorname{sen} x) + 5040x \cos x - 5040 \operatorname{sen} x + C = (-x^7 + 42x^5 - 840x^3 + 5043x - 1) \cos x + (7x^6 - 210x^4 + 2520x^2 - 5043) \operatorname{sen} x + C$$

f)  $\int e^{3x} \cos x \, dx$

$f$	$g'$
$e^{3x}$	$\cos x$
$3e^{3x}$	$\operatorname{sen} x$
$9e^{3x}$	$-\cos x$

$$\int e^{3x} \cos x \, dx = e^{3x} \operatorname{sen} x + 3e^{3x} \cos x + \int 9e^{3x}(-\cos x) \, dx$$

Despejando,  $\int e^{3x} \cos x \, dx = \frac{e^{3x}(\operatorname{sen} x + 3 \cos x)}{10} + C$ .

14. Halla la primitiva de  $f(x) = (x + 1)^2 \operatorname{sen} x$  que cumpla  $F(0) = 1$ .

$$F(x) = \int (x^2 + 2x + 1) \operatorname{sen} x \, dx$$

$f$	$g'$
$x^2 + 2x + 1$	$\operatorname{sen} x$
$2x + 2$	$-\cos x$
$2$	$-\operatorname{sen} x$
$0$	$\cos x$

$$\int (x^2 + 2x + 1) \operatorname{sen} x \, dx = (x^2 + 2x + 1)(-\cos x) - (2x + 2)(-\operatorname{sen} x) + 2 \cos x + C = -(x^2 + 2x + 1) \cos x + (2x + 2) \operatorname{sen} x + 2 \cos x + C$$

$$1 = -1 + 0 + 2 + C \Rightarrow C = 0$$

Luego  $F(x) = -(x^2 + 2x + 1) \cos x + (2x + 2) \operatorname{sen} x + 2 \cos x$

**15. Determina las siguientes integrales indefinidas.**

a)  $\int \sqrt{x} \ln x dx$

$f$	$g'$
$\ln x$	$\sqrt{x}$
$\frac{1}{x}$	$\frac{2}{3}\sqrt{x^3}$

$$\int \sqrt{x} \ln x dx = \frac{2}{3} \ln x \sqrt{x^3} - \int \frac{2\sqrt{x^3}}{3x} dx = \frac{2}{3} \ln x \sqrt{x^3} - \frac{4}{9} \sqrt{x^3} + C = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \left( \ln x - \frac{2}{3} \right) + C$$

b)  $\int x(\ln x)^2 dx$

$f$	$g'$
$(\ln x)^2$	$x$
$\frac{2 \ln x}{x}$	$\frac{1}{2} x^2$

$f$	$g'$
$\ln x$	$x$
$\frac{1}{x}$	$x^2$

$$\int x(\ln x)^2 dx = \frac{1}{2} x^2 (\ln x)^2 - \int x \ln x dx = \frac{1}{2} x^2 (\ln x)^2 - \frac{1}{2} x^2 \ln x + \int \frac{1}{2} x dx + C = \frac{1}{2} x^2 (\ln x)^2 - \frac{1}{2} x^2 \ln x + \frac{1}{4} x^2 + C$$

c)  $\int x^2 (\ln x)^2 dx$

$f$	$g'$
$(\ln x)^2$	$x^2$
$\frac{2 \ln x}{x}$	$\frac{x^3}{3}$

$f$	$g'$
$\ln x$	$\frac{2}{3} x^2$
$\frac{1}{x}$	$\frac{2}{9} x^3$

$$\int x^2 (\ln x)^2 dx = \frac{1}{3} x^3 (\ln x)^2 - \int \frac{2}{3} x^2 \ln x dx = \frac{1}{3} x^3 (\ln x)^2 - \left[ \frac{2}{9} x^3 (\ln x) - \int \frac{2}{9} x^2 dx \right] = \frac{1}{3} x^3 (\ln x)^2 - \frac{2}{9} x^3 (\ln x) - \frac{2}{27} x^3 + C$$

d)  $\int \sqrt{x} (\ln x)^2 dx$

$f$	$g'$
$(\ln x)^2$	$\sqrt{x}$
$\frac{2 \ln x}{x}$	$\frac{2}{3} \sqrt{x^3}$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x} (\ln x)^2 dx &= \frac{2\sqrt{x^3} (\ln x)^2}{3} - \int \frac{4}{3} \ln x \sqrt{x} dx = \frac{2\sqrt{x^3} (\ln x)^2}{3} - \frac{4}{3} \left( \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \left( \ln x - \frac{2}{3} \right) \right) + C = \\ &= \frac{2\sqrt{x^3} (\ln x)^2}{3} - \frac{8}{9} \sqrt{x^3} \left( \ln x - \frac{2}{3} \right) + C \end{aligned}$$

e)  $\int (1-x)e^{-x} dx$

$f$	$g'$
$1-x$	$e^{-x}$
$-1$	$-e^{-x}$
$0$	$e^{-x}$

$$\int (1-x)e^{-x} dx = -(1-x)e^{-x} - (-1)e^{-x} + C = xe^{-x} + C$$

f)  $\int x^4 e^{2x} dx$

$f$	$g'$
$x^4$	$e^{2x}$
$4x^3$	$\frac{1}{2}e^{2x}$
$12x^2$	$\frac{1}{4}e^{2x}$
$24x$	$\frac{1}{8}e^{2x}$
$24$	$\frac{1}{16}e^{2x}$
$0$	$\frac{1}{32}e^{2x}$

$$\int x^4 e^{2x} dx = \frac{1}{2}x^4 e^{2x} - x^3 e^{2x} + \frac{3}{2}x^2 e^{2x} - \frac{3}{2}x e^{2x} + \frac{3}{4}e^{2x} + C = e^{2x} \left( \frac{1}{2}x^4 - x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{4} \right) + C$$

16. Calcula, utilizando la fórmula de la integración por partes, una primitiva  $F(x)$  de la función  $f(x) = x^2 \ln x^2$  que cumpla  $F(1) = 0$ .

$f$	$g'$
$\ln x^2$	$x^2$
$\frac{2}{x}$	$\frac{x^3}{3}$

$$\int x^2 \ln x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \ln x^2 - \int \frac{2}{3}x^2 dx + C = \frac{1}{3}x^3 \ln x^2 - \frac{2}{9}x^3 + C = \frac{1}{9}x^3 (3 \ln x^2 - 2) + C$$

$$0 = F(1) = \frac{1}{9}(-2) + C \Rightarrow C = \frac{2}{9} \text{ y } F(x) = \frac{1}{9}x^3 (3 \ln x^2 - 2) + \frac{2}{9}$$

17 a 19 Ejercicios resueltos.

**20. Calcula las siguientes integrales indefinidas primitivas previa descomposición en fracciones simples.**

- a)  $\int \frac{dx}{2x+5} = \frac{1}{2} \ln|2x+5| + C$
- b)  $\int \frac{2x-1}{(x-1)(x-2)} dx = \int \frac{-1}{x-1} dx + \int \frac{3}{x-2} dx = -\ln|x-1| + 3\ln|x-2| + C$
- c)  $\int \frac{dx}{x^2-x} = \int \frac{dx}{x(x-1)} dx = \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{-1}{x} dx = \ln|x-1| - \ln|x| + C$
- d)  $\int \frac{dx}{x^2+2x-3} = \int \frac{dx}{(x-1)(x+3)} dx = \frac{1}{4} \int \frac{1}{x-1} dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+3} dx = \frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln|x+3| + C$
- e)  $\int \frac{xdx}{(x-1)(x+3)(x+5)} = \frac{1}{24} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{3}{8} \int \frac{1}{x+3} dx - \frac{5}{12} \int \frac{1}{x+5} dx = \frac{1}{24} (\ln|x-1| + 9\ln|x+3| - 10\ln|x+5|) + C$
- f)  $\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x} dx = \int (x^2+x+4) dx + \int \frac{4x^2+16x-8}{x(x-2)(x+2)} dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + \int \frac{2}{x} dx + \int \frac{5}{x-2} dx + \int \frac{-3}{x+2} dx =$   
 $= \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + 2\ln|x| + 5\ln|x-2| - 3\ln|x+2| + C$

**21. Determina las siguientes integrales indefinidas.**

- a)  $\int \frac{dx}{(x-1)^2(x-2)} = \int \frac{-dx}{x-1} + \int \frac{-dx}{(x-1)^2} + \int \frac{dx}{x-2} = -\ln|x-1| + \frac{1}{x-1} + \ln|x-2| + C$
- b)  $\int \frac{1+8x}{1+x^2} dx = \int \frac{dx}{1+x^2} + \int \frac{8xdx}{1+x^2} = \arctg x + 4\ln|1+x^2| + C$
- c)  $\int \frac{2x^2-3x-3}{(x-1)(x^2-2x+5)} dx = \int \frac{-1}{x-1} dx + \int \frac{3x-2}{x^2-2x+5} dx = -\ln|x-1| + \frac{3}{2} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+5} dx + \frac{1}{2} \int \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{x-1}{2}\right)^2+1} dx =$   
 $= -\ln|x-1| + \frac{3}{2} \ln|x^2-2x+5| + \frac{1}{2} \arctg\left(\frac{x-1}{2}\right) + C$
- d)  $\int \frac{dx}{x^3+1} = \int \frac{dx}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{-\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}}{x^2-x+1} dx = \frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx +$   
 $+ \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{2\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{3}}\right)^2+1} dx = \frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \ln|x^2-x+1| + \frac{\sqrt{3}}{3} \arctg\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + C$
- e)  $\int \frac{x^3}{x^3+x-2} dx = \int dx + \int \frac{-x+2}{x^3+x-2} dx = x + \frac{1}{4} \int \frac{(-x-6)}{x^2+x+2} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{x-1} dx =$   
 $= x - \frac{1}{8} \int \frac{2x+1}{x^2+x+2} dx - \frac{11}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{2}{\sqrt{7}} \int \frac{\frac{2}{\sqrt{7}}}{\left(\frac{2x+1}{\sqrt{7}}\right)^2+1} dx + \frac{1}{4} \ln|x-1| =$   
 $= x - \frac{1}{8} \ln|x^2+x+2| - \frac{11\sqrt{7}}{49} \arctg\left(\frac{2x+1}{\sqrt{7}}\right) + \frac{1}{4} \ln|x-1| + C$
- f)  $\int \frac{x^3-6}{x^4+6x^2+8} dx = \int \frac{x^3-6}{(x^2+2)(x^2+4)} dx = \int \frac{-x-3}{x^2+2} dx + \int \frac{2x+3}{x^2+4} dx =$   
 $= -\frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+2} dx - \frac{3}{\sqrt{2}} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2+1} dx + \int \frac{2x}{x^2+4} dx + \frac{3}{2} \int \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1} dx =$   
 $= -\frac{1}{2} \ln(x^2+2) - \frac{3}{\sqrt{2}} \arctg\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + \ln(x^2+4) + \frac{3}{2} \arctg\left(\frac{x}{2}\right) + C$



## 22 y 23. Ejercicios resueltos.

### 24. Calcula las siguientes integrales indefinidas.

a)  $\int \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx$        $t = 1 + \sqrt{x}, dt = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Rightarrow 2(t-1)dt = dx$

$$\int \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx = \int \frac{-2(t-1)(t-2)}{t} dt = -\int (2t-6) dt - 4 \int \frac{dt}{t} = -t^2 + 6t - 4 \ln|t| + C =$$

$$= -(1+\sqrt{x})^2 + 6(1+\sqrt{x}) - 4 \ln|1+\sqrt{x}| + C$$

b)  $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}} dx$        $t = \sqrt[3]{x+1}, dt = \frac{1}{3(\sqrt[3]{x+1})^2} dx \Rightarrow 3t^2 dt = dx$

$$\int \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}} dx = \int \frac{3t^2}{t+1} dt = 3 \int (t-1) dt + 3 \int \frac{1}{t+1} dt = \frac{3}{2} t^2 - 3t + 3 \ln|t+1| + C = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} - 3\sqrt[3]{x} + 3 \ln|\sqrt[3]{x+1}| + C$$

c)  $\int \frac{1+e^x}{e^{2x}+1} dx$        $t = e^x, dt = e^x dx \Rightarrow \frac{dt}{t} = dx$

$$\int \frac{1+e^x}{e^{2x}+1} dx = \int \frac{1+t}{(t^2+1)t} dt = \int \frac{1}{t} dt + \int \frac{-t+1}{t^2+1} dt = \ln|t| - \frac{1}{2} \int \frac{2t}{t^2+1} dt + \int \frac{1}{t^2+1} dt = \ln|t| - \frac{1}{2} \ln|t^2+1| + \arctg(t) + C =$$

$$= x - \frac{1}{2} \ln|e^{2x}+1| + \arctg(e^x) + C$$

d)  $\int \frac{\operatorname{sen} x - 1}{\operatorname{sen} x + 1} \cos x dx$        $t = \operatorname{sen} x, dt = \cos x dx$

$$\int \frac{\operatorname{sen} x - 1}{\operatorname{sen} x + 1} \cos x dx = \int \frac{t-1}{t+1} dt = \int dt - \int \frac{2}{t+1} dt = t - 2 \ln|t+1| + C = \operatorname{sen} x - 2 \ln|\operatorname{sen} x + 1| + C$$

### 25. Determina las siguientes integrales indefinidas.

a)  $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x+1}} dx$        $t = \sqrt[6]{x}; dt = \frac{dx}{6(\sqrt[6]{x})^5} \Rightarrow 6t^5 dt = dx$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x+1}} dx = \int \frac{6t^5 \cdot t^3}{t^2+1} dt = 6 \int (t^6 - t^4 + t^2 - 1) dt + 6 \int \frac{1}{t^2+1} dt = \frac{6}{7} t^7 - \frac{6}{5} t^5 + \frac{6}{3} t^3 - 6t + 6 \arctg t + C =$$

$$= \frac{6}{7} x^{\frac{7}{6}} - \frac{6}{5} x^{\frac{5}{6}} + 2\sqrt{x} - 6\sqrt[6]{x} + 6 \arctg(\sqrt[6]{x}) + C$$

b)  $\int \sqrt{\frac{x+5}{x}} dx$  (toma  $\frac{x+5}{x} = t^2$ )

$$\frac{x+5}{x} = t^2 \Rightarrow t^2 = 1 + \frac{5}{x}, 2t dt = \frac{-5}{x^2} dx = -\frac{1}{5} \left(\frac{5}{x}\right)^2 dx \Rightarrow dx = \frac{-10t}{(t^2-1)^2} dt$$

$$\int \sqrt{\frac{x+5}{x}} dx = \int \frac{-10t^2}{(t^2-1)^2} dt = -\frac{5}{2} \int \frac{1}{(t-1)} dt + \frac{5}{2} \int \frac{-1}{(t-1)^2} dt + \frac{5}{2} \int \frac{1}{(t+1)} dt + \frac{5}{2} \int \frac{-1}{(t+1)^2} dt =$$

$$= \frac{5}{2} \left( -\ln|t-1| + \frac{1}{t-1} + \ln|t+1| + \frac{1}{t+1} \right) + C = \frac{5}{2} \left( -\ln \left| \sqrt{\frac{x+5}{x}} - 1 \right| + \frac{1}{\sqrt{\frac{x+5}{x}} - 1} + \ln \left| \sqrt{\frac{x+5}{x}} + 1 \right| + \frac{1}{\sqrt{\frac{x+5}{x}} + 1} \right) + C =$$

$$= \frac{5}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x+5} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+5} - \sqrt{x}} \right| + \sqrt{x(x+5)} + C$$

### 26. Ejercicio interactivo.

27. Transforma estas integrales en otras polinómicas o racionales.

a)  $\int \operatorname{sen}^5 x \cos^2 x \, dx$

$$t = \cos x, \, dt = -\operatorname{sen} x \, dx$$

$$\int \operatorname{sen}^5 x \cos^2 x \, dx = -\int (1 - \cos^2 x)^2 \cos^2 x (-\operatorname{sen} x) \, dx = -\int (1 - t^2)^2 t^2 \, dt$$

b)  $\int \frac{\operatorname{sen}^4 x}{\cos^3 x} \, dx$

$$t = \operatorname{sen} x, \, dt = \cos x \, dx$$

$$\int \frac{\operatorname{sen}^4 x}{\cos^3 x} \, dx = \int \frac{\operatorname{sen}^4 x}{\cos^4 x} \cos x \, dx = \int \frac{\operatorname{sen}^4 x}{(1 - \operatorname{sen}^2 x)^2} \cos x \, dx = \int \frac{t^4}{(1 - t^2)^2} \, dt$$

c)  $\int \frac{1}{\cos x} \, dx$

$$t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right), \, dx = \frac{2 \, dt}{1 + t^2}$$

$$\int \frac{1}{\cos x} \, dx = \int \frac{2 \, dt}{1 - t^2}$$

28. Transforma en polinómicas o racionales estas integrales:

a)  $\int \frac{2 \operatorname{sen} x \cos x}{1 + \operatorname{sen}^2 x} \, dx$

$$t = \operatorname{sen} x, \, dt = \cos x \, dx \Rightarrow \int \frac{2 \operatorname{sen} x \cos x}{1 + \operatorname{sen}^2 x} \, dx = \int \frac{2 \operatorname{sen} x}{1 + \operatorname{sen}^2 x} \cos x \, dx = \int \frac{2t}{1 + t^2} \, dt$$

b)  $\int \operatorname{sen}^4 x \cos^2 x \, dx$

$$t = \operatorname{tg} x, \, dx = \frac{dt}{1 + t^2} \Rightarrow \int \operatorname{sen}^4 x \cos^2 x \, dx = \int \frac{t^4}{(1 + t^2)^7} \, dt$$

c)  $\int \operatorname{tg}^4 x \, dx$

$$t = \operatorname{tg} x, \, dx = \frac{dt}{1 + t^2} \Rightarrow \int \operatorname{tg}^4 x \, dx = \int \frac{t^4}{1 + t^2} \, dt$$

29. Utiliza las propiedades de las derivadas y prueba el recíproco del teorema de Liouville, es decir:

“la derivada de  $f(x)e^{g(x)}$  con  $f$  y  $g$  funciones racionales, es  $R(x)e^{g(x)}$  con  $R$  función racional”.

$$F(x) = f(x)e^{g(x)} \Rightarrow F'(x) = f'(x)e^{g(x)} + f(x)g'(x)e^{g(x)} = (f'(x) + f(x)g'(x))e^{g(x)}$$

Si  $f(x)$  y  $g(x)$  son funciones racionales, entonces,  $R(x) = f'(x) + f(x)g'(x)$  pues la derivada de una función racional es racional y producto y suma de racionales es racional.

30. Utilizando la no elementalidad de  $\int x^{2n} \cdot e^{ax^2} dx$ , prueba que no son elementales las primitivas:

a)  $\int \sqrt{\ln x} dx$       b)  $\int \frac{1}{\sqrt{\ln x}} dx$       c)  $\int \frac{e^{ax}}{\sqrt{x}} dx$

Indicación: pon  $\ln x = t^2$  en a y b y  $x = t^2$  en c.

a)  $\int \sqrt{\ln x} dx$ . Llamando  $x = e^{t^2}$ ,  $dx = 2te^{t^2} dt \Rightarrow \int \sqrt{\ln x} dx = \int \sqrt{\ln(e^{t^2})} 2te^{t^2} dt = 2 \int t^2 e^{t^2} dt$  que no es elemental.

b)  $\int \frac{1}{\sqrt{\ln x}} dx$ . Llamando  $x = e^{t^2}$ ,  $dx = 2te^{t^2} dt \Rightarrow \int \frac{1}{\sqrt{\ln x}} dx = \int \frac{2te^{t^2}}{\sqrt{\ln(e^{t^2})}} dt = 2 \int e^{t^2} dt$  que no es elemental.

c)  $\int \frac{e^{ax}}{\sqrt{x}} dx$ . Llamando  $x = t^2$ ,  $dx = 2tdt \Rightarrow \int \frac{e^{at^2}}{t} 2tdt = 2 \int e^{at^2} dt$  que no es elemental.

31 a 36. Ejercicios resueltos.

EJERCICIOS

Primitivas e integral indefinida. Propiedades

37. Asocia a cada función  $f(x)$  una primitiva  $F(x)$ .

$f(x)$
$6 \operatorname{sen}^2(2x+1) \cos(2x+1)$
$\cos(2x+1)$
$6(2x+1)^2 \cos(2x+1)^3$
$6 \cos(6x+3)$

$F(x)$
$\operatorname{sen}(2x+1)^3$
$\frac{1}{2} \operatorname{sen}(2x+1)$
$\operatorname{sen}[3(2x+1)]$
$\operatorname{sen}^3(2x+1)$

$f(x)$	$F(x)$
$6 \operatorname{sen}^2(2x+1) \cos(2x+1)$	$\operatorname{sen}^3(2x+1)$
$\cos(2x+1)$	$\frac{1}{2} \operatorname{sen}(2x+1)$
$6(2x+1)^2 \cos(2x+1)^3$	$\operatorname{sen}(2x+1)^3$
$6 \cos(6x+3)$	$\operatorname{sen}[3(2x+1)]$

38. Comprueba que  $F(x) = \operatorname{arcsen} x$  y  $G(x) = -\operatorname{arccos} x$  son ambas primitivas de la misma función. ¿De qué función se trata? ¿En qué constante difieren?

$F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  y  $G'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ , luego son ambas primitivas de  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ .

Como  $F(x) - G(x)$  es constante, para ver en qué se diferencian basta calcular  $F(0) - G(0) = \operatorname{arcsen} 0 + \operatorname{arccos} 0 = \frac{\pi}{2}$ .

39. Una primitiva de cierta función  $f(x)$  es  $F(x) = x^2 - 3x + 1$ . Encuentra otra primitiva de  $f(x)$  cuya gráfica pase por el punto  $A(1, 5)$ .

Las primitivas de  $f(x)$  son de la forma  $G(x) = x^2 - 3x + 1 + C$ . Haciendo  $x = 1$  tenemos:

$$5 = 1 - 3 + 1 + C \Rightarrow C = 6. \text{ La primitiva buscada es } G(x) = x^2 - 3x + 1 + 6.$$

40. Determina, razonando la respuesta, si las funciones  $F(x) = \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\operatorname{sen} x}$  y  $G(x) = \frac{1 - \operatorname{sen}^2 x}{\cos x \operatorname{sen} x}$  son primitivas de una misma función.

Derivando ambas funciones obtenemos:

$$F'(x) = \frac{(\cos x - \operatorname{sen} x)\operatorname{sen} x - (\operatorname{sen} x + \cos x)\cos x}{\operatorname{sen}^2 x} = -\frac{\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$$

$$G'(x) = \frac{-2\operatorname{sen} x \cos x \cdot \cos x \operatorname{sen} x - (1 - \operatorname{sen}^2 x)(-\operatorname{sen} x \operatorname{sen} x + \cos x \cos x)}{(\cos x \operatorname{sen} x)^2} = \frac{-2\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x - \cos^2 x (\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x)}{\cos^2 x \operatorname{sen}^2 x} =$$

$$= \frac{-2\operatorname{sen}^2 x - \cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$$

Como sus derivadas son iguales, ambas son primitivas de la misma función. Dicha función es  $f(x) = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$ .

41. Comprueba que:

a)  $\int 6 \operatorname{sen}(x+1) \cos(x+1) dx = 3 \operatorname{sen}^2(x+1) + C$

Comprobamos que, efectivamente,  $(3 \operatorname{sen}^2(x+1) + C)' = 6 \operatorname{sen}(x+1) \cos(x+1)$ .

b)  $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3}} = 4 \sqrt[4]{x} + C$

Comprobamos que, efectivamente,  $(4 \sqrt[4]{x} + C)' = \frac{1}{\sqrt[4]{x^3}}$ .

c)  $\int \sqrt{ax+b} = \frac{2(ax+b)\sqrt{ax+b}}{3a} + C$

Comprobamos que, efectivamente,  $\left(\frac{2(ax+b)\sqrt{ax+b}}{3a} + C\right)' = \left(\frac{2(ax+b)^{3/2}}{3a} + C\right)' = \sqrt{ax+b}$ .

## Primitivas inmediatas

42. Calcula las siguientes primitivas inmediatas indicando de qué tipo son.

a)  $\int \sqrt[5]{x^3} dx$  Tipo:  $\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C \Rightarrow \int \sqrt[5]{x^3} dx = \frac{5}{8} \sqrt[5]{x^8} + C$

b)  $\int \frac{4^x - 3 \cdot 2^x}{2^x} dx$  Tipo:  $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \Rightarrow \int \frac{4^x - 3 \cdot 2^x}{2^x} dx = \int 2^x dx - 3 \int dx = \frac{2^x}{\ln 2} - 3x + C$

c)  $\int \frac{x^3 + 3x^2 - 5x + 7}{x^2} dx$  Tipo:  $\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C$  y  $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$   
 $\int \frac{x^3 + 3x^2 - 5x + 7}{x^2} dx = \int x dx + 3 \int dx - 5 \int \frac{1}{x} dx + 7 \int \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{2} x^2 + 3x - 5 \ln|x| - \frac{7}{x} + C$

d)  $\int \frac{\sen x + \cos x}{2} dx$  Tipo:  $\int \cos x dx = \sen x + C$  y  $\int \sen x dx = -\cos x + C$   
 $\int \frac{\sen x + \cos x}{2} dx = \frac{1}{2} \int \sen x dx + \frac{1}{2} \int \cos x dx = -\frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sen x + C$

e)  $\int \frac{2\sqrt{1-x^2} - 3}{\sqrt{1-x^2}} dx$  Tipo:  $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsen x + C$   
 $\int \frac{2\sqrt{1-x^2} - 3}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int dx - 3 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2x - 3 \arcsen x + C$

f)  $\int e^{-x} dx$  Tipo:  $\int e^{f(x)} \cdot f'(x) dx = e^{f(x)} + C \Rightarrow \int e^{-x} dx = -e^{-x} + C$

g)  $\int \frac{2+t^2}{1+t^2} dt$  Tipo:  $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctg x + C \Rightarrow \int \frac{2+t^2}{1+t^2} dt = \int dt + \int \frac{1}{1+t^2} dt = t + \arctg t + C$

h)  $\int \frac{t^2}{\sqrt{1-t^6}} dt$  Tipo:  $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-(f(x))^2}} dx = \arcsen f(x) + C$   
 $\int \frac{t^2}{\sqrt{1-t^6}} dt = \frac{1}{3} \int \frac{3t^2}{\sqrt{1-(t^3)^2}} dt = \frac{1}{3} \arcsen(t^3) + C$

43. Halla una primitiva de  $y = \frac{x^2 + 3}{\sqrt{x}}$ .

$$\int \frac{x^2 + 3}{\sqrt{x}} dx = \int x^{\frac{3}{2}} dx + 3 \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \sqrt{x} + 6\sqrt{x} + C$$

Luego una primitiva sería:  $f(x) = \frac{2}{5} x^2 \sqrt{x} + 6\sqrt{x}$

44. Determina  $f(x)$  sabiendo que:

$$f'''(x) = 24x; f(0) = 0; f'(0) = 1; f''(0) = 2$$

$f'''(x) = 24x$  entonces  $f''(x) = 12x^2 + C$ , como  $f''(0) = 2$ , se deduce que  $C = 2$ .

$f''(x) = 12x^2 + 2$  entonces  $f'(x) = 4x^3 + 2x + C$ , como  $f'(0) = 1$ , se deduce que  $C = 1$ .

$f'(x) = 4x^3 + 2x + 1$  entonces  $f(x) = x^4 + x^2 + x + C$ , como  $f(0) = 0$ , se deduce que  $C = 0$ .

Por tanto,  $f(x) = x^4 + x^2 + x$ .

45. Calcula  $\int x \ln(1+x^2) dx$ .

Comenzamos llamando  $t = 1+x^2$ ,  $dt = 2x dx \Rightarrow \int x \ln(1+x^2) dx = \frac{1}{2} \int \ln t dt$

Esta integral se realiza por partes tomando  $f(t) = \ln t$  y  $g'(t) = 1$ .

$f$	$g'$
$\ln t$	1
$\frac{1}{t}$	$t$

$$\frac{1}{2} \int \ln t dt = \frac{1}{2} \left( t \ln t - \int \frac{1}{t} t dt \right) = \frac{1}{2} t (\ln t - 1) + C$$

Así pues,  $\int x \ln(1+x^2) dx = \frac{1}{2} (1+x^2) (\ln(1+x^2) - 1) + C$

46. Halla la ecuación de una curva  $y = f(x)$ , sabiendo que pasa por el punto (1, 1) y que la pendiente de la recta tangente en el punto de abscisa  $x$  es  $3x+1$ .

Sabemos  $f'(x) = 3x+1$ , luego  $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + x + C$  y como  $f(1) = 1$  entonces  $C = -\frac{3}{2}$ .

La curva tiene ecuación  $y = f(x) = \frac{3}{2}x^2 + x - \frac{3}{2}$ .

47. De una función  $y = f(x)$ ,  $x > -1$ , se sabe que tiene por derivada  $y' = \frac{a}{1+x}$  donde  $a$  es una constante. Determina la función si, además, se cumple que  $f(0) = 1$  y  $f(1) = -1$ .

$$f(x) = \int \frac{a}{1+x} dx = a \ln(1+x) + C$$

Sustituyendo:

$$f(0) = a \cdot \ln 1 + C = 1 \Rightarrow C = 1$$

$$f(1) = a \cdot \ln 2 + 1 = -1 \Rightarrow a = -\frac{2}{\ln 2}$$

La función es  $f(x) = -\frac{2 \ln(1+x)}{\ln 2} + 1 = -2 \log_2(1+x) + 1$ .

48. Halla una función  $F(x)$  que verifique que  $x^5 F'(x) + x^3 + 2x = 3$  para  $x \neq 0$ .

$$x^5 F'(x) + x^3 + 2x = 3 \Rightarrow F'(x) = \frac{3 - 2x - x^3}{x^5}$$

$$F(x) = \int \frac{3 - 2x - x^3}{x^5} dx = -\frac{3}{4x^4} + \frac{2}{3x^3} + \frac{1}{x} + C$$

Como nos piden una función, tomando  $C = 0$  tenemos  $F(x) = -\frac{3}{4x^4} + \frac{2}{3x^3} + \frac{1}{x}$ .

49. De la función  $f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  se sabe que  $f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2}$  y que  $f(2) = 0$ .

- a) Determina  $f$ .  
 b) Halla la primitiva de  $f$  cuya gráfica pasa por el punto  $(0, 1)$ .

a)  $f(x) = \int \frac{3}{(x+1)^2} dx = -\frac{3}{x+1} + C$  como  $f(2) = 0$  entonces  $f(2) = -\frac{3}{2+1} + C = 0 \Rightarrow C = 1$

Luego  $f(x) = -\frac{3}{x+1} + 1$

b)  $F(x) = \int \left(-\frac{3}{x+1} + 1\right) dx = -3\ln|x+1| + x + C$

$1 = -3\ln|0+1| + C \Rightarrow C = 1$

$F(x) = -3\ln|x+1| + x + 1$

50. Calcula estas integrales.

a)  $\int \frac{\sqrt{5-3\operatorname{tg} x}}{\cos^2 x} dx = -\frac{2}{9}\sqrt{(5-3\operatorname{tg} x)^3} + C$

b)  $\int \sqrt{x+3} dx = \frac{2}{3}\sqrt{(x+3)^3} + C$

c)  $\int \frac{\ln x^2}{x} dx = \frac{(\ln x^2)^2}{4} + C$

d)  $\int \frac{x+\sqrt{x}}{x^2} dx = \ln|x| - \frac{2}{\sqrt{x}} + C$

e)  $\int \frac{x+2}{x^2+4x} dx = \frac{1}{2}\ln|x^2+4x| + C$

f)  $\int \operatorname{sen} x^6 \cos x dx = \frac{\operatorname{sen}^7 x}{7} + C$

51. De todas las primitivas de la función  $f(x) = 2\operatorname{tg} x \sec^2 x$ , halla la que pasa por el punto  $P\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$ .

$F(x) = \int 2\operatorname{tg} x \sec^2 x dx = \frac{1}{\cos^2 x} + C$

Como  $P\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$ , entonces  $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right)} + C = 1 \Rightarrow C = -1$ .

Luego,  $F(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$ .

52. Calcula la primitiva de la función  $f(x) = x\sqrt{x^2 - 1}$  que se anula en el punto de abscisa  $x = 2$ .

$$F(x) = \int x\sqrt{x^2 - 1} dx = \frac{\sqrt{(x^2 - 1)^3}}{3} + C$$

Como  $x = 2$ , tenemos que  $0 = \frac{\sqrt{(2^2 - 1)^3}}{3} + C \Rightarrow 0 = \frac{3\sqrt{3}}{3} + C \Rightarrow C = -\sqrt{3}$ .

Luego,  $F(x) = \frac{\sqrt{(x^2 - 1)^3}}{3} - \sqrt{3}$ .

53. Calcula las integrales:

a)  $\int \frac{(x-1)^2}{\sqrt{x}} dx$

b)  $\int e^{2x^2 - x + 3} (1 - 4x) dx$

a)  $\int \frac{(x-1)^2}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{x^2}{\sqrt{x}} dx - \int \frac{2x}{\sqrt{x}} dx + \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{2\sqrt{x}}{15} (3x^2 - 10x + 15) + C$

b)  $\int e^{2x^2 - x + 3} (1 - 4x) dx = -e^{2x^2 - x + 3} + C$

54. Halla la función  $F(x)$  tal que  $F(0) = 2$ , y que sea primitiva de la función  $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ .

$$F(x) = \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx = \ln(e^x + 1) + C$$

Como  $F(0) = 2$ , entonces  $\ln 2 + C = 2 \Rightarrow C = 2 - \ln 2$ .

Luego,  $F(x) = \ln(e^x + 1) + 2 - \ln 2$ .

55. Calcula la integral  $\int [\sqrt{x^2 + 20x} + (x^2 + 20x)](x + 10) dx$ .

$$\begin{aligned} \int [\sqrt{x^2 + 20x} + (x^2 + 20x)](x + 10) dx &= \frac{1}{2} \int \sqrt{x^2 + 20x} \cdot 2(x + 10) dx + \frac{1}{2} \int (x^2 + 20x) \cdot 2(x + 10) dx = \\ &= \frac{\sqrt{(x^2 + 20x)^3}}{3} + \frac{1}{4} (x^2 + 20x)^2 + C \end{aligned}$$



## Integración por partes

56. Calcula:

a)  $\int \ln(x+1) dx$

$f$	$g'$
$\ln(x+1)$	1
$\frac{1}{x+1}$	$x+1$

$$\int \ln(x+1) dx = (x+1)\ln(x+1) - \int \frac{x+1}{x+1} dx = (x+1)\ln(x+1) - x + C$$

b)  $\int x \operatorname{arctg}(x+1) dx$

$$\begin{aligned} \int x \operatorname{arctg}(x+1) dx &= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg}(x+1) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+(x+1)^2} dx = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg}(x+1) - \left( \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \frac{-2x-2}{x^2+2x+2} dx \right) \\ &= \frac{x^2 \operatorname{arctg}(x+1)}{2} - \frac{x}{2} + \frac{\ln(x^2+2x+2)}{2} + C \end{aligned}$$

c)  $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$

$$\int \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{\ln x+1}{x} + C$$

d)  $\int x \ln x dx$

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

e)  $\int x(\ln x)^2 dx$

$f$	$g'$
$(\ln x)^2$	$x$
$2(\ln x) \frac{1}{x}$	$\frac{x^2}{2}$

$$\int x(\ln x)^2 dx = \frac{x^2}{2} (\ln|x|)^2 - \int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} (\ln|x|)^2 - \left[ \frac{x^2}{2} \ln|x| - \frac{x^2}{4} \right] + C$$

f)  $\int \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x dx$

$$\int \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x dx = \int x \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) dx = \frac{1}{2} x^2 \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + \int \frac{x^2}{(x+1)(x-1)} dx = \frac{1}{2} x^2 \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + \int dx - \int \frac{1}{x^2-1} dx =$$

$$\frac{1}{2} x^2 \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + x - \int \frac{1}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} x^2 \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + x - \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{x+1} dx = \frac{1}{2} x^2 \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + x - \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{x+1} dx =$$

$$\frac{1}{2} x^2 \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + x - \frac{1}{2} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x+1| = \frac{1}{2} (x+1)(x-1) \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + x + C$$

57. Determina la integral indefinida  $\int x^2 \text{sen}(2x) dx$ .

<b>f</b>	<b>g'</b>
$x^2$	$\text{sen}2x$
$2x$	$-\frac{1}{2}\cos 2x$
$2$	$-\frac{1}{4}\text{sen}2x$
$0$	$\frac{1}{8}\cos 2x$

$$\int x^2 \text{sen}(2x) dx = -\frac{1}{2}x^2 \cos(2x) + \frac{1}{2}x \text{sen}(2x) + \frac{1}{4}\cos(2x) + C$$

58. Calcula con la tabla auxiliar de integrales sucesivas:

a)  $\int x^6 \cos x dx$

<b>f</b>	<b>g'</b>
$x^6$	$\cos x$
$6x^5$	$\text{sen} x$
$30x^4$	$-\cos x$
$120x^3$	$-\text{sen} x$
$360x^2$	$\cos x$
$720x$	$\text{sen} x$
$720$	$-\cos x$
$0$	$-\text{sen} x$

$$\int x^6 \cos x dx = 6 \cos x(x^5 - 20x^3 + 120x) + \text{sen} x(x^6 - 30x^4 + 360x^2 - 720) + C$$

b)  $\int x^7 e^{7x} dx$

$f$	$g'$
$x^7$	$e^{7x}$
$7x^6$	$\frac{1}{7} e^{7x}$
$42x^5$	$\frac{1}{7^2} e^{7x}$
$210x^4$	$\frac{1}{7^3} e^{7x}$
$840x^3$	$\frac{1}{7^4} e^{7x}$
$2520x^2$	$\frac{1}{7^5} e^{7x}$
$5040x$	$\frac{1}{7^6} e^{7x}$
$5040$	$\frac{1}{7^7} e^{7x}$
$0$	$\frac{1}{7^8} e^{7x}$

$$\int x^7 e^{7x} dx = e^{7x} \left( \frac{x^7}{7} - \frac{x^6}{7} + \frac{6x^5}{7^2} - \frac{30x^4}{7^3} + \frac{120x^3}{7^4} - \frac{360x^2}{7^5} + \frac{720x}{7^6} - \frac{720}{7^7} \right) + C$$

c)  $\int e^{ax} \cos bx dx$

$f$	$g'$
$\cos bx$	$e^{ax}$
$-b \operatorname{sen} xb$	$\frac{e^{ax}}{a}$
$-b^2 \cos bx$	$\frac{e^{ax}}{a^2}$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx - \frac{1}{a^2} e^{ax} (-b \operatorname{sen} bx) + \int \frac{1}{a^2} e^{ax} (-b^2 \cos bx) = \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \operatorname{sen} bx)}{a^2 + b^2} + C$$

$$\left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right) \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx - \frac{1}{a^2} e^{ax} (-b \operatorname{sen} bx) \Rightarrow \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \operatorname{sen} bx)}{a^2 + b^2} + C$$

d)  $\int (x^3 + x^2 + 1) e^x dx$

$f$	$g'$
$x^3 + x^2 + 1$	$e^x$
$3x^2 + 2x$	$e^x$
$6x + 2$	$e^x$
$6$	$e^x$
$0$	$e^x$

$$\int (x^3 + x^2 + 1) e^x dx = e^x (x^3 - 2x^2 + 4x - 3) + C$$

59. Determina las funciones  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  que satisfacen la condición de que la pendiente de la recta tangente en un punto genérico  $(x, y)$  de su gráfica viene dada por la expresión  $xe^x$ .

$$f(x) = \int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = e^x(x-1) + C$$

60. Sea  $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = \ln(1-x^2)$ . Calcula la primitiva de  $f$  cuya gráfica pasa por el punto  $(0, 1)$ .

$$F(x) = \int \ln(1-x^2) dx = x \ln(1-x^2) - \int -\frac{2x^2}{1-x^2} dx = x \ln(1-x^2) - 2 \int dx + 2 \int \frac{1}{(1-x)(1+x)} dx$$

$$x \ln(1-x^2) - 2x + \int \frac{1}{1-x} dx + \int \frac{1}{1+x} dx = x \ln(1-x^2) - 2x - \ln \left| \frac{1-x}{1+x} \right| + C$$

Como pasa por  $(0, 1)$  se tiene que  $-\ln 1 + C = 1 \Rightarrow C = 1$  y la función es  $F(x) = x \ln(1-x^2) - 2x - \ln \left| \frac{1-x}{1+x} \right| + 1$ .

61. Calcula la siguiente integral indefinida  $\int e^{ax}(x^2 + bx + c) dx$  en función de los parámetros  $a, b$  y  $c$ .

$$\int e^{ax}(x^2 + bx + c) dx = \frac{1}{a} e^{ax}(x^2 + bx + c) - \frac{1}{a} \int e^{ax}(2x + b) dx = e^{ax}(x^2 + bx + c) - \frac{1}{a^2} e^{ax}(2x + b) + \frac{1}{a^2} \int 2e^{ax} dx =$$

$$= e^{ax} \left( \frac{x^2 + bx + c}{a} - \frac{2x + b}{a^2} + \frac{2}{a^3} \right) + C$$

62. Hallar la primitiva de  $f(x) = x^2 \ln x$  cuya gráfica pasa por el punto  $A(1, 2)$ .

$f$	$g'$
$\ln x$	$x^2$
$\frac{1}{x}$	$\frac{x^3}{3}$

$$\int x^2 \ln x dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \int \frac{1}{3} x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C = \frac{1}{9} x^3 (3 \ln x - 1) + C$$

$$F(1) = \frac{1}{9}(-1) + C = 2 \Rightarrow C = \frac{19}{9}$$

Luego una primitiva sería  $F(x) = \frac{1}{9} x^3 (3 \ln x - 1) + \frac{19}{9}$ .

63. Utiliza la integración por partes para calcular la función  $f(x)$  que cumple  $f(0) = 1$  y  $f'(x) = e^x \cos x$ .

$$f(x) = \int e^x \cos x dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx = e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x dx.$$

$$\text{Despejando tenemos } f(x) = \int e^x \cos x dx = \frac{e^x \cos x + e^x \sin x}{2} + C.$$

$$f(0) = \frac{1}{2} + C = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

Luego,  $f(x) = \frac{e^x}{2} (\cos x + \sin x + 1)$ .

Integración de funciones racionales

64. Encuentra dos números reales  $A$  y  $B$  tales que:  $\frac{4x-5}{x^2-1} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1}$  y calcula  $\int \frac{4x-5}{x^2-1} dx$ .

$$\frac{4x-5}{x^2-1} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} \Rightarrow A(x-1) + B(x+1) = 4x-5$$

En particular, si hacemos  $x=1$  obtenemos  $2B=-1 \Rightarrow B=-\frac{1}{2}$ .

Y si hacemos  $x=-1$ ,  $-2A=-9 \Rightarrow A=\frac{9}{2}$ .

$$\text{Luego, } \frac{4x-5}{x^2-1} = \frac{9}{2} \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} \frac{1}{x-1}$$

$$\int \frac{4x-5}{x^2-1} dx = \frac{9}{2} \int \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} = \frac{9}{2} \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|x-1| + C$$

65. Se consideran las funciones reales  $f(x) = 12x^3 - 8x^2 + 9x - 5$  y  $g(x) = 6x^2 - 7x + 2$ . Calcula la función

$H(x) = \int \frac{f(x)}{g(x)} dx$  que cumple que  $H(1) = 1$ .

$$H(x) = \int \frac{f(x)}{g(x)} dx = \int \frac{12x^3 - 8x^2 + 9x - 5}{6x^2 - 7x + 2} dx = \int (2x+1) dx + \int \frac{12x-7}{6x^2-7x+2} dx = x^2 + x + \ln(6x^2 - 7x + 2) + C$$

Como  $H(1) = 1 \Rightarrow 1+1+\ln 1 + C = 1 \Rightarrow C = -1$

La función es  $H(x) = x^2 + x + \ln(6x^2 - 7x + 2) - 1$ .

66. Resuelve las siguientes integrales que dan lugar a funciones tipo arco tangente. Para ello, primero debes transformar las fracciones en otras de la forma:  $\frac{a}{1+(ax+b)^2}$ , cuya integral es inmediata

$$\int \frac{a}{1+(ax+b)^2} dx = \text{arctg}(ax+b) + C.$$

a)  $\int \frac{2}{1+x^2} dx = 2 \text{arctg } x + C$

b)  $\int \frac{1}{1+2x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{\sqrt{2}}{1+(\sqrt{2}x)^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{arctg}(\sqrt{2}x) + C$

c)  $\int \frac{1}{9+x^2} dx = \frac{1}{3} \int \frac{\frac{1}{3}}{1+(\frac{x}{3})^2} dx = \frac{1}{3} \text{arctg}\left(\frac{x}{3}\right) + C$

d)  $\int \frac{1}{4+(x-3)^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\frac{1}{2}}{1+(\frac{x-3}{2})^2} dx = \frac{1}{2} \text{arctg}\left(\frac{x-3}{2}\right) + C$

e)  $\int \frac{1}{x^2-4x+5} dx = \int \frac{1}{(x-2)^2+1} dx = \text{arctg}(x-2) + C$

f)  $\int \frac{2}{x^2+10x+41} dx = \int \frac{2}{(x+5)^2+16} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\frac{1}{4}}{\left(\frac{x+5}{4}\right)^2+1} dx = \frac{1}{2} \text{arctg}\left(\frac{x+5}{4}\right) + C$

67. Calcula  $\int \frac{-x^2}{x^2+x-2} dx$ .

$$\int \frac{-x^2}{x^2+x-2} dx = \int -dx + \int \frac{x-2}{x^2+x-2} dx = -x + \int \frac{x-2}{(x-1)(x+2)} dx = -x + \int \frac{-\frac{1}{3}}{x-1} dx + \int \frac{\frac{4}{3}}{x+2} dx =$$

$$= -x - \frac{1}{3} \ln|x-1| + \frac{4}{3} \ln|x+2| + C$$

68. Halla la integral racional  $\int \frac{3x}{x^2+x-2} dx$ .

$$\int \frac{3x}{x^2+x-2} dx = \int \frac{3x}{(x-1)(x+2)} dx = \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{2}{x+2} dx = \ln|x-1| + 2\ln|x+2| + C$$

69. Calcula la integral indefinida  $\int \frac{x-1}{x^3+x^2} dx$ .

$$\int \frac{x-1}{x^3+x^2} dx = \int \frac{x-1}{x^2(x+1)} dx = \int \frac{2}{x} dx + \int \frac{-1}{x^2} dx + \int \frac{-2}{x+1} dx = 2\ln|x| + \frac{1}{x} - 2\ln|x+1| + C$$

70. Determina estas integrales correspondientes a los diferentes casos de funciones racionales.

a)  $\int \frac{dx}{2x-7}$

Esta integral es inmediata.

$$\int \frac{dx}{2x-7} = \frac{1}{2} \ln|2x-7| + C$$

b)  $\int \frac{1}{x^2+4} dx$

Caso C. Polinomio de 2.º grado sin raíces reales.

$$\int \frac{dx}{x^2+4} = \frac{1}{2} \int \frac{\frac{1}{2} dx}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

c)  $\int \frac{x}{x^2-4x-5} dx$

Caso A. Raíces reales distintas.

$$\int \frac{x}{x^2-4x-5} dx = \int \frac{x}{(x+1)(x-5)} dx = \int \frac{\frac{1}{6}}{x+1} dx + \int \frac{\frac{5}{6}}{x-5} dx = \frac{1}{6} \ln|x+1| + \frac{5}{6} \ln|x-5| + C$$

d)  $\int \frac{1}{x^4+3x^2+2} dx$

Caso D. Raíces complejas de multiplicidad 1.

$$\int \frac{1}{x^4+3x^2+2} dx = \int \frac{1}{(x^2+1)(x^2+2)} dx = \int \frac{1}{x^2+1} dx + \int \frac{-1}{x^2+2} dx = \int \frac{1}{x^2+1} dx - \frac{\sqrt{2}}{2} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} dx =$$

$$= \operatorname{arctg} x - \frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C$$

e)  $\int \frac{x+5}{x^3-x^2-x+1} dx$

Caso B. Solo tiene raíces reales, algunas de ellas iguales.

$$\int \frac{x+5}{x^3-x^2-x+1} dx = \int \frac{x+5}{(x+1)(x-1)^2} dx = \int \frac{1}{x+1} dx + \int \frac{-1}{x-1} dx + \int \frac{3}{(x-1)^2} dx = \ln|x+1| - \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + C$$

f)  $\int \frac{x}{x^2+4x+7} dx$

Caso C. Polinomio de 2.º grado sin raíces reales.

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^2+4x+7} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+4}{x^2+4x+7} dx - \int \frac{2}{x^2+4x+7} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+4x+7| - \int \frac{2}{(x+2)^2+3} dx = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x^2+4x+7| - \frac{2\sqrt{3}}{3} \int \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{x+2}{\sqrt{3}}\right)^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+4x+7| - \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+2}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

g)  $\int \frac{dx}{x^4+4}$

Caso D. Raíces complejas de multiplicidad 1.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^4+4} dx &= \int \frac{-\frac{1}{8}x+\frac{1}{4}}{x^2-2x+2} dx + \int \frac{\frac{1}{8}x+\frac{1}{4}}{x^2+2x+2} dx = \\ &= -\frac{1}{16} \int \frac{2x-2}{x^2-2x+2} dx + \frac{1}{8} \int \frac{1}{(x-1)^2+1} dx + \frac{1}{16} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx + \frac{1}{8} \int \frac{1}{(x+1)^2+1} dx = \\ &= -\frac{1}{16} \ln(x^2-2x+2) + \frac{1}{8} \operatorname{arctg}(x-1) + \frac{1}{16} \ln(x^2+2x+2) + \frac{1}{8} \operatorname{arctg}(x+1) + C \end{aligned}$$

h)  $\int \frac{2x+1}{x^2-3x+2} dx$

Caso A. Raíces reales distintas.

$$\int \frac{2x+1}{x^2-3x+2} dx = \int \frac{2x+1}{(x-2)(x-1)} dx = \int \frac{5}{x-2} dx + \int \frac{-3}{x-1} dx = 5\ln|x-2| - 3\ln|x-1| + C$$

### Integración por cambio de variables

71. Calcula las siguientes primitivas realizando el cambio de variable que se indica.

a)  $\int \frac{x}{x^4+1} dx, x^2 = t$

$$x^2 = t \Rightarrow 2x dx = dt$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^4+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2+1} dt = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(x^2) + C$$

b)  $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-1+4x-2}}, 2x-1 = t^2$

$$2x-1 = t^2 \Rightarrow 2dx = 2tdt$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x-1+4x-2}} = \frac{1}{2} \int \frac{2dx}{\sqrt{2x-1+2(2x-1)}} = \frac{1}{2} \int \frac{2tdt}{t+2t^2} = \frac{1}{2} \int \frac{2dt}{1+2t} = \frac{1}{2} \ln|1+2t| + C = \frac{1}{2} \ln(1+2\sqrt{2x-1}) + C$$

72. Calcula la primitiva  $\int \text{sen}(\ln x) dx$ .

Hacemos el cambio de variable  $x = e^t \Rightarrow dx = e^t dt$

$$\int \text{sen}(\ln x) dx = \int e^t \text{sen } t dt = e^t \text{sen } t - \int e^t \cos t dt = e^t \text{sen } t - e^t \cos t - \int e^t \text{sen } t dt = x \text{sen}(\ln x) - x \cos(\ln x) - \int \text{sen}(\ln x) dx$$

$$\int \text{sen}(\ln x) dx = \frac{x(\text{sen}(\ln x) - \cos(\ln x))}{2} + C$$

73. Sea la integral  $\int e^{2x} \text{sen}(e^x) dx$ :

a) Resuélvela mediante el cambio  $t = e^x$ .

b) Calcula la constante de integración para determinar la primitiva que pasa por el origen de coordenadas.

a)  $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$

$$\int e^{2x} \text{sen}(e^x) dx = \int t \text{sen } t dt = -t \cos t - \int -\cos t dt = -t \cos t + \text{sen } t + C = -e^x \cos(e^x) + \text{sen}(e^x) + C$$

b)  $0 = -e^0 \cos(e^0) + \text{sen}(e^0) + C \Rightarrow C = \cos 1 - \text{sen } 1$

74. Calcula las siguientes primitivas.

a)  $\int \frac{2}{1+\sqrt{x}} dx$        $\sqrt{x} = t \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = dt$

$$\int \frac{2}{1+\sqrt{x}} dx = \int \frac{4t}{1+t} dt = \int \frac{4(t+1)}{1+t} dt - 4 \int \frac{1}{1+t} dt = 4t - 4 \ln|1+t| + C = 4\sqrt{x} - 4 \ln(1+\sqrt{x}) + C$$

b)  $\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$        $e^x = t \Rightarrow e^x dx = dt$

$$\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \int \frac{1}{\left(t + \frac{1}{t}\right)t} dt = \int \frac{1}{t^2 + 1} dt = \text{arctg}(t) + C = \text{arctg}(e^x) + C$$

c)  $\int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx$        $x = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx = \int \frac{6t^5}{t^3 + t^2} dt = \int \frac{6t^3}{t+1} dt = \int (6t^2 - 6t + 6) dt + \int \frac{-6dt}{t+1} = 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6 \ln|t+1| + C =$$

$$= 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$$

d)  $\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^3}} dx$        $1+x^3 = t^2 \Rightarrow 3x^2 dx = 2t dt$

$$\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^3}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{((1+x^3)-1)3x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{(t^2-1)2t}{t} dt = \frac{2}{3} \int (t^2-1) dt = \frac{2}{9} t^3 - \frac{2}{3} t + C = \frac{2\sqrt{1+x^3}(x^3-2)}{9} + C$$

e)  $\int \frac{2^x}{\sqrt{1-4^x}} dx$        $2^x = t \Rightarrow 2^x \ln 2 dx = dt$

$$\int \frac{2^x}{\sqrt{1-4^x}} dx = \frac{1}{\ln 2} \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{1}{\ln 2} \arcsen(t) + C = \frac{1}{\ln 2} \arcsen(2^x) + C$$

f)  $\int \frac{x \arcsen x}{\sqrt{1-x^2}} dx$        $t = \arcsen x \Rightarrow dt = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$$\int \frac{x \arcsen x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int t \text{sen } t dt = -t \cos t + \int \cos t dt = -t \cos t + \text{sen } t + C = -\sqrt{1-x^2} \arcsen x + x + C$$



75. Utiliza el cambio de variable  $t^2 = 1 + x^2$  para calcular la integral indefinida  $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$ .

$$t^2 = 1 + x^2 \Rightarrow 2tdt = 2xdx \Rightarrow tdt = xdx$$

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} xdx = \int \frac{t^2-1}{t} tdt = \int (t-1)dt = \frac{t^2}{2} - t + C = \frac{1}{2}\sqrt{(1+x^2)^3} - \sqrt{1+x^2} + C$$

76. Usando el cambio de variable  $t = e^x$ , calcula las siguientes integrales indefinidas.

a)  $\int \frac{e^x}{(e^{2x}-1)(e^x+1)} dx \quad t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$

$$\int \frac{e^x}{(e^{2x}-1)(e^x+1)} dx = \int \frac{dt}{(t^2-1)(t+1)} = \int \frac{dt}{(t-1)(t+1)^2} = \int \frac{\frac{1}{4}dt}{(t-1)} + \int \frac{-\frac{1}{4}dt}{(t+1)} + \int \frac{-\frac{1}{2}dt}{(t+1)^2} =$$

$$\frac{1}{4} \ln|t-1| - \frac{1}{4} \ln|t+1| + \frac{1}{2} \frac{1}{t+1} + C = \frac{1}{4} \ln|e^x-1| - \frac{1}{4} \ln|e^x+1| + \frac{1}{2(e^x+1)} + C$$

b)  $\int \frac{e^x}{1-e^{-x}} dx \quad t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$

$$\int \frac{e^x}{1-e^{-x}} dx = \int \frac{dt}{1-\frac{1}{t}} = \int \frac{t}{t-1} dt = \int 1 + \frac{1}{t-1} dt = t + \ln|t-1| + C = e^x + \ln|e^x-1| + C$$

c)  $\int \frac{e^x}{e^{2x}-1} dx$

Llamando  $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$ :

$$\int \frac{e^x}{e^{2x}-1} dx = \int \frac{dt}{t^2-1} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t+1} = \frac{1}{2} \ln|t-1| - \frac{1}{2} \ln|t+1| = \frac{1}{2} \ln|e^x-1| - \frac{1}{2} \ln|e^x+1| + C = \ln \sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}} + C$$

77. Calcula  $\int x(\ln(1+x^2) + e^{-x}) dx$ .

$$\int x(\ln(1+x^2) + e^{-x}) dx = \int x \ln(1+x^2) dx + \int xe^{-x} dx$$

Para resolver la primera integral hacemos el cambio  $t = 1 + x^2 \Rightarrow dt = 2xdx$  y después la hacemos por partes. La segunda la hacemos por partes directamente:

$$\int x \ln(1+x^2) dx + \int xe^{-x} dx = \frac{1}{2} \int \ln t dt - xe^{-x} + \int e^{-x} dx = \frac{1}{2} t \ln t - \frac{1}{2} \int dt - xe^{-x} - e^{-x} = \frac{1}{2} t \ln t - \frac{1}{2} t - xe^{-x} - e^{-x} + C$$

Deshaciendo el cambio de variable obtenemos:

$$\int x(\ln(1+x^2) + e^{-x}) dx = \frac{1}{2}(1+x^2)(\ln(1+x^2)-1) - e^{-x}(x+1) + C$$

78. Usando el cambio de variable  $t = e^x$ , calcula  $\int e^{x+e^x} dx$ .

$$t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$$

$$\int e^{x+e^x} dx = \int e^x e^{e^x} dx = \int e^t dt = e^t + C = e^{e^x} + C$$

79. Calcula  $\int \sec^3 x dx$  (el cambio  $\text{sen } x = t$  lleva a una función racional).

$$\text{sen } x = t \Rightarrow \cos x dx = dt$$

$$\begin{aligned} \int \sec^3 x dx &= \int \frac{\cos x}{\cos^4 x} dx = \int \frac{1}{(1-t^2)^2} dt = \int \frac{1}{t+1} dt + \int \frac{1}{(t+1)^2} dt + \int \frac{-1}{t-1} dt + \int \frac{1}{(t-1)^2} dt = \\ &= \frac{1}{4} \ln|t+1| - \frac{1}{4} \frac{1}{t+1} - \frac{1}{4} \ln|t-1| - \frac{1}{4} \frac{1}{t-1} + C = \frac{1}{4} \ln|\text{sen } x + 1| - \frac{1}{4} \frac{1}{\text{sen } x + 1} - \frac{1}{4} \ln|\text{sen } x - 1| - \frac{1}{4} \frac{1}{\text{sen } x - 1} + C \end{aligned}$$

80. Calcula  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2}}$  (realiza el cambio  $\sqrt{x^2-2} - x = t$ ).

$$\sqrt{x^2-2} - x = t \Rightarrow dt = \left( \frac{x}{\sqrt{x^2-2}} - 1 \right) dx = \frac{x - \sqrt{x^2-2}}{\sqrt{x^2-2}} dx$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2}} = \int \frac{1}{\sqrt{x^2-2}} \cdot \frac{x - \sqrt{x^2-2}}{x - \sqrt{x^2-2}} dx = \int \frac{1}{x - \sqrt{x^2-2}} \cdot \frac{x - \sqrt{x^2-2}}{\sqrt{x^2-2}} dx = \int \frac{1}{-t} dt = -\ln|t| + C = -\ln|\sqrt{x^2-2} - x| + C$$

Integración de funciones trigonométricas

81. Dada la función  $f(x) = \cos x - \cos^3 x$ :

a) Halla su integral indefinida.

b) ¿Cuál es la primitiva de  $f(x)$  que pasa por  $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ ?

a) Hacemos el cambio  $\text{sen } x = t \Rightarrow \cos x dx = dt$

$$\int (\cos x - \cos^3 x) dx = \int \cos x (1 - \cos^2 x) dx = \int t^2 dt = \frac{1}{3} t^3 = \frac{\text{sen}^3 x}{3} + C$$

$$\text{b) } \frac{\text{sen}^3\left(\frac{\pi}{2}\right)}{3} + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{3}$$

$$\text{La primitiva buscada es } F(x) = \frac{\text{sen}^3 x - 1}{3}.$$

82. Calcula estas dos integrales.

a)  $\int \text{sen}^3 x dx$

b)  $\int \cos^3 x dx$

a) Haciendo el cambio  $\cos x = t \Rightarrow -\text{sen } x dx = dt$ :

$$\int \text{sen}^3 x dx = \int \text{sen}^2 x \text{sen } x dx = \int (1 - \cos^2 x) \text{sen } x dx = -\int (1 - t^2) dt = \frac{1}{3} t^3 - t + C = \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + C$$

b) Haciendo el cambio  $\text{sen } x = t \Rightarrow \cos x dx = dt$ :

$$\int \cos^3 x dx = \int \cos^2 x \cos x dx = \int (1 - \text{sen}^2 x) \cos x dx = \int (1 - t^2) dt = t - \frac{1}{3} t^3 + C = \text{sen } x - \frac{1}{3} \text{sen}^3 x + C$$

83. Calcula las siguientes integrales.

a)  $\int (2 \operatorname{sen}^2 x - 3 \cos x) dx = 2 \int \operatorname{sen}^2 x dx - 3 \int \cos x dx$

Para calcular  $\int \operatorname{sen}^2 x dx$  lo hacemos por partes:

$$\int \operatorname{sen}^2 x dx = -\operatorname{sen} x \cos x + \int \cos^2 x dx = -\operatorname{sen} x \cos x + \int (1 - \operatorname{sen}^2 x) dx = -\operatorname{sen} x \cos x + x - \int \operatorname{sen}^2 x dx$$

Despejando, obtenemos  $\int \operatorname{sen}^2 x dx = \frac{x - \operatorname{sen} x \cos x}{2} + C$ .

Y por tanto:  $\int (2 \operatorname{sen}^2 x - 3 \cos x) dx = 2 \int \operatorname{sen}^2 x dx - 3 \int \cos x dx = x - \operatorname{sen} x \cos x - 3 \operatorname{sen} x + C$

b)  $\int \cos^5 x \operatorname{sen}^2 x dx$

Hacemos el cambio  $\operatorname{sen} x = t \Rightarrow \cos x dx = dt$ :

$$\begin{aligned} \int \cos^5 x \operatorname{sen}^2 x dx &= \int \cos^4 x \operatorname{sen}^2 x \cos x dx = \int (1 - \operatorname{sen}^2 x)^2 \operatorname{sen}^2 x \cos x dx = \int (1 - t^2)^2 t^2 dt = \int (t^6 - 2t^4 + t^2) dt = \\ &= \frac{1}{7} t^7 - \frac{2}{5} t^5 + \frac{1}{3} t^3 + C = \frac{1}{7} \operatorname{sen}^7 x - \frac{2}{5} \operatorname{sen}^5 x + \frac{1}{3} \operatorname{sen}^3 x + C \end{aligned}$$

c)  $\int \frac{\cos^3 x}{\operatorname{sen}^2 x} dx$

Hacemos el cambio  $\operatorname{sen} x = t \Rightarrow \cos x dx = dt$ :

$$\int \frac{\cos^3 x}{\operatorname{sen}^2 x} dx = \int \frac{(1 - \operatorname{sen}^2 x) \cos x}{\operatorname{sen}^2 x} dx = \int \frac{1 - t^2}{t^2} dt = \int \frac{1}{t^2} dt - \int dt = -\frac{1}{t} - t + C = -\frac{1}{\operatorname{sen} x} - \operatorname{sen} x + C$$

d)  $\int \frac{\cos^2 x}{\operatorname{sen}^3 x} dx$

Hacemos el cambio  $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$ ;  $\operatorname{sen} x = \frac{2t}{1 + t^2}$ ;  $dx = \frac{2dt}{1 + t^2}$ :

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos^2 x}{\operatorname{sen}^3 x} dx &= \int \frac{(1 - t^2)^2}{4t^3} dt = \frac{1}{4} \int t dt - \frac{1}{2} \int \frac{1}{t} dt + \frac{1}{4} \int \frac{1}{t^3} dt = \frac{1}{8} t^2 - \frac{1}{2} \ln |t| - \frac{1}{8t^2} + C = \\ &= \frac{1}{8} \operatorname{tg}^2 \left( \frac{x}{2} \right) - \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \left( \frac{x}{2} \right) \right| - \frac{\cot^2 \left( \frac{x}{2} \right)}{8} + C \end{aligned}$$

84. Halla estas integrales haciendo el cambio  $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ .

Como  $\left( 1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} \right) \frac{1}{2} dx = dt \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1 + t^2}$  y  $\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$  y  $\operatorname{sen} x = \frac{2t}{1 + t^2}$

a)  $\int \frac{1}{2 + \cos x} dx = \int \frac{1}{2 + \frac{1 - t^2}{1 + t^2}} \cdot \frac{2}{1 + t^2} dt = \int \frac{2}{t^2 + 3} dt = \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{\frac{\sqrt{3}}{t}}{\left( \frac{t}{\sqrt{3}} \right)^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left( \frac{t}{\sqrt{3}} \right) + C = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left( \frac{\operatorname{tg} \left( \frac{x}{2} \right)}{\sqrt{3}} \right) + C$

b)  $\int \frac{1}{2 + \operatorname{sen} x} dx = \int \frac{1}{2 + \frac{2t}{1 + t^2}} \cdot \frac{2}{1 + t^2} dt = \int \frac{dt}{t^2 + t + 1} = \int \frac{dt}{\left( t + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}} =$   
 $= \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} dt}{\left( \frac{2 \left( t + \frac{1}{2} \right)}{\sqrt{3}} \right)^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left( \frac{2 \left( t + \frac{1}{2} \right)}{\sqrt{3}} \right) + C = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left( \frac{2 \operatorname{tg} \left( \frac{x}{2} \right) + 1}{\sqrt{3}} \right) + C$

85. Busca en tu libro de 1.º las fórmulas de las sumas y restas de senos y cosenos y empléalas para calcular estas integrales:

a)  $\int \cos(5x-3)\sin(3x-1) dx$

Usamos  $2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right) = \sin a - \sin b \Rightarrow \begin{cases} a = (5x-3) + (3x-1) = 8x-4 \\ b = (5x-3) - (3x-1) = 2x-2 \end{cases}$

$$\int \cos(5x-3)\sin(3x-1) dx = \frac{1}{2} \int \sin(8x-4) dx - \frac{1}{2} \int \sin(2x-2) dx = -\frac{\cos(8x-4)}{16} + \frac{\cos(2x-2)}{4} + C$$

b)  $\int \cos(2x+6)\cos(4x-2) dx$

Usamos  $2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right) = \cos a + \cos b \Rightarrow \begin{cases} a = 6x+4 \\ b = 2x-8 \end{cases}$

$$\int \cos(2x+6)\cos(4x-2) dx = \frac{1}{2} \int \cos(6x+4) dx + \frac{1}{2} \int \cos(2x-8) dx = \frac{\sin(6x+4)}{12} + \frac{\sin(2x-8)}{4} + C$$

c)  $\int \sin(2x+1)\sin(3x+5) dx$

Usamos  $2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\sin\left(\frac{a+b}{2}\right) = \cos b - \cos a \Rightarrow \begin{cases} a = 5x+6 \\ b = x+4 \end{cases}$

$$\int \sin(2x+1)\sin(3x+5) dx = \frac{1}{2} \int \cos(x+4) dx - \frac{1}{2} \int \cos(5x+6) dx = \frac{\sin(x+4)}{2} - \frac{\sin(5x+6)}{10} + C$$

d)  $\int \sin(2x+1)\cos(3x+5) dx$

Usamos  $2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right) = \sin a - \sin b \Rightarrow \begin{cases} a = 5x+6 \\ b = x+4 \end{cases}$

$$\int \sin(2x+1)\cos(3x+5) dx = \frac{1}{2} \int \sin(5x+6) dx - \frac{1}{2} \int \sin(x+4) dx = -\frac{\cos(5x+6)}{10} + \frac{\cos(x+4)}{2} + C$$

Integrales no elementales

86. Partiendo de que  $\int \frac{e^{ax}}{x^n} dx$ ,  $a \neq 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$  no es elemental, demuestra que las siguientes integrales tampoco lo son.

a)  $\int \frac{dx}{\ln x}$

b)  $\int e^{e^x} dx$

c)  $\int \ln(\ln x) dx$

a) Hacemos el cambio  $e^t = x \Rightarrow e^t dt = dx \Rightarrow \int \frac{dx}{\ln x} = \int \frac{e^t}{t} dt$ .

b) Hacemos el cambio  $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx \Rightarrow \int e^{e^x} dx = \int \frac{e^{e^x}}{e^x} e^x dx = \int \frac{e^t}{t} dt$ .

c) Hacemos el cambio  $e^t = x \Rightarrow e^t dt = dx \Rightarrow \int \ln(\ln x) dx = \int \ln t \cdot e^t dt$ .

Ahora, integrando por partes, tenemos  $\int \ln(\ln x) dx = \int \ln t \cdot e^t dt = \ln t \cdot e^t - \int \frac{e^t}{t} dt$ .

87. Utilizando la tabla de integración por partes demuestra que  $\int \frac{e^x}{x} dx$ , no es elemental.

Si tomamos  $f(x) = \frac{1}{x}$  y  $g'(x) = e^x$ :

$f$	$g'$
$\frac{1}{x}$	$e^x$
$-\frac{1}{x^2}$	$e^x$
$\frac{2}{x^3}$	$e^x$
...	...

Si tomamos  $f(x) = e^x$  y  $g'(x) = \frac{1}{x}$ :

$f$	$g'$
$e^x$	$\frac{1}{x}$
$e^x$	$\ln x$
$e^x$	$x(\ln x - 1)$
...	...

Se observa que tanto de una forma como de la otra se llega a sumas de infinitos sumandos y, por tanto, la integral es no elemental.

Actividades de síntesis

88. Resuelve las siguientes integrales por el método que creas más conveniente.

a)  $\int \frac{x^2 + 2\sqrt[3]{x} - \sqrt{x} + 3}{2x} dx = \frac{1}{2} \int x dx + \int x^{-2/3} dx - \frac{1}{2} \int x^{-1/2} dx + \frac{3}{2} \int \frac{1}{x} dx = \frac{1}{4} x^2 + 3\sqrt[3]{x} - \sqrt{x} + \frac{3}{2} \ln|x| + C$

b)  $\int \sin^5 x dx$

Como  $\sin^5 x = \sin^4 x \sin x$ , se pone  $\cos x = t$  y  $-\sin x dx = dt$ , quedándonos:

$$\int \sin^5 x dx = \int (1 - \cos^2 x)^2 \sin x dx = -\int (1 - t^2)^2 dt = -\frac{1}{5} t^5 - t + \frac{2}{3} t^3 = -\frac{1}{5} \cos^5 x - \cos x + \frac{2}{3} \cos^3 x + C$$

c)  $\int \sqrt{x}(1 - x^2) dx$

Poniendo  $x = t^2$  y  $dx = 2t dt$ , se tiene:  $2 \int t(1 - t^4)t dt = 2 \frac{t^3}{3} - 2 \frac{t^7}{7} + C = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{2}{7} \sqrt{x^7} + C$

d)  $\int \frac{1}{x^2 - x} dx = \int \frac{dx}{x(x-1)} = \int \frac{-dx}{x} + \int \frac{dx}{x-1} = -\ln|x| + \ln|x-1| + C$

e)  $\int x^2 \sqrt{1+x} dx$

Haciendo  $1+x = t^2$  y  $dx = 2t dt$ , se tiene:

$$\int (t^2 - 1)^2 t \cdot 2t dt = 2 \left( \frac{t^7}{7} - 2 \frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} \right) = 2 \sqrt{(1+x)^3} \left( \frac{(1+x)^2}{7} - \frac{2}{5}(1+x) + \frac{1}{3} \right) + C = \frac{2}{105} \sqrt{(1+x)^3} (15x^2 - 12x + 8) + C$$

$$f) \int \left( \frac{x-2\sqrt{x}}{x} + \frac{6}{x^2} - \frac{1}{x} \right) dx = \int \left( 1 - \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{6}{x^2} - \frac{1}{x} \right) dx = x - 4\sqrt{x} - \frac{6}{x} - \ln|x| + C$$

$$g) \int \operatorname{tg}(ax) \sec^2(ax) dx$$

Haciendo  $\operatorname{tg}(ax) = t$  y  $a \sec^2(ax) dx = dt$ , se llega a  $\frac{1}{a} \int t dt = \frac{1}{a} \cdot \frac{t^2}{2} = \frac{1}{2a} \operatorname{tg}^2(ax) + C$ .

$$h) \int x \ln(x+a) dx = \frac{x^2 \ln(a+x)}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{x+a} dx = \frac{x^2 \ln(a+x)}{2} - \frac{1}{2} \int (x-a) dx - \frac{1}{2} \int \frac{a^2}{x+a} dx =$$

$$= \frac{x^2 \ln(a+x)}{2} - \frac{1}{4} (x-a)^2 - \frac{a^2}{2} \ln(x+a) + C = \frac{1}{2} \ln(x+a) (x^2 - a^2) - \frac{1}{4} (x-a)^2 + C$$

$$i) \int \frac{x}{(x-2)(x^2-9)} dx = \int \frac{x}{(x-2)(x-3)(x+3)} dx = -\frac{2}{5} \int \frac{dx}{x-2} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-3} - \frac{1}{10} \int \frac{dx}{x+3} =$$

$$= -\frac{2}{5} \ln|x-2| + \frac{1}{2} \ln|x-3| - \frac{1}{10} \ln|x+3| + C$$

$$j) \int x \operatorname{sen}(2x) dx$$

$f$	$g'$
$x$	$\operatorname{sen}(2x)$
$1$	$-\frac{1}{2} \cos(2x)$
$0$	$-\frac{1}{4} \operatorname{sen}(2x)$

$$\int x \operatorname{sen}(2x) dx = -\frac{1}{2} x \cos(2x) + \frac{1}{4} \operatorname{sen} 2x + C$$

**89. Resuelve estas integrales por el método más adecuado.**

$$a) \int x^a \ln x dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} \ln x - \frac{1}{a+1} \int x^{a+1} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} \ln x - \frac{1}{a+1} \cdot \frac{x^{a+1}}{a+1} = \frac{1}{a+1} x^{a+1} \left( \ln x - \frac{1}{a+1} \right) + C$$

$$\text{Si } a = -1, \int x^a \ln x dx = \int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + C$$

$$b) \int e^{-x} \cos(5x) dx = -e^{-x} \cos(5x) + 5e^{-x} \operatorname{sen}(5x) - 25 \int e^{-x} \cos(5x) dx \Rightarrow \int e^{-x} \cos(5x) dx =$$

$$= \frac{-e^{-x} \cos(5x) + 5e^{-x} \operatorname{sen}(5x)}{26} + C$$

$$c) \int x\sqrt{x-3} dx$$

Haciendo  $x-3 = t^2$  y  $dx = 2t dt$ , se tiene:

$$\int x\sqrt{x-3} dx = \int (t^2+3)t \cdot 2t dt = 2 \left( \frac{t^5}{5} + t^3 \right) = \frac{2}{5} \sqrt{(x-3)^5} + 2\sqrt{(x-3)^3} + C$$

$$d) \int \frac{\ln x}{x^3} dx$$

Se denomina  $f(x) = \ln x$  y  $g'(x) = \frac{1}{x^3}$ .

$$\int \frac{\ln x}{x^3} dx = -\frac{1}{2} \ln x \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{2} \ln x \frac{1}{x^2} - \frac{1}{4x^2} + C$$

e)  $\int \frac{4}{x^4-1} dx$

$$\frac{4}{x^4-1} = \frac{4}{(x^2+1)(x+1)(x-1)} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{x-1} = \frac{(Ax+B)(x^2-1) + C(x^2+1)(x-1) + D(x^2+1)(x+1)}{x^4-1}$$

De la igualdad  $4 = (Ax+B)(x^2-1) + C(x^2+1)(x-1) + D(x^2+1)(x+1)$ , haciendo:

$$x=1 \Rightarrow 4 = 4D \Rightarrow D=1$$

$$x=-1 \Rightarrow 4 = -4C \Rightarrow C=-1$$

$$x=0 \Rightarrow 4 = -B-C+D \Rightarrow B=-2$$

$$x=2 \Rightarrow 4 = 6A+3B+5C+15D \Rightarrow A=0$$

Luego la integral pedida es:

$$\int \frac{4}{x^4-1} dx = -2 \operatorname{arctg} x - \ln|x+1| + \ln|x-1| + C$$

f)  $\int x \ln \sqrt{1+x^2} dx$

Como  $x \ln \sqrt{1+x^2} = \frac{1}{2} x \ln(1+x^2) \Rightarrow \int x \ln \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int x \ln(1+x^2) dx$ . La integral se puede resolver haciendo

$$1+x^2 = t \text{ y } 2x dx = dt \text{ y se transforma en } \frac{1}{2} \int \ln t dt = \frac{1}{2} (t \ln t - t) = \frac{1}{2} t (\ln t - 1).$$

Así que la integral pedida es  $\int x \ln \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{4} (1+x^2) (\ln(1+x^2) - 1) + C$ .

g)  $\int x(ax^2+b)^n dx$

Si  $n = -1$ ,  $\int \frac{x}{ax^2+b} dx = \frac{1}{2a} \ln|ax^2+b| + C$

Si  $n \neq -1$ , haciendo  $ax^2+b = t$  y  $2ax dx = dt$ , se tiene que:

$$\int x(ax^2+b)^n dx = \frac{1}{2a} \int t^n dt = \frac{1}{2a(n+1)} (ax^2+b)^{n+1} + C$$

h)  $\int \frac{\pi}{\cos^2(\pi x - 1)} dx = \operatorname{tg}(\pi x - 1) + C$

i)  $\int \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}+1} dx$

Haciendo  $x = t^6$  y  $dx = 6t^5 dt$ , se tiene que resolver  $6 \int \frac{t^3-1}{t^2+1} \cdot t^5 dt$

Como  $t^8 - t^5 = (t^2+1)(t^6 - t^4 - t^3 + t^2 + t - 1) + (1-t)$  la integral pedida es:

$$6 \int (t^6 - t^4 - t^3 + t^2 + t - 1) dt + 6 \int \frac{1-t}{t^2+1} dt = \\ = 6 \left( \frac{1}{7} \sqrt[7]{x^7} - \frac{1}{5} \sqrt[5]{x^5} - \frac{1}{4} \sqrt[4]{x^4} + \frac{1}{3} \sqrt[3]{x^3} + \frac{1}{2} \sqrt{x^2} - \sqrt{x} \right) + 6 \operatorname{arctg} \sqrt[6]{x} - 3 \ln(\sqrt[6]{x^2} + 1) + C$$

j)  $\int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\operatorname{tg}^2 x} dx = \int \operatorname{sen} x \cos^2 x dx = -\frac{1}{3} \cos^3 x + C$

k)  $\int \left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 dx$

Como  $\left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} (e^{2x} + e^{-2x} - 2)$

Así pues  $\int \left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{2} e^{2x} - \frac{1}{2} e^{-2x} - 2x \right) + C$

l)  $\int \frac{x^2}{x^3 + x^2 - 2x} dx$

$$\frac{x^2}{x^3 + x^2 - 2x} = \frac{x}{x^2 + x - 2} = \frac{x}{(x+2)(x-1)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1} = \frac{A(x-1) + B(x+2)}{(x+2)(x-1)}$$

Como  $x = A(x-1) + B(x+2) \Rightarrow A = \frac{2}{3}, B = \frac{1}{3}$  por lo que  $\int \frac{x^2}{x^3 + x^2 - 2x} dx = \frac{2}{3} \ln|x+2| + \frac{1}{3} \ln|x-1| + C$

m)  $\int \frac{x-3}{x^2+9} dx = \int \frac{x}{x^2+9} dx - \int \frac{3}{x^2+9} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+9) - \int \frac{\frac{1}{3}}{\left(\frac{x}{3}\right)^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+9) - \arctg\left(\frac{x}{3}\right) + C$

n)  $\int x\sqrt{x^2-9} dx$  Haciendo  $x^2-9 = t$  y  $2xdx = dt$ :

$$\int x\sqrt{x^2-9} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{t} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{t^3} = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2-9)^3} + C$$

o)  $\int (e^{\operatorname{sen}3x})^3 \cos(3x) dx$

Haciendo  $e^{\operatorname{sen}3x} = t$  y  $e^{\operatorname{sen}3x} \cdot 3\cos3x dx = dt$ , se tiene que:

$$\int (e^{\operatorname{sen}3x})^3 \cos3x dx = \frac{1}{3} \int t^2 dt = \frac{1}{9} t^3 = \frac{1}{9} (e^{\operatorname{sen}3x})^3 + C$$

p)  $\int \cos \frac{x}{2} \cos x dx$

Usamos  $2 \cos\left(\frac{a-b}{2}\right) \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) = \cos a + \cos b \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{2}x \\ b = \frac{1}{2}x \end{cases}$

$$\int \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos x dx = \frac{1}{2} \int \cos\left(\frac{3x}{2}\right) dx + \frac{1}{2} \int \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx = \frac{1}{3} \operatorname{sen}\left(\frac{3x}{2}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

q)  $\int \frac{x-3}{x^3+x^2+x} dx = -3 \ln|x| + \int \frac{3x+4}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx$  y esta última integral se resuelve como:

$$\int \frac{3x+4}{x^2+x+1} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x+\frac{8}{3}}{x^2+x+1} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x+1+\frac{5}{3}}{x^2+x+1} dx = \frac{3}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{5}{2} \int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx \text{ y, finalmente,}$$

$$\int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx = \frac{4}{3} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)^2} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{1 + \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)$$

Así pues,  $\int \frac{x-3}{x^3+x^2+x} dx = -3 \ln|x| + \frac{3}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{5}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C$

r)  $\int \frac{x^2+3x-2}{(x+1)^2(x+2)^2} dx$

$$\frac{x^2+3x-2}{(x+1)^2(x+2)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x+2} + \frac{D}{(x+2)^2} = \frac{A(x+1)(x+2)^2 + B(x+2)^2 + C(x+1)^2(x+2) + D(x+1)^2}{(x+1)^2(x+2)^2}$$

$$x^2+3x-2 = A(x+1)(x+2)^2 + B(x+2)^2 + C(x+1)^2(x+2) + D(x+1)^2$$

Si  $x = -1 \Rightarrow -4 = B$

Si  $x = -2 \Rightarrow -4 = D$

Si  $x = 0 \Rightarrow -2 = 4A + 4B + 2C + D$

Si  $x = 1$  es  $2 = 18A + 9B + 12C + 4D$

Por tanto,  $B = -4, D = -4, 4A + 2C = 18; 18A + 12C = 54$ , por lo que  $A = 9, C = -9$  y la integral pedida es:

$$\int \frac{x^2+3x-2}{(x+1)^2(x+2)^2} dx = 9 \ln|x+1| + \frac{4}{x+1} - 9 \ln|x+2| + \frac{4}{x+2} + C$$



s)  $\int \frac{(1+x)^3}{\sqrt{x}} dx$

$\frac{(1+x)^3}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{5}{2}}$ , así que  $\int \frac{(1+x)^3}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + 2\sqrt{x^3} + \frac{6}{5}\sqrt{x^5} + \frac{2}{7}\sqrt{x^7} + C$

t)  $\int \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+1}} dx$

Poniendo  $\sqrt{x+1} = t$  y  $\frac{1}{2\sqrt{x+1}} dx = dt$ , se tiene que:

$\int \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+1}} dx = 2 \int \ln t^2 dt = 4(t \ln t - t) = 4\sqrt{x+1} (\ln \sqrt{x+1} - 1) + C$

u)  $\int \frac{5 \cdot 2^x + 3^x}{3^{x-1}} dx$

Operando:  $\frac{5 \cdot 2^x + 3^x}{3^{x-1}} = 15 \left(\frac{2}{3}\right)^x + 3$

Así pues  $\int \frac{5 \cdot 2^x + 3^x}{3^{x-1}} dx = 15 \int \left(\frac{2}{3}\right)^x dx + 3x = \frac{15}{\ln \frac{2}{3}} \left(\frac{2}{3}\right)^x + 3x + C$

v)  $\int \frac{2x+5}{x^2+x+1} dx$

Como  $\frac{2x+5}{x^2+x+1} = \frac{2x+1+4}{x^2+x+1}$ , se tiene que:

$\int \frac{2x+5}{x^2+x+1} dx = \ln(x^2+x+1) + 4 \int \frac{1}{x^2+x+1} dx = \ln(x^2+x+1) + 4 \frac{2}{\sqrt{3}} \arctg \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C$

w)  $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = \int \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} dx - \int \frac{e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$

Llamando  $t = e^x$ ;  $dt = e^x dx$  y  $s = e^{-x}$ ;  $ds = -e^{-x} dx$

$\int \frac{t}{t^2+1} dt + \int \frac{s}{1+s^2} ds = \frac{1}{2} \ln(t^2+1) + \frac{1}{2} \ln(s^2+1) + C = \frac{1}{2} \ln(e^{2x}+1) + \frac{1}{2} \ln(e^{-2x}+1) + C$

x)  $\int \frac{x+2}{\sqrt{x+1}} dx = \int \frac{x+1}{\sqrt{x+1}} dx + \int \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx = \frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} + 2\sqrt{x+1} + C$

y)  $\int \frac{x^2}{1-x^6} dx$  Llamando  $t = x^3 \Rightarrow dt = 3x^2 dx$ :

$\int \frac{x^2}{1-x^6} dx = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{6} \int \frac{dt}{1-t} + \frac{1}{6} \int \frac{dt}{1+t} = -\frac{1}{6} \ln|1-t| + \frac{1}{6} \ln|1+t| + C = -\frac{1}{6} \ln|1-x^3| + \frac{1}{6} \ln|1+x^3| + C$

z)  $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{x+1} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{x+1}} - \int \frac{dx}{x+1} = 2\sqrt{x+1} - \ln|x+1| + C$

90. Sea la función definida  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  por  $f(x) = (1 - x^2)e^{-x}$ . Determina la primitiva de  $f$  cuya gráfica pasa por el punto  $A(-1, 0)$ .

$u = 1 - x^2$	$v' = e^{-x}$
$-2x$	$-e^{-x}$
$-2$	$e^{-x}$
$0$	$-e^{-x}$

$$F(x) = \int (1 - x^2)e^{-x} dx = -(1 - x^2)e^{-x} + 2xe^{-x} + 2e^{-x} + C = (x + 1)^2 e^{-x} + C$$

Como  $F(-1) = 0 \Rightarrow 0 = (-1 + 1)^2 e^1 + C \Rightarrow C = 0$  la función buscada es  $F(x) = (x + 1)^2 e^{-x}$ .

91. A partir de los datos, halla en cada caso la función  $f(x)$ .

a)  $f'(x) = (x - 1)^3(x - 3)$ ,  $f(0) = 1$

$$f(x) = \int (x - 1)^3(x - 3) dx = \int (x^3 - 3x^2 + 3x - 1)(x - 3) dx = \int (x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 10x + 3) dx = \frac{x^5}{5} - \frac{3x^4}{2} + 4x^3 - 5x^2 + 3x + C$$

Como  $f(0) = 1 \Rightarrow C = 1$ , la función buscada es  $f(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{3x^4}{2} + 4x^3 - 5x^2 + 3x + 1$ .

b)  $f'(x) = (3x - 2)^2(x - 2)$ ,  $f(2) = 0$

$$f(x) = \int (3x - 2)^2(x - 2) dx = \int (9x^3 - 30x^2 + 28x - 8) dx = \frac{9}{4}x^4 - 10x^3 + 14x^2 - 8x + C$$

Como  $f(2) = 0 \Rightarrow 0 = \frac{9}{4} \cdot 16 - 10 \cdot 8 + 14 \cdot 4 - 8 \cdot 2 + C \Rightarrow C = 4$ , la función buscada es:

$$f(x) = \frac{9}{4}x^4 - 10x^3 + 14x^2 - 8x + 4.$$

92. Dada la función  $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4} + \frac{\ln(x + 1)}{x + 1}$ , halla  $\int f(x) dx$ .

$$\int \left( \frac{x}{x^2 - 4} + \frac{\ln(x + 1)}{x + 1} \right) dx = \int \frac{x}{x^2 - 4} dx + \int \frac{\ln(x + 1)}{x + 1} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2 - 4| + \frac{1}{2} \ln^2(x + 1) + C$$

93. Halla la integral indefinida  $\int \frac{3x + 7}{(x^2 - 3x + 2)(x - 3)} dx$ .

$$\int \frac{3x + 7}{(x^2 - 3x + 2)(x - 3)} dx = \int \frac{3x + 7}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} dx$$

Debemos integrar una función ración racional por lo que la escribimos como:

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3} = \frac{3x + 7}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}$$

Resolviendo  $\begin{cases} A + B + C = 0 \\ -5A - 4B - 3C = 3 \\ 6A + 3B + 2C = 7 \end{cases}$  obtenemos  $A = 5$ ,  $B = -13$ ,  $C = 8$  y podemos escribir la integral como:

$$\int \frac{3x + 7}{(x^2 - 3x + 2)(x - 3)} dx = \int \frac{5}{x - 1} dx + \int \frac{-13}{x - 2} dx + \int \frac{8}{x - 3} dx = 5 \ln|x - 1| - 13 \ln|x - 2| + 8 \ln|x - 3| + C$$

94. Calcula las siguientes integrales.

a)  $\int \sqrt{1-4x^2} dx$

c)  $\int \sqrt{1-(2x-1)^2} dx$

b)  $\int \sqrt{6x-x^2-8} dx$

d)  $\int \sqrt{3-x^2+2x} dx$

(Pista:  $\int \sqrt{1-x^2} dx$  se calcula con el cambio  $x = \text{sent}$ ).

a)  $\int \sqrt{1-4x^2} dx = \int \sqrt{1-(2x)^2} dx$

Haciendo  $2x = t$  y  $2dx = dt$ , se tiene que  $\int \sqrt{1-4x^2} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{1-t^2} dt$ .

Poniendo ahora  $t = \text{sen } u$  y  $dt = \text{cos } u du$  se tiene:

$$\frac{1}{2} \int \text{cos}^2 u du = \frac{1}{2} \left( \frac{u}{2} + \frac{\text{sen } 2u}{4} \right) = \frac{1}{2} (\text{arcsen } t + t\sqrt{1-t^2}) = \frac{1}{2} (\text{arcsen } 2x + 2x\sqrt{1-4x^2}) + C$$

b)  $\int \sqrt{6x-x^2-8} dx$

Como  $6x-x^2-8 = 1-(x-3)^2$ , se tiene que  $\int \sqrt{6x-x^2-8} dx = \int \sqrt{1-(x-3)^2} dx$ .

Haciendo  $x-3 = t$  y  $dx = dt$  se tiene:

$$\int \sqrt{1-t^2} dt = \frac{1}{2} (\text{arcsen } t + t\sqrt{1-t^2}) = \frac{1}{2} (\text{arcsen } (x-3) + (x-3)\sqrt{1-(x-3)^2}) + C$$

c)  $\int \sqrt{1-(2x-1)^2} dx$

Haciendo  $2x-1 = t$  y  $2dx = dt$ , se tiene que:

$$\int \sqrt{1-(2x-1)^2} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{1-t^2} dt = \frac{1}{4} (\text{arcsen } t + t\sqrt{1-t^2}) = \frac{1}{4} (\text{arcsen } (2x-1) + (2x-1)\sqrt{1-(2x-1)^2}) + C$$

d)  $\int \sqrt{3-x^2+2x} dx$

Como  $3-x^2+2x = 4-(x-1)^2$ , se tiene que  $\int \sqrt{3-x^2+2x} dx = \int \sqrt{4-(x-1)^2} dx$ .

Haciendo  $x-1 = 2t$  y  $dx = 2dt$ , se tiene:

$$2 \int \sqrt{4-4t^2} dt = 4 \int \sqrt{1-t^2} dt = 2 (\text{arcsen } t + t\sqrt{1-t^2}) = 2 \left( \text{arcsen } \frac{x-1}{2} + \frac{x-1}{2} \sqrt{1-\left(\frac{x-1}{2}\right)^2} \right) + C$$

95. Escribe como integral de un cociente de polinomios  $\int \sqrt{x^2-1} dx$  y resuélvela (haz el cambio  $x = \frac{1}{\operatorname{sen} t}$ ).

Poniendo  $x = \frac{1}{\operatorname{sen} t}$  y  $dx = \frac{-\cos t}{\operatorname{sen}^2 t} dt$ , la integral dada se transforma en  $-\int \frac{\cos^2 t}{\operatorname{sen}^3 t} dt$ .

Haciendo en esta última integral  $\cos t = u$  y  $-\operatorname{sen} t dt = du$ , se tiene que  $\int \frac{u^2}{(1-u^2)^2} du$ , cociente de polinomios.

$$\frac{u^2}{(1-u^2)^2} = \frac{A}{1+u} + \frac{B}{(1+u)^2} + \frac{C}{1-u} + \frac{D}{(1-u)^2} = \frac{A(1+u)(1-u)^2 + B(1-u)^2 + C(1-u)(1+u)^2 + D(1+u)^2}{(1+u)^2(1-u)^2}$$

En la igualdad  $u^2 = A(1+u)(1-u)^2 + B(1-u)^2 + C(1-u)(1+u)^2 + D(1+u)^2$ , haciendo:

$$u = 1 \Rightarrow 1 = 4D \Rightarrow D = \frac{1}{4}$$

$$u = -1 \Rightarrow 1 = 4B \Rightarrow B = \frac{1}{4}$$

$$\left. \begin{array}{l} u = 0 \Rightarrow 0 = A + B + C + D \\ u = 2 \Rightarrow 4 = 3A + B - 9C + 9D \end{array} \right\} \Rightarrow A = C = -\frac{1}{4}$$

La integral será:

$$\int \frac{u^2}{(1-u^2)^2} du = -\frac{1}{4} \ln|1+u| - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1+u} + \frac{1}{4} \ln|1-u| + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1-u} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u}{1-u^2} - \frac{1}{4} \ln \frac{1+u}{1-u}$$

Deshaciendo el cambio, se tiene:

$$\frac{u}{1-u^2} = \frac{\cos t}{\operatorname{sen}^2 t} = \frac{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{\frac{1}{x^2}} = x\sqrt{x^2-1}$$

$$\frac{1+u}{1-u} = \frac{1+\cos t}{1-\cos t} = \frac{1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{1-\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} = \frac{x+\sqrt{x^2-1}}{x-\sqrt{x^2-1}} = (x+\sqrt{x^2-1})^2$$

$$\text{Luego } \int \sqrt{x^2-1} dx = \int \frac{u^2}{(1-u^2)^2} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u}{1-u^2} - \frac{1}{4} \ln \frac{1+u}{1-u} = \frac{1}{2} (x\sqrt{x^2-1} - \ln|x+\sqrt{x^2-1}|) + C$$

96. a) ¿Cuándo una función  $F(x)$  es una primitiva de otra función  $f(x)$ ?

b) Con el cambio de variable  $t = \sqrt{x-1}$ , halla la primitiva de la función  $f(x) = x\sqrt{x-1}$  cuya gráfica pasa por el punto  $(1, 0)$ .

a) Cuando  $F'(x) = f(x)$ .

b) Llamando  $t = \sqrt{x-1} \Rightarrow x = t^2 + 1$  y  $dx = 2tdt$

$$F(x) = \int x\sqrt{x-1} dx = \int (t^2+1)t \cdot 2tdt = \int (2t^4 + 2t^2) dt = \frac{2}{5} t^5 + \frac{2}{3} t^3 + C = \frac{2}{5} (\sqrt{x-1})^5 + \frac{2}{3} (\sqrt{x-1})^3 + C$$

$$\text{Como } F(1) = 0 \Rightarrow \frac{2}{5} (\sqrt{1-1})^5 + \frac{2}{3} (\sqrt{1-1})^3 + C = 0 \Rightarrow C = 0 \text{ y la función es } F(x) = \frac{2}{5} \sqrt{x-1} (x-1)^2 + \frac{2}{3} \sqrt{x-1} (x-1).$$

CUESTIONES

97. Observando que si  $F(x) = f(x)g(x)$  entonces  $F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ , encuentra  $f(x)$  y  $g(x)$  en los casos siguientes y decide quién es  $F(x)$ :

a)  $F'(x) = 2xe^x + x^2e^x$

$f(x) = x^2$  y  $g(x) = e^x$  y  $F(x) = x^2e^x$

b)  $F'(x) = 2x\cos x - x^2\sin x$

$f(x) = x^2$  y  $g(x) = \cos x$  y  $F(x) = x^2\cos x$

c)  $F'(x) = \frac{1}{x}\sin x + \ln x \cos x$

$f(x) = \ln x$  y  $g(x) = \sin x$  y  $F(x) = \ln x \sin x$

d)  $F'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x$

$f(x) = e^x$  y  $g(x) = \sin x$  y  $F(x) = e^x \sin x$

e)  $F'(x) = e^x \sin x - e^x \cos x = -e^x \cos x + e^x \sin x$

$f(x) = -e^x$  y  $g(x) = \cos x$  y  $F(x) = -e^x \cos x$

f)  $F'(x) = 1 + \ln x = \frac{1}{x} \cdot x + \ln x \cdot 1$

$f(x) = \ln x$  y  $g(x) = x$  y  $F(x) = x \ln x$

98. Un estudiante no maneja el método de integración por partes y tiene que calcular  $\int xe^x dx$ . Como le han explicado que todas las primitivas de  $f(x) = xe^x$  son de la forma  $F(x) = Axe^x + Be^x$  con  $A$  y  $B$  números reales, se ha basado en ello para resolver el problema. ¿Cómo lo hizo?

Como  $F(x)$  debe ser igual a  $xe^x$ , derivó  $F(x)$  y obtuvo:

$$F'(x) = Ae^x + Axe^x + Be^x = xe^x \text{ para todo } x.$$

Si  $x=0$  obtenemos  $A+B=0$  y si  $x=1$  obtenemos  $2Ae+Be=e$  por lo que  $A=1$  y  $B=-1$  y la primitiva buscada es  $F(x) = xe^x - e^x$ .

99. ¿Qué curva pasa por  $(0, 8)$  y en cada punto  $(x, y)$  de su gráfica la pendiente de la tangente es  $3x^2y$  ?

La pendiente de la tangente en el punto  $(x, f(x))$  es  $f'(x)$  por lo que  $f'(x) = 3x^2f(x) \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = 3x^2$

Así pues  $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int 3x^2 dx$ . Luego  $\ln|f(x)| = x^3 + C \Rightarrow f(x) = e^{x^3+C} = e^{x^3} \cdot D$

Como  $f(0) = 1 \cdot D = 8 \Rightarrow D = 8$

La función buscada es  $f(x) = 8e^{x^3}$ .

100. Justifica que si  $\int \frac{1}{x^2+bx+c} dx = \int \frac{1}{(x+p)^2+q^2} dx$ , entonces  $\int \frac{1}{x^2+bx+c} dx = \frac{1}{q} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+p}{q}\right) + C$ .

$$\text{Como } \int \frac{1}{(x+p)^2+q^2} dx = \int \frac{1}{q^2 \left[ \left(\frac{x+p}{q}\right)^2 + 1 \right]} dx = \frac{1}{q} \int \frac{\frac{1}{q}}{\left[ \left(\frac{x+p}{q}\right)^2 + 1 \right]} dx$$

Llamando  $t = \frac{x+p}{q} \Rightarrow dt = \frac{1}{q} dx$  se tiene que:

$$\frac{1}{q} \int \frac{\frac{1}{q}}{\left[ \left(\frac{x+p}{q}\right)^2 + 1 \right]} dx = \frac{1}{q} \int \frac{dt}{t^2+1} dx = \frac{1}{q} \operatorname{arctg} t + C = \frac{1}{q} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+p}{q}\right) + C.$$

101. Justifica que  $\int \ln^n x dx = x \ln^n x - n \int \ln^{n-1} x dx$  y calcula  $\int \ln^3 x dx$ .

Llamando  $f(x) = \ln^n x$  y  $g'(x) = 1$  se tiene que  $f'(x) = \frac{n \ln^{n-1} x}{x}$  y  $g(x) = x$ .

Integrando por partes  $\int \ln^n x dx = x \ln^n x - \int x \cdot \frac{n \ln^{n-1} x}{x} dx = x \ln^n x - n \int \ln^{n-1} x dx$ .

$$\int \ln^3 x dx = x \ln^3 x - 3 \int \ln^2 x dx = x \ln^3 x - 3(x \ln^2 x - 2 \int \ln x dx) = x \ln^3 x - 3x \ln^2 x + 6(x \ln x - \int dx) = x \ln^3 x - 3x \ln^2 x + 6x \ln x - 6x + C$$

102. Sea  $f$  una función derivable. Al calcular  $\int f(x) \cos 2x dx$  se obtiene:

$$\int f(x) \cos 2x dx = \frac{1}{2} f(x) \operatorname{sen} 2x - \int e^{2x} \operatorname{sen} 2x dx$$

Si  $f(0) = \frac{1}{2} e^2$ , calcula  $f(x)$ .

Hemos integrado por partes llamando  $f(x) = f(x)$  y  $g'(x) = \cos 2x$ .

Como  $g(x) = g(x) = \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2x$  la integral quedaría:

$$\int f(x) \cos 2x dx = \frac{1}{2} f(x) \operatorname{sen} 2x - \int \frac{1}{2} f'(x) \operatorname{sen} 2x dx. \text{ Así pues, } \int \frac{1}{2} f'(x) \operatorname{sen} 2x dx = \int e^{2x} \operatorname{sen} 2x dx \text{ y, por tanto } f'(x) = 2e^{2x} \text{ por lo que } f(x) = e^{2x} + C.$$

Como queremos que  $f(0) = e^{2 \cdot 0} + C = 1 + C = \frac{1}{2} e^2 \Rightarrow C = \frac{1}{2} e^2 - 1$  y la función buscada es  $f(x) = e^{2x} + \frac{1}{2} e^2 - 1$ .

103. Al calcular  $\int \frac{1}{1+x^2} dx$ , un estudiante observa que  $\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{x^2} \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}$  y como  $-\frac{1}{x^2}$  es la derivada de  $\frac{1}{x}$ , se dice que  $\int \frac{1}{1+x^2} dx = -\operatorname{arctg} \frac{1}{x} + C$ . ¿Pero  $\int \frac{1}{1+x^2} dx$  no era  $\operatorname{arctg} x + C$ ? ¿Hay algún error en el razonamiento del estudiante?

No, no hay ningún error en el razonamiento, lo que ocurre es que esas dos funciones solo difieren en la constante  $\left(\frac{\pi}{2}\right)$  y, por tanto, ambas son primitivas de la función  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ .

PROBLEMAS

104. La integral  $\int \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{3 + \operatorname{sen} 2x} dx$  es una integral racional en  $\operatorname{sen} x$  y  $\cos x$  por lo que el cambio  $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$  la resolvería. Pero el cálculo es mucho más cómodo si se busca una función  $g(x)$  tal que  $g'(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$  y se hace  $g(x) = t$  y  $g'(x)dx = dt$ . Hazlo así.

Si  $g'(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$ , entonces  $g(x) = -\cos x + \operatorname{sen} x$ , por lo que  $g^2(x) = 1 - \operatorname{sen} 2x$ .

Así pues la integral  $\int \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{3 + \operatorname{sen} 2x} dx$ , se puede escribir como  $\int \frac{g'(x) dx}{4 - g^2(x)}$  que, con  $g(x) = t$  y  $g'(x)dx = dt$ , se transforma en  $\int \frac{dt}{4 - t^2}$ . Descomponiendo en fracciones simples:

$$\frac{1}{4 - t^2} = \frac{A}{2+t} + \frac{B}{2-t} = \frac{A(2-t) + B(2+t)}{4 - t^2} \text{ se tiene que } 1 = A(2-t) + B(2+t) \text{ y haciendo } t = 2 \Rightarrow 1 = 4B \Rightarrow B = \frac{1}{4} \text{ y}$$

$$t = -2 \Rightarrow 1 = 4A \Rightarrow A = \frac{1}{4}$$

$$\text{Luego } \int \frac{dt}{4 - t^2} = \frac{1}{4} \ln|2+t| - \frac{1}{4} \ln|2-t| = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+t}{2-t} \right|$$

$$\text{Así pues } \int \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{3 + \operatorname{sen} 2x} dx = \frac{1}{4} \ln \frac{2 + \operatorname{sen} x - \cos x}{2 + \cos x - \operatorname{sen} x} + C.$$

105. Halla  $\int \frac{e^x}{(3 + e^x)\sqrt{e^x - 1}} dx$  con un cambio de variable.

Si  $e^x - 1 = t^2$  y  $e^x dx = 2t dt$ , se tiene que:

$$\int \frac{e^x}{(3 + e^x)\sqrt{e^x - 1}} dx = \int \frac{2t dt}{(t^2 + 4)t} = \int \frac{2 dt}{4 + t^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1 + \left(\frac{t}{2}\right)^2} = \operatorname{arctg} \frac{t}{2} = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{e^x - 1}}{2} + C$$

106. Calcula una primitiva de la función  $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$  de modo que  $F(2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2+1)}{x}$ .

$$F(x) = \int \frac{dx}{1-x^2} = \int \frac{dx}{(1-x)(1+x)} = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1-x} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x} dx = -\frac{1}{2} \ln|1-x| + \frac{1}{2} \ln|1+x| + C$$

Como  $F(2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x^2+1} = 0$ , queremos que:

$$F(2) = -\frac{1}{2} \ln|1-2| + \frac{1}{2} \ln|1+2| + C = \frac{1}{2} \ln 3 + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{2} \ln 3.$$

$$\text{Luego } F(x) = \frac{1}{2} \ln|1-x| - \frac{1}{2} \ln|1+x| - \frac{1}{2} \ln 3$$

107. Si para calcular  $\int f(x) \operatorname{sen} x dx$ , donde  $f$  es una cierta función derivable, se aplica integración por partes, se obtiene:

$$\int f(x) \operatorname{sen} x dx = -f(x) \cos x + \int 3x^2 \cos x dx$$

Sabiendo que  $f(1) = 2$ , encuentra la expresión de  $f$ .

Si  $\int f(x) \operatorname{sen} x dx = -f(x) \cos x + \int 3x^2 \cos x dx$  se tiene que  $f'(x) = 3x^2$ , por lo que  $f(x) = x^3 + C$ .

Como  $f(1) = 2 \Rightarrow 2 = 1^3 + C \Rightarrow C = 1$ , luego  $f(x) = x^3 + 1$ .

108. En un examen se ha pedido a los estudiantes que resuelvan la integral  $\int 2 \operatorname{sen} x \cos x dx$ .

I. Gema la resolvió con el cambio de variable  $u = \operatorname{sen} x$ .

II. Fernando utilizó el cambio de variable  $u = \cos x$ .

III. Iván lo hizo usando la fórmula  $2 \operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{sen} 2x$ .

Aunque los tres alumnos dieron respuestas distintas, sin embargo, el profesor les dijo que los tres la habían hecho bien.

Encuentra las tres respuestas dadas y explica por qué todas eran correctas sin ser iguales.

$$\text{Gema: } u = \operatorname{sen} x \Rightarrow du = \cos x dx \Rightarrow \int 2 \operatorname{sen} x \cos x dx = \int 2u du = u^2 + C = \operatorname{sen}^2 x + C$$

$$\text{Fernando: } u = \cos x \Rightarrow du = -\operatorname{sen} x dx \Rightarrow \int 2 \operatorname{sen} x \cos x dx = -\int 2u du = -u^2 + C = -\cos^2 x + C$$

$$\text{Iván: } 2 \operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{sen} 2x \Rightarrow \int 2 \operatorname{sen} x \cos x dx = \int \operatorname{sen} 2x dx = -\frac{1}{2} \cos 2x + C$$

Las tres respuestas son correctas, pues difieren solo en una constante.

$$\text{En efecto, } \operatorname{sen}^2 x = -\cos^2 x + 1, \quad -\frac{1}{2} \cos 2x = -\cos^2 x + \frac{1}{2}.$$



**109. Un punto se mueve en línea recta con una velocidad dada por la fórmula  $v(t) = 12t - 5$  (m/s).**

Calcula el espacio recorrido,  $e(t)$ , en cada instante  $t$ , sabiendo que  $e(0) = 10$  m. ¿Cuál es la velocidad media entre  $t = 0$  s y  $t = 2$  s? (Recuerda que la velocidad es la derivada del espacio respecto del tiempo).

Se sabe que  $e(t) = \int v(t)dt = \int (12t - 5)dt = 6t^2 - 5t + C$ .

Como  $e(0) = 10 \Rightarrow C = 10$  entonces  $e(t) = 6t^2 - 5t + 10$ .

La velocidad media es  $v_m(0, 2) = \frac{e(2) - e(0)}{2 - 0} = 7$  m/s.

**110. Se trasplanta un árbol y se observa que su tasa de crecimiento a los  $x$  años es de  $1 - \frac{1}{(x+1)^2}$  metros por año. Si a los 5 años medía 5 m, ¿cuánto medía al ser trasplantado?**

La tasa de crecimiento es la derivada de la función que mide la altura, luego  $C(x) = \int 1 - \frac{1}{(x+1)^2} dx = x + \frac{1}{x+1} + C$ .

Como  $5 = C(5) = 5 + \frac{1}{6} + C \Rightarrow C = -\frac{1}{6}$ .

Luego  $C(x) = x + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{6} \Rightarrow C(0) = \frac{5}{6}$ . Por tanto, al ser trasplantado medía  $\frac{5}{6}$  m.

**111. Calcula  $\int \frac{x^3}{(x-1)^2} dx$ .**

a) Por fracciones simples.

b) Mediante el cambio  $t = x - 1$ .

a)  $\frac{x^3}{(x-1)^2} = x + 2 + \frac{3x-2}{(x-1)^2}$  y descomponiendo la fracción se tiene que  $\frac{3x-2}{(x-1)^2} = \frac{3}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$ .

Luego  $\int \frac{x^3}{(x-1)^2} dx = \int (x+2) dx + \int \frac{1}{(x-1)^2} dx + \int \frac{3}{x-1} dx = \frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{1}{x-1} + 3\ln|x-1| + C$ .

b) Si se hace el cambio  $t = x - 1$  y  $dt = dx$  se tiene:

$$\int \frac{x^3}{(x-1)^2} dx = \int \frac{(t+1)^3}{t^2} dt = \int \left( t + 3 + \frac{3}{t} + \frac{1}{t^2} \right) dt = \frac{1}{2}t^2 + 3t + 3\ln|t| - \frac{1}{t} = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 3(x-1) + 3\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C$$

Observa que  $\frac{1}{2}(x-1)^2 + 3(x-1) = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2} + 3x - 3 = \frac{1}{2}x^2 + 2x + C$ .

**112. Encuentra en cada caso la función  $y = f(x)$  tal que:**

a)  $f'(x) = -3xf(x)$  y corta al eje  $Y$  en el punto de ordenada 1.

b)  $f'(x) = \frac{x}{f(x) + x^2 f(x)}$  y  $f(0) = -1$ .

c) Su gráfica pasa por  $(0, 0)$  y  $f'(x) = x^2 f^2(x) + x^2 - f^2(x) - 1$ .

a) Como  $f'(x) = -3xf(x)$ , entonces  $-3x = \frac{f'(x)}{f(x)} = (\ln f(x))'$ . Así pues,  $\int -3x dx = \int (\ln f(x))' dx$  y por tanto  $-\frac{3}{2}x^2 + C = \ln f(x)$ . Se tiene entonces que  $f(x) = e^{(-\frac{3}{2}x^2 + C)} = e^{-\frac{3}{2}x^2} \cdot C'$  y como se sabe que  $f(0) = 1$  se tiene que  $C' = 1$ . Luego la función buscada es  $f(x) = e^{-\frac{3}{2}x^2}$ .

b)  $f'(x) = \frac{x}{f(x) + x^2 f(x)} = \frac{x}{f(x)(1+x^2)}$  y por tanto  $\frac{x}{(1+x^2)} = f'(x) \cdot f(x) = \frac{1}{2}((f(x))^2)'$

$$\text{Así pues, } \int \frac{x}{(1+x^2)} dx = \frac{1}{2} \int ((f(x))^2)' dx \Rightarrow \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C = \frac{1}{2} (f(x))^2$$

Luego puede ser  $f(x) = \pm \sqrt{\ln(1+x^2) + C}$  y como  $f(0) = -1$ , entonces debe ser  $f(x) = -\sqrt{\ln(1+x^2) + 1}$ .

c)  $f'(x) = f^2(x)(x^2 - 1) + x^2 - 1 = (f^2(x) + 1)(x^2 - 1)$ , luego  $(x^2 - 1) = \frac{f'(x)}{(f^2(x) + 1)} = (\arctg(f(x)))'$

$$\text{Así pues, } \int (x^2 - 1) dx = \int (\arctg(f(x)))' dx \text{ y por tanto } \frac{1}{3}x^3 - x + C = \arctg(f(x)) \Rightarrow f(x) = \text{tg}\left(\frac{1}{3}x^3 - x + C\right)$$

Como  $f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$ . Luego la función buscada es  $f(x) = \text{tg}\left(\frac{1}{3}x^3 - x\right)$ .

**113. Halla el polinomio de grado dos  $P(x)$  tal que  $P(0) = 1$ ,  $P'(0) = 0$  y  $\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2} dx$  sea una función racional.**

Se pide encontrar el polinomio  $P(x) = ax^2 + 1$ , y tal que  $\int \frac{ax^2 + 1}{x^3(x-1)^2} dx$  sea una función racional.

Si se descompone el integrando en fracciones simples, se obtiene:

$\frac{ax^2 + 1}{x^3(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x-1} + \frac{E}{(x-1)^2}$  y para que  $\int \frac{ax^2 + 1}{x^3(x-1)^2} dx$  sea una función racional, debería ocurrir que  $A = 0$  y  $D = 0$  por lo que la descomposición tomaría la forma:

$$\frac{ax^2 + 1}{x^3(x-1)^2} = \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{E}{(x-1)^2} = \frac{B(x-1)^2 x + C(x-1)^2 + Ex^3}{x^3(x-1)^2}$$


Así pues  $ax^2 + 1 = (B+E)x^3 + x^2(-2B+C) + x(B-2C) + C$ , con lo que, identificando coeficientes, se tiene que:

$C = 1$ ,  $B - 2C = 0$ ,  $-2B + C = a$  y  $B + E = 0$ , es decir,  $C = 1$ ,  $B = 2$ ,  $a = -3$ ,  $E = -2$ .

Por tanto, el polinomio pedido es  $P(x) = -3x^2 + 1$ .

**114. La aceleración de un móvil con trayectoria rectilínea viene dada por la gráfica siguiente:**

Si se sabe que para  $t = 0$ , su posición era  $x(0) = 0$  y su velocidad inicial también era  $v(0) = 0$ , determina las ecuaciones que dan la aceleración, la velocidad y la posición de dicho móvil para cualquier instante de tiempo. Recuerda que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo.



A la vista de la gráfica, se deduce la ecuación de la aceleración es  $a(t) = 2t$ . De este modo:

$$v(t) = \int a(t) dt = \int 2t dt = t^2 + C \quad \text{Como } v(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow v(t) = t^2$$

$$x(t) = \int v(t) dt = \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + C \quad \text{Como } x(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow x(t) = \frac{t^3}{3}$$

## PARA PROFUNDIZAR

### 115. Demuestra las siguientes fórmulas de reducción.

a)  $\int \operatorname{sen}^n x \, dx = -\frac{1}{n} \operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx$  con  $n$  par mayor que 2.

$\int \operatorname{sen}^n x \, dx = \int \operatorname{sen}^{n-1} x \operatorname{sen} x \, dx$ , que llamando  $f(x) = \operatorname{sen}^{n-1} x$  y  $g'(x) = \operatorname{sen} x$ , resulta ser:

$$\begin{aligned} \int \operatorname{sen}^n x \, dx &= -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \operatorname{sen}^{n-2} x \cos^2 x \, dx = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \operatorname{sen}^{n-2} x (1 - \operatorname{sen}^2 x) \, dx = \\ &= -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1) \int (\operatorname{sen}^{n-2} x - \operatorname{sen}^n x) \, dx \end{aligned}$$

Así pues,  $\int \operatorname{sen}^n x \, dx = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x - (n-1) \int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx + (n-1) \int \operatorname{sen}^n x \, dx$ , es decir:

$$n \int \operatorname{sen}^n x \, dx = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx \Rightarrow \int \operatorname{sen}^n x \, dx = -\frac{1}{n} \operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx.$$

b)  $\int \cos^n x \, dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \operatorname{sen} x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx$  con  $n$  par mayor que 2.

De forma análoga resultaría la fórmula pedida, pero podría ser más cómodo si se escribe:

$\int \cos^n x \, dx = \int \operatorname{sen}^n \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \, dx$  y, llamando  $\frac{\pi}{2} - x = t$  y  $-dx = dt$ , quedaría  $-\int \operatorname{sen}^n t \, dt$ . Luego volviendo al apartado a):

$$-\left( -\frac{1}{n} \operatorname{sen}^{n-1} \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \cos \left( \frac{\pi}{2} - x \right) - \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \, dx \right) = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \operatorname{sen} x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx$$

Obsérvese que estas fórmulas son válidas aunque  $n$  no fuera par. La observación de  $n$  par tiene sentido pues si  $n$  fuera impar sería mucho más cómodo hacer la integral directamente sin acudir a ninguna fórmula de reducción.

c)  $\int \frac{1}{(1+x^2)^n} \, dx = \frac{1}{2n-2} \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} \int \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \, dx$

Se tiene que  $\frac{1}{(1+x^2)^n} = \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} - \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ ,

por lo que  $\int \frac{1}{(1+x^2)^n} \, dx = \int \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \, dx - \int \frac{x^2}{(1+x^2)^n} \, dx$ .

Para resolver  $\int \frac{x^2}{(1+x^2)^n} \, dx$ , sea  $f(x) = x$ ,  $g'(x) = \frac{x}{(1+x^2)^n} \Rightarrow g(x) = \frac{1}{2} (1+x^2)^{1-n} \frac{1}{1-n}$ .

De este modo:  $\int \frac{1}{(1+x^2)^n} \, dx = \int \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \, dx - \left( \frac{1}{2(1-n)} \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} \int \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \, dx \right)$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1+x^2)^n} \, dx &= \frac{-1}{2-2n} \cdot \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + \int \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \, dx - \frac{1}{2n-2} \int \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \, dx = \\ &= \frac{-1}{2-2n} \cdot \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + \left( 1 - \frac{1}{2n-2} \right) \int \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \, dx = \frac{-1}{2-2n} \cdot \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} \int \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \, dx \end{aligned}$$

116. Utilizando las fórmulas deducidas en los apartados a) y b) del ejercicio anterior, obtén:

a)  $\int \cos^4 x \, dx = \frac{1}{4} \cos^3 x \sin x + \frac{3}{4} \int \cos^2 x \, dx$

Finalmente, como  $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$  sustituyendo en la última integral, se tiene que:

$$\int \cos^4 x \, dx = \frac{1}{4} \cos^3 x \sin x + \frac{3}{8} \left( x + \frac{\sin 2x}{2} \right) + C$$

b)  $\int \sin^6 x \, dx = -\frac{1}{6} \sin^5 x \cos x + \frac{5}{6} \int \sin^4 x \, dx$ .

Ahora  $\int \sin^4 x \, dx = -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{4} \int \sin^2 x \, dx$

Finalmente, como  $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ , sustituyendo en la última integral, se tiene que:

$$\begin{aligned} \int \sin^6 x \, dx &= -\frac{1}{6} \sin^5 x \cos x + \frac{5}{6} \left( -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \left( x - \frac{\sin 2x}{2} \right) \right) = \\ &= -\frac{1}{6} \sin^5 x \cos x - \frac{5}{24} \sin^3 x \cos x + \frac{5}{16} \left( x - \frac{\sin 2x}{2} \right) + C \end{aligned}$$

117. Obtén  $\int e^{-x} x^5 \, dx$  de dos formas diferentes:

a) Por partes, utilizando el método de la tabla.

b) Utilizando que  $\int e^{-x} x^5 \, dx = e^{-x}(a_0 + a_1 x + \dots + a_5 x^5) = l(x)$  y obteniendo los coeficientes  $a_i$  por derivación.

a)

$f$	$g'$
$x^5$	$e^{-x}$
$5x^4$	$-e^{-x}$
$20x^3$	$e^{-x}$
$60x^2$	$-e^{-x}$
$120x$	$e^{-x}$
$120$	$-e^{-x}$
$0$	$e^{-x}$

$$\int e^{-x} x^5 \, dx = -x^5 e^{-x} - 5x^4 e^{-x} - 20x^3 e^{-x} - 60x^2 e^{-x} - 120x e^{-x} - 120e^{-x} + C = -e^{-x}(x^5 + 5x^4 + 20x^3 + 60x^2 + 120x + 120) + C$$

b)  $\int e^{-x} x^5 \, dx = (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5) e^{-x}$

Derivando:

$$\begin{aligned} e^{-x} x^5 &= (a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + 5a_5 x^4) e^{-x} - e^{-x}(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5) \Rightarrow \\ &\Rightarrow e^{-x} x^5 \, dx = -e^{-x} (a_5 x^5 + (a_4 - 5a_5) x^4 + (a_3 - 4a_4) x^3 + (a_2 - 3a_3) x^2 + (a_1 - 2a_2) x + a_0 - a_1) \end{aligned}$$

Así pues, identificando coeficientes, se tiene que:

$$a_5 = -1, \quad a_4 = -5, \quad a_3 = -20, \quad a_2 = -60, \quad a_1 = -120, \quad a_0 = -120$$

$$\int e^{-x} x^5 \, dx = -e^{-x}(x^5 + 5x^4 + 20x^3 + 60x^2 + 120x + 120) + C$$

118. Expresa como integrales de cocientes de polinomios las siguientes integrales.

a)  $\int \frac{\sqrt[3]{x} + 2}{x + \sqrt[4]{x}} dx$

b)  $\int \frac{x + \sqrt[3]{\frac{x-1}{x-2}}}{x^2 - 2\sqrt{\frac{x-1}{x-2}}} dx$

a) Si  $x = t^{12}$  y  $dx = 12t^{11}dt$ , se tiene  $\int \frac{\sqrt[3]{x} + 2}{x + \sqrt[4]{x}} dx = 12 \int \frac{t^4 + 2}{t^{12} + t^3} t^{11} dt = 12 \int \frac{t^{12} + 2t^8}{1 + t^9} dt$ .

b) Si  $\frac{x-1}{x-2} = t^6$ , es decir,  $x-1 = t^6 x - 2t^6 \Rightarrow 2t^6 - 1 = x(t^6 - 1) \Rightarrow x = \frac{2t^6 - 1}{t^6 - 1}$  y, de este modo, se tiene

entonces:  $dx = \frac{12t^5(t^6 - 1) - 6t^5(2t^6 - 1)}{(t^6 - 1)^2} dt = \frac{-6t^5}{(t^6 - 1)^2} dt$

c) Por tanto,  $\int \frac{x + \sqrt[3]{\frac{x-1}{x-2}}}{x^2 - 2\sqrt{\frac{x-1}{x-2}}} dx = -6 \int \frac{\frac{2t^6 - 1}{t^6 - 1} + t^2}{\left(\frac{2t^6 - 1}{t^6 - 1}\right)^2 - 2t^3} \cdot \frac{t^5}{(t^6 - 1)^2} dt$ , que es una integral cociente de polinomios.

119. Demuestra que las siguientes integrales se pueden reducir a integrales de cocientes de polinomios.

a)  $\int x^{-2\sqrt[3]{1-x}} dx$

b)  $\int \sqrt[4]{x}(1-x)^2 dx$

c)  $\int x^{\frac{1}{3}}(1-x)^{\frac{5}{3}} dx$

a) Si  $1-x = t^3$  y  $-dx = 3t^2 dt$ , se tiene  $\int x^{-2\sqrt[3]{1-x}} dx = -\int \frac{1}{(1-t^3)^2} 3t^3 dt$ .

b) Haciendo  $x = t^4$  y  $dx = 4t^3 dt$ , se tiene  $\int \sqrt[4]{x}(1-x)^2 dx = \int t(1-t^4)^2 4t^3 dt$ .

c)  $\int x^{\frac{1}{3}}(1-x)^{\frac{5}{3}} dx = \int \left(\frac{1-x}{x}\right)^{\frac{5}{3}} x^2 dx$  pues  $2 - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$

Así  $\int x^{\frac{1}{3}}(1-x)^{\frac{5}{3}} dx = \int x^2 \sqrt[3]{\left(\frac{1-x}{x}\right)^5} dx$  y haciendo  $\frac{1-x}{x} = t^3$ , es decir,  $1-x = xt^3 \Rightarrow 1 = x(t^3 + 1) \Rightarrow x = \frac{1}{t^3 + 1}$  y

$dx = \frac{-3t^2}{(t^3 + 1)^2} dt$ , se transformaría en  $-3 \int \frac{1}{(t^3 + 1)^2} t^5 \frac{t^2}{(t^3 + 1)^2} dt$ , que es un cociente de polinomios.

120. Sean  $p$  y  $q$  números racionales. Demuestra que  $\int x^p(1-x)^q dx$  se puede poner como integral de un cociente de polinomios si se cumple alguna de estas condiciones:

I.  $p$  es entero.

II.  $q$  es entero.

III.  $p$  y  $q$  son no enteros pero  $p+q$  sí.

En el ejercicio anterior, se ha visto que  $\int x^p(1-x)^q dx$  con  $p$  y  $q$  racionales se podría poner como cociente de polinomios, al menos en estos tres casos:  $p = -2$ ,  $q = 2$ ,  $p+q = \frac{1}{3} + \frac{5}{3} = 2$

En general, procediendo exactamente igual que antes, si  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{Z}$  o  $p+q \in \mathbb{Z}$ , la integral dada se convierte en cociente de polinomios:

En a, si  $q = \frac{m}{n}$ , se toma  $1-x = t^n$ .

En c, si  $p = \frac{m}{n}$ , se toma  $x = t^n$  en b se escribe  $x^p(1-x)^q$  como  $\left(\frac{1-x}{x}\right)^q x^{p+q}$ , y si  $q = \frac{m}{n}$ , se toma  $\frac{1-x}{x} = t^n$ .

121. El matemático ruso Tchebycheff (1821–1894) probó que las integrales  $\int x^p(1-x)^q dx$  solo son elementales en los tres casos citados en el ejercicio anterior. Utiliza este resultado para demostrar estas afirmaciones:

- a)  $\int \sqrt{1-x^3} dx$  no es elemental.
- b)  $\int (1-x^n)^{\frac{1}{m}} dx$  con  $n$  y  $m$  enteros positivos es elemental si y solo si  $m \mid n$  o  $m = n = 2$ .
- c)  $\int \sqrt{\sin x} dx$  no es elemental.
- d)  $\int \sin^p x \cos^q x dx$  siendo  $p$  y  $q$  números racionales, solo es elemental cuando alguno de los dos es un entero impar o cuando  $p+q$  es un entero par.
- e)  $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^n}} dx$  con  $n$  entero positivo, es elemental solo si  $n = 1, 2$  o  $4$ . Calcula la integral en los tres casos.
- f)  $\int \sin^q x dx$  con  $q$  racional es elemental solo si  $q$  es entero.

a) Bastaría ver que  $\int \sqrt{1-x^3} dx$  no responde a ninguno de los casos anteriores.

En efecto, haciendo  $x^3 = t$  y  $3x^2 dx = dt$ , se tiene  $\int \sqrt{1-x^3} dx = \frac{1}{3} \int \sqrt{1-t} \frac{dt}{\sqrt[3]{t^2}}$ , es decir,  $\frac{1}{3} \int t^{-\frac{2}{3}}(1-t)^{\frac{1}{2}} dt$  en la que  $p = -\frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}$ ,  $q = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$  y  $p+q = -\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{6} \notin \mathbb{Z}$ .

b) Haciendo  $x^n = t$  y  $nx^{n-1} dx = dt$ , se tiene  $\int (1-x^n)^{\frac{1}{m}} dx = \frac{1}{n} \int (1-t)^{\frac{1}{m}} t^{\frac{1-n}{n}} dt$ .

Así pues, si  $m \mid n$ , se está en uno de los dos casos: a o b.

Si  $m = n = 2$ ,  $\frac{1}{m} + \frac{1-n}{n} = 0$  y se está en el caso c.

Si  $m \neq 1$ ,  $n \neq 1$  ni  $\frac{1}{m}$  ni  $\frac{1-n}{n}$  son enteros y su suma  $\frac{1}{m} + \frac{1-n}{n} - 1$  tampoco, si  $m$  y  $n$  no son ambos igual a 2.

c) Haciendo  $\sin x = \sqrt{t}$  y  $\cos x dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$ , la integral dada se transforma en:

$$\int \sqrt[4]{t} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-t}} dt = \frac{1}{2} \int t^{-\frac{1}{4}}(1-t)^{-\frac{1}{2}} dt$$

y ni  $p$  ni  $q$  son enteros ( $p = -\frac{1}{4}$ ,  $q = -\frac{1}{2}$ ), ni  $p+q = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{4}$ .

d) Escribiendo  $\int \sin^p x \cos^q x dx = \int \sin^p x \cos^{q-1} x dx$  y haciendo  $\sin x = \sqrt{t}$  y  $\cos x dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$

$$\text{Como } \cos^{q-1} x = (1-\sin^2 x)^{\frac{q-1}{2}} \text{ se tiene } \int t^{\frac{p}{2}}(1-t)^{\frac{q-1}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int t^{\frac{p-1}{2}}(1-t)^{\frac{q-1}{2}} dt$$

Si  $p$  o  $q$  es un entero impar,  $\frac{p-1}{2}$  o  $\frac{q-1}{2}$  es entero.

Si  $p+q$  es un entero par, resulta que  $\frac{p-1}{2} + \frac{q-1}{2} = \frac{p+q}{2} - 1$  sería entero.

Pero si ni  $p$  ni  $q$  es un entero impar,  $\frac{p-1}{2}$  ni  $\frac{q-1}{2}$  es entero y si  $p+q$  no es un entero par  $\frac{p+q}{2} - 1 \notin \mathbb{Z}$ .

e) Haciendo  $x^n = t$  y  $nx^{n-1}dx = dt$ , se tiene  $\frac{1}{n} \int t^{\frac{1}{n}}(1+t)^{-\frac{1}{2}} t^{\frac{1-n}{n}} dt = \frac{1}{n} \int t^{\frac{2}{n}-1}(1+t)^{-\frac{1}{2}} dt$

$q = -\frac{1}{2}$  no es entero.

Si  $n = 1$  o  $2$ ,  $\frac{2}{n} - 1$  es entero. Si  $n = 4$ ,  $\frac{2}{n} - 1 - \frac{1}{2}$  es entero.

Si  $n \neq 1, 2$  o  $4$ ,  $\frac{2}{n} - 1 \notin \mathbb{Z}$  y  $\frac{2}{n} - 1 - \frac{1}{2} = \frac{2}{n} - \frac{3}{2}$  que es entero solamente si  $n = 4$ .

Si  $n = 1$ , es  $\int \frac{x}{\sqrt{1+x}} dx$  y haciendo  $1+x = t^2$  y  $dx = 2t dt$ , se transforma en:

$$\int \frac{t^2-1}{t} 2t dt = 2 \int (t^2-1) dt = 2 \left( \frac{\sqrt{(1+x)^3}}{3} - \sqrt{1+x} \right) + C$$

Si  $n = 2$ , es  $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$  y haciendo  $1+x^2 = t$  y  $2xdx = dt$ , se transforma en:  $\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \sqrt{t} = \sqrt{1+x^2} + C$

Si  $n = 4$ , es  $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^4}} dx$  y haciendo  $x^2 = t$  y  $2xdx = dt$ , se transforma en:  $\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt$

Poniendo ahora  $t = \operatorname{tgu} u$  y  $dt = \frac{1}{\cos^2 u} du$ , resulta  $\frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos u} du = \frac{1}{2} \int \frac{\cos u}{1-\sin^2 u} du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1-y^2} dy$  con  $y = \sin u$  y  $dy = \cos u du$ .

Finalmente como,  $\frac{1}{1-y^2} = \frac{A}{1+y} + \frac{B}{1-y} = \frac{A(1-y)+B(1+y)}{1-y^2}$ , de la igualdad  $1 = A(1-y)+B(1+y)$ , se

obtiene  $A = B = \frac{1}{2}$  por lo que  $\int \frac{1}{1-y^2} dy = \frac{1}{2} \ln \frac{1+y}{1-y} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\sin u}{1-\sin u}$ .

Si  $t = \operatorname{tgu} u$  se tiene que  $1+t^2 = \frac{1}{\cos^2 u}$ ,  $\cos^2 u = \frac{1}{1+t^2}$ ,  $\sin u = \sqrt{1-\frac{1}{1+t^2}} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$

$$\frac{1+\sin u}{1-\sin u} = \frac{1+\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}}{1-\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}} = \frac{\sqrt{1+t^2}+t}{\sqrt{1+t^2}-t} = \left( \sqrt{1+t^2}+t \right)^2, \text{ por lo que } \frac{1}{2} \ln \frac{1+\sin u}{1-\sin u} = \ln(\sqrt{1+t^2}+t)$$

Así pues,  $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^4}} dx = \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x^4}+x^2) + C$ .

f)  $\int \operatorname{sen}^q x dx$

Poniendo  $\int \operatorname{sen}^q x dx = \int \operatorname{sen}^{q-1} \operatorname{sen} x dx = \int (\operatorname{sen}^2 x)^{\frac{q-1}{2}} \operatorname{sen} x dx$ .

Haciendo  $\cos x = \sqrt{t}$  y  $-\operatorname{sen} x dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$ , se tiene  $\int \operatorname{sen}^q x dx = -\frac{1}{2} \int (1-t)^{\frac{q-1}{2}} \cdot t^{-\frac{1}{2}} dt$ .

Así pues, como  $\int t^p(1-t)^q dt$  es elemental solo cuando  $p, q$  o  $p+q$  son enteros, se tiene que esta integral

sería elemental solo si  $\frac{q-1}{2} \in \mathbb{Z}$  o  $\frac{q-1}{2} - \frac{1}{2}$  sea entero, es decir,  $\frac{q-1}{2} \in \mathbb{Z}$  o  $\frac{q}{2} \in \mathbb{Z}$ , es decir  $q \in \mathbb{Z}$ .

Nota: Obsérvese que, en cualquier caso, esta integral se reduce al apartado d,  $\int \operatorname{sen}^q x \cos^p x dx$  con  $p = 0$  y allí se vio que era elemental cuando alguno era entero impar, en este caso  $q$ , o cuando la suma era entero par, en este caso  $q$ , es decir,  $\int \operatorname{sen}^q x dx$  es elemental solo si  $q \in \mathbb{Z}$ .

AUTOEVALUACIÓN

Comprueba qué has aprendido

1. Calcular las primitivas de  $f(x) = \frac{x}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$  podría no ser muy cómodo si lo intentas hacer directamente, pero si racionalizas previamente te resultará muy fácil. Hazlo así.

Racionalizando se tiene  $f(x) = \frac{x}{x - \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{x(x + \sqrt{x^2 - 1})}{x^2 - \sqrt{x^2 - 1}} = x^2 + x\sqrt{x^2 - 1}$ .

$$\int \frac{x}{x - \sqrt{x^2 - 1}} dx = \int x^2 dx + \int x\sqrt{x^2 - 1} dx = \frac{x^3}{3} + \int x\sqrt{x^2 - 1} dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \int (x^2 - 1)^{\frac{1}{2}} 2x dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (x^2 - 1)^{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{3} (x^3 + \sqrt{(x^2 - 1)^3}) + C$$

2. Si  $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  es la función  $f(x) = x(1 - \ln x)$ , encuentra la primitiva de  $f$  cuya gráfica pasa por el punto  $A(1, 1)$ .

Calculamos  $\int f(x) dx = \frac{x^2}{2} - \int x \ln x dx$ .

Llamando  $u(x) = \ln x$  y  $v'(x) = x$ , se tiene que  $\int x \ln x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2$

Así que  $\int x(1 - \ln x) dx = \frac{x^2}{2} - \left( \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{x^2}{4} \right) = \frac{3x^2}{4} - \frac{1}{2} x^2 \ln x = \frac{1}{2} x^2 \left( \frac{3}{2} - \ln x \right) + C$ .

Como la curva pedida pasa por  $(1, 1)$  resulta que  $1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} + C \Rightarrow C = \frac{1}{4}$  y la primitiva buscada es  $g(x) = \frac{1}{2} x^2 \left( \frac{3}{2} - \ln x \right) + \frac{1}{4}$ .

3. Determina  $f(x)$  sabiendo que  $f'(x) = e^{2x} \operatorname{sen} x$  y que  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ .

Para calcular  $\int e^{2x} \operatorname{sen} x dx$ , se construye la tabla:

$f$	$g'$
$e^{2x}$	$\operatorname{sen} x$
$2e^{2x}$	$-\cos x$
$4e^{2x}$	$-\operatorname{sen} x$

$\int e^{2x} \operatorname{sen} x dx = -e^{2x} \cos x + 2e^{2x} \operatorname{sen} x - 4 \int e^{2x} \operatorname{sen} x dx$ , por lo que  $5 \int e^{2x} \operatorname{sen} x dx = e^{2x} (-\cos x + 2 \operatorname{sen} x)$  de donde

$f(x) = \int e^{2x} \operatorname{sen} x dx = \frac{1}{5} e^{2x} (-\cos x + 2 \operatorname{sen} x) + C$

Como  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{5} e^{\pi} \cdot 2 + C = 1 \Rightarrow C = 1 - \frac{2}{5} e^{\pi}$

Luego  $f(x) = \frac{1}{5} e^{2x} (-\cos x + 2 \operatorname{sen} x) + 1 - \frac{2}{5} e^{\pi}$



4. Obtén  $\int \frac{1}{1+\sqrt{x+1}} dx$ .

Poniendo  $x+1 = t^2$  y  $dx = 2t dt$ , se tiene que  $\int \frac{1}{1+\sqrt{x+1}} dx = \int \frac{2t dt}{1+t} = \int \left(2 - \frac{2}{1+t}\right) dt = 2t - 2\ln(1+t)$ .

Deshaciendo el cambio, nos lleva a  $\int \frac{1}{1+\sqrt{x+1}} dx = 2\sqrt{x+1} - 2\ln(1+\sqrt{x+1}) + C$ .

5. Calcula  $\int (x^2 \ln x - x \ln x^2) dx$ .

$$x^2 \ln x - x \ln x^2 = x^2 \ln x - 2x \ln x = \ln x(x^2 - 2x)$$

Escribiendo la tabla, se tiene que:

$f$	$g'$
$\ln x$	$x^2 - 2x$
$\frac{1}{x}$	$\frac{x^3}{3} - x^2$

$$\int \ln x(x^2 - 2x) dx = \left(\frac{x^3}{3} - x^2\right) \ln x - \int \frac{1}{x} \left(\frac{x^3}{3} - x^2\right) dx = \left(\frac{x^3}{3} - x^2\right) \ln x - \frac{x^3}{9} + \frac{x^2}{2} + C$$

6. Determina la función  $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  que verifica que  $f(2) = \ln 4$  y cuya derivada sea la función

$$f'(x) = \frac{x^4 - x^3 - x - 1}{x^3 - x^2}$$

Efectuando la división dada, tenemos que  $f'(x) = x - \frac{x+1}{x^3-x^2}$  así que  $f(x) = \frac{x^2}{2} - \int \frac{x+1}{x^2(x-1)} dx$ .

Por el teorema de descomposición en fracciones simples,  $\frac{x+1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1}$  así que

$$Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2 = x+1 \text{ y haciendo:}$$

$$x=0 \Rightarrow B = -1$$

$$x=1 \Rightarrow C = 2$$

$$x=-1 \Rightarrow 2A - 2B + C = 0 \Rightarrow A = -2$$

$$\int \frac{x+1}{x^2(x-1)} dx = \int \frac{-2}{x} dx + \int \frac{-1}{x^2} dx + \int \frac{2}{x-1} dx = -2 \ln|x| + \frac{1}{x} + 2 \ln|x-1|$$

$$\text{Luego } f(x) = \frac{x^2}{2} + 2 \ln|x| - \frac{1}{x} - 2 \ln|x-1| + C = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + 2 \ln \left| \frac{x}{x-1} \right| + C$$

$$\text{Como } f(2) = \ln 4, \text{ tenemos que } \ln 4 = 2 - \frac{1}{2} + 2 \ln 2 + C \Rightarrow C = -\frac{3}{2} \text{ y } f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + 2 \ln \left| \frac{x}{x-1} \right| - \frac{3}{2}$$

7. Calcula todas las primitivas de  $f(x) = \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\sqrt{\cos x}}$ .

$$\int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\sqrt{\cos x}} dx = \int \frac{(1 - \cos^2 x) \operatorname{sen} x}{\sqrt{\cos x}} dx. \text{ Poniendo } \cos x = t \text{ y } -\operatorname{sen} x dx = dt, \text{ se tiene que:}$$

$$-\int \frac{(1-t^2)}{\sqrt{t}} dt = \int t^{\frac{3}{2}} dt - \int t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} - 2t^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{Deshaciendo el cambio nos lleva a } \int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\sqrt{\cos x}} dx = \frac{2}{5} \sqrt{\cos^5 x} - 2\sqrt{\cos x} + C.$$

8. Observa estas dos integrales:

a)  $\int \frac{2x}{x^2-5} dx = \ln|x^2-5| + C$       b)  $\int \frac{2x}{x^2+5} dx = \ln(x^2+5) + C$

¿Por qué en la primera integral es preciso tomar el valor absoluto y en la segunda no?

Porque  $x^2 - 5$  puede tomar valores negativos (por ejemplo si  $x = 0$ ) mientras que  $x^2 + 5$  es siempre positivo.

9. Calcula  $\int x^2 e^{2x} dx$ .

Escribiendo la tabla:

$f$	$g'$
$x^2$	$e^{2x}$
$2x$	$\frac{1}{2} e^{2x}$
$2$	$\frac{1}{4} e^{2x}$
$0$	$\frac{1}{8} e^{2x}$

$$\int x^2 e^{2x} dx = \frac{1}{2} x^2 e^{2x} - \frac{1}{2} x e^{2x} + \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

Relaciona y contesta

Elige la única respuesta correcta en cada caso

1. Si  $F(x)$  es la primitiva de  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{9-4x^2}}$  que pasa por el origen, entonces:

A.  $F(x) = \frac{1}{3} \arcsen \frac{3x}{2}$

B.  $F\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\pi}{6}$

C.  $F(x) = \arcsen \frac{2x}{3}$

D.  $F(1) = \frac{1}{2} \arcsen \frac{2}{3}$

$$F(x) = \int \frac{1}{\sqrt{9-4x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{9-(2x)^2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\frac{2}{3}}{\sqrt{1-\left(\frac{2x}{3}\right)^2}} dx = \frac{1}{2} \arcsen \frac{2x}{3} + C$$

Como pasa por el origen,  $F(0) = 0 \Rightarrow C = 0$

$$F(1) = \frac{1}{2} \arcsen \frac{2}{3}$$

La respuesta correcta es la D.

2. Sea  $f$  una función derivable, definida en  $[1, +\infty)$  que cumple la condición  $f(x)f'(x) = 1$ , siendo  $f(8) = 4$ .

Entonces:

A.  $(f(x))^2 + f(x) = 2x$

B.  $f(2) = 2$

C.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f^2(x)}{x} = 0$

D.  $f(x) = \sqrt{x}$

Integrando por ambas partes  $\int f(x)f'(x)dx = \int 1dx$  se tiene que  $\frac{1}{2}(f(x))^2 = x + C$

Como  $f(8) = 4 \Rightarrow C = 0$  y  $f(x) = \sqrt{2x}$

La respuesta correcta es la B.

Señala, en cada caso, las respuestas correctas

3. Sea  $f(x) = \frac{5(x+1)}{2x^2+x-3}$  e  $I$  el intervalo  $(1, +\infty)$ :

A. Para todo  $x \in I$ ,  $f(x) = \frac{1}{x+\frac{3}{2}} + \frac{1}{x-1}$ .

B. La función  $F(x) = \frac{1}{2} \ln|2x+3| + 2 \ln|x-1|$  es primitiva de  $f$  en  $I$ .

C. Existe una primitiva  $F$  de  $f$  en  $I$  tal que  $F(2) = 5$ .

D. Existe una primitiva  $F$  de  $f$  en  $I$  tal que  $F(2) = \pi$ .

$$\int \frac{5(x+1)}{2x^2+x-3} dx = \frac{1}{2} \int \frac{5x+5}{(x-1)\left(x+\frac{3}{2}\right)} dx$$

Aplicando el teorema de descomposición en fracciones simples:

$$\frac{5x+5}{(x-1)\left(x+\frac{3}{2}\right)} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{\left(x+\frac{3}{2}\right)} = \frac{A\left(x+\frac{3}{2}\right) + B(x-1)}{(x-1)\left(x+\frac{3}{2}\right)}$$
 e igualando se tiene:

$$5x+5 = A\left(x+\frac{3}{2}\right) + B(x-1) \text{ y haciendo:}$$

$$x=1 \Rightarrow 10 = \frac{5}{2}A \Rightarrow A=4$$

$$x=-\frac{3}{2} \Rightarrow -\frac{5}{2} = -\frac{5}{2}B \Rightarrow B=1$$

$$F(x) = \int \frac{5(x+1)}{2x^2+x-3} dx = 2 \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|2x+3| + C$$

La respuesta correcta es la B.

4. Sea  $f$  la función definida en  $\mathbb{R}$  por la fórmula  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  y  $F$  la primitiva de  $f$  tal que  $F(0) = 0$ :

A.  $F(1) = \frac{\pi}{4}$ .

B. Si  $G: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$  con  $G(x) = F(\operatorname{tg} x)$ , entonces  $G(x)G'(x) = x$ .

C. Sea  $H: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  con  $H(x) = F\left(\frac{1}{x+1}\right) + F\left(\frac{1}{x+2}\right)$ . Entonces  $H(0) = \frac{\pi}{4}$ .

D. Para todo  $x$  positivo,  $H'(x) = 0$ .

$$F(x) = \int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C. \text{ Como } F(0) = 0 \Rightarrow F(x) = \operatorname{arctg} x.$$

Si  $F(1) = \frac{\pi}{4}$  entonces  $F(1) = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$

$$\begin{cases} G(x) = \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) \\ G'(x) = 1 \end{cases} \Rightarrow G(x)G'(x) = x$$

Las respuestas correctas son la A y B.

5. Las funciones primitivas de  $f(x) = 6 \operatorname{sen} x \cos x$  son:

A.  $F(x) = 3 \operatorname{sen}^2 x + C$

C.  $F(x) = -\frac{3}{2} \cos 2x + C$

B.  $F(x) = 3 \cos^2 x + C$

D.  $F(x) = 3 \cos 2x + C$

$$F(x) = \int 6 \operatorname{sen} x \cos x dx = 6 \int \operatorname{sen} x \cos x dx = 3 \operatorname{sen}^2 x dx + C$$

Aplicando la fórmula del ángulo mitad  $\operatorname{sen} \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$  se llega a  $F(x) = -\frac{3}{2} \cos 2x + C$ .

Las respuestas correctas son la A y la C.

Señala el dato innecesario para contestar

6. La aceleración de cierta partícula viene dada por la expresión  $\frac{dv}{dt} = a + bt + c \cos(2\pi t)$ . Se pide la velocidad,  $v$ , en  $t = 2$  y se dispone de los siguientes datos:

1.  $v(0)$

2.  $v\left(-\frac{1}{4}\right)$

3.  $v\left(-\frac{1}{2}\right)$

4.  $v(-1)$

A. Puede eliminarse el dato 1.

B. Puede eliminarse el dato 2.

C. Puede eliminarse el dato 3.

D. Puede eliminarse el dato 4.

$$v(t) = at + \frac{1}{2}bt^2 + \frac{c}{2\pi} \operatorname{sen} 2\pi t + C \Rightarrow v(0) = C$$

Con  $v\left(-\frac{1}{2}\right)$  y  $v(-1)$  se pueden hallar  $a$  y  $b$ . Por tanto el dato innecesario es 2.

# 6 Integral definida

## EJERCICIOS PROPUESTOS

1. **Ejercicio resuelto.**
2. **Obtén, con el método visto, el área del trapecio limitado por la recta  $y = 2x + 1$ , el eje  $X$  y las verticales  $x = 0$  y  $x = 4$ . Calcula el área geoméricamente y compara los resultados.**

Se divide el intervalo  $[0, 4]$  en  $4n$  subintervalos, cada uno de longitud  $\frac{1}{n}$ . Se calcula la suma de las áreas de los rectángulos obtenidos tomando como base la longitud de cada subintervalo y como altura la ordenada del extremo derecho.

$$S_n = \frac{1}{n} \left[ \left( 2 \frac{1}{n} + 1 \right) + \left( 2 \frac{2}{n} + 1 \right) + \dots + \left( 2 \frac{4n-1}{n} + 1 \right) + \left( 2 \frac{4n}{n} + 1 \right) \right] = \frac{1}{n} \left[ \frac{2+4+6+\dots+2(4n-1)+8n}{n} + 4n \right] =$$

$$= \frac{1}{n} \left[ \frac{2+8n}{n} 4n + 4n \right] = \frac{1}{n} \left[ \frac{(1+4n)4n}{n} + 4n \right] = \frac{1}{n} \left[ \frac{4n+16n^2+4n^2}{n} \right] = \frac{4n+20n^2}{n^2} = \frac{4+20n}{n} = \frac{4}{n} + 20.$$

Se toma, como área del recinto, el número  $A = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ , es decir,  $A = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{4}{n} + 20 \right) = 20 \text{ u}^2$ . Geométricamente, el trapecio tiene altura 4 y bases 1 y 9. Su área es  $A = \frac{9+1}{2} \cdot 4 = 20 \text{ u}^2$ , que coincide con la obtenida con el método anterior.

3. **Obtén una fórmula para  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3$ , procediendo como el ejemplo y desarrollando las potencias cuartas de  $(n+1)$ .**

$$1^4 = 1$$

$$2^4 = (1+1)^4 = 1^4 + 4 \cdot 1^3 + 6 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 + 1$$

$$\vdots$$

$$(n+1)^4 = n^4 + 4 \cdot n^3 + 6 \cdot n^2 + 4 \cdot n + 1$$

Sumando los primeros miembros y los segundos miembros, se obtiene:

$$1^4 + 2^4 + \dots + (n+1)^4 = (1^4 + 2^4 + \dots + n^4) + 4(1^3 + 2^3 + \dots + n^3) + 6(1^2 + 2^2 + \dots + n^2) + 4(1 + 2 + \dots + n) + n + 1$$

$$\text{Luego } (n+1)^4 = 4(1^3 + 2^3 + \dots + n^3) + 6(1^2 + 2^2 + \dots + n^2) + 4(1 + 2 + \dots + n) + n + 1$$


Se despeja la suma de los  $n$  primeros cubos y se aplican las fórmulas ya conocidas:

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{(n+1)^4 - 6(1^2 + 2^2 + \dots + n^2) - 4(1 + 2 + \dots + n) - (n+1)}{4} = \frac{(n+1)^4 - n(n+1)(2n+1) - 2(n+1)n - (n+1)}{4} =$$

$$= \frac{(n+1)(n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - 2n^2 - n - 2n - 1)}{4} = \frac{(n+1)(n^3 + n^2)}{4} = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\text{Así pues, } 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

4. Usa el resultado del ejercicio anterior para calcular el área limitada por la gráfica de  $f(x) = x^3 + 1$ , el eje  $X$  y las rectas  $x = 0$  y  $x = 1$ . Toma en cada subintervalo como  $c_i$  el extremo derecho.



Se divide el intervalo  $[0, 1]$  en  $n$  subintervalos, cada uno de longitud  $\frac{1}{n}$ . Se calcula la suma de las áreas de los rectángulos obtenidos tomando como base la longitud de cada subintervalo y como altura la ordenada del extremo derecho.

$$S_n = \frac{1}{n} \left[ \left(\frac{1}{n}\right)^3 + 1 + \left(\frac{2}{n}\right)^3 + 1 + \dots + \left(\frac{n}{n}\right)^3 + 1 \right] = \frac{1}{n} \left[ n + \frac{1^3 + 2^3 + \dots + n^3}{n^3} \right]$$

Aplicando la fórmula encontrada en el ejercicio anterior:

$$S_n = \frac{1}{n} \left[ n + \frac{1^3 + 2^3 + \dots + n^3}{n^3} \right] = \frac{1}{n} \left[ n + \frac{n^2(n+1)^2}{4n^3} \right] = \frac{1}{n} \left[ \frac{4n^2 + n^2 + 2n + 1}{4n} \right] = \frac{5n^2 + 2n + 1}{4n^2} = \frac{5}{4} + \frac{2n + 1}{4n^2}$$

El área del recinto es el número  $A = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ , es decir,  $A = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{5}{4} + \frac{2n + 1}{4n^2} \right) = \frac{5}{4} \text{ u}^2$ .

### 5. Ejercicio resuelto.

6. Sea  $f$  continua en  $[-1, 4]$  y  $g(x) = f(x) + 2$ . Si  $\int_{-1}^4 f(x) dx = 5$ , calcula  $\int_{-1}^4 g(t) dt$ .

$$\int_{-1}^4 g(t) dt = \int_{-1}^4 (f(t) + 2) dt = \int_{-1}^4 f(t) dt + \int_{-1}^4 2 dt = 5 + 2(4 - (-1)) = 5 + 2 \cdot 5 = 15$$

7. Si  $\int_0^1 f(x) dx = \frac{4}{3}$ ,  $\int_1^2 f(x) dx = \frac{8}{3}$  y  $\int_0^3 f(x) dx = \frac{11}{3}$ , halla:

a)  $\int_0^2 f(x) dx$                       b)  $\int_1^3 f(x) dx$                       c)  $\int_2^3 f(x) dx$


a)  $\int_0^2 f = \int_0^1 f + \int_1^2 f = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} = 4$

b)  $\int_1^3 f = \int_0^3 f - \int_0^1 f = \frac{11}{3} - \frac{4}{3} = \frac{7}{3}$

c)  $\int_2^3 f = \int_1^3 f - \int_1^2 f = \frac{7}{3} - \frac{8}{3} = -\frac{1}{3}$

### 8 y 9. Ejercicios resueltos.

10. Para la función de la gráfica, halla su valor medio y el valor  $c \in [0, 3]$  cuya existencia asegura el teorema del valor medio.



Se debe encontrar el valor  $f(c)$ , siendo  $c$  el número del intervalo  $[0, 3]$ , que cumpla  $\int_0^3 \left(\frac{x}{3} + 1\right) dx = f(c)(3-0)$ .


Como  $\int_0^3 \left(\frac{x}{3} + 1\right) dx$  es el área de un trapecio de altura 3 y bases 2 y 1, su valor es  $\int_0^3 \left(\frac{x}{3} + 1\right) dx = \frac{2+1}{2} \cdot 3 = \frac{9}{2}$ .

Entonces,  $f(c)(3-0) = \frac{9}{2} \Rightarrow f(c) = \frac{3}{2}$ , es el valor medio de la función en dicho intervalo.


Por tanto, si  $f(c) = \frac{c}{3} + 1 = \frac{3}{2}$ , despejamos y concluimos que  $c = \frac{3}{2}$ .

11. Halla el valor medio de las funciones  $g$  y  $h$ :

a)



b)



- a) Se debe encontrar el valor  $g(c)$ , siendo  $c$  el número del intervalo  $[0, 5]$  que cumpla  $\int_0^5 g(x) dx = g(c)(5-0)$ .

Se calcula esta integral hallando el área de las tres regiones (un cuarto de círculo que está por encima del eje  $X$ ; un triángulo que está por debajo del eje  $X$ ; un triángulo que está por encima del eje  $X$ ).

El área del cuarto de círculo es  $\frac{\pi \cdot 2^2}{4} = \pi$ . El área del triángulo que está por debajo del eje  $X$  es  $\frac{2 \cdot 1}{2} = 1$ . Esto

indica que  $\int_2^4 f(x) dx = -1$ , ya que al estar por debajo del eje  $X$ , la integral es el opuesto del área. El área del

triángulo que está por encima del eje  $X$  es  $\frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{1}{2}$ .

Con todo esto:  $\int_0^5 g(x) dx = \int_0^2 g(x) dx + \int_2^4 g(x) dx + \int_4^5 g(x) dx = \pi - 1 + \frac{1}{2} = \pi - \frac{1}{2}$

Por tanto,  $g(c)(5-0) = \pi - \frac{1}{2} \Rightarrow g(c) = \frac{2\pi-1}{10}$  es el valor medio de la función en dicho intervalo. Como

$g(c) = \frac{2\pi-1}{10} \approx 0,53$ , habrá dos valores de  $c$ : uno en la circunferencia  $x^2 + (g(x))^2 = 2^2$ , es decir,

$c^2 + \left(\frac{2\pi-1}{10}\right)^2 = 4$ , de donde sacamos que  $c \approx 1,93$ . Y el otro en la recta  $y = x - 4$ , es decir,  $g(c) = c - 4$ ,

$0,53 = c - 4$ ,  $c \approx 4,53$ . Así pues, hay dos valores de  $c$ :  $c \approx 1,93$  y  $c \approx 4,53$ .

- b) El recinto limitado por la función  $h$  y el eje  $X$  en  $\left[0, \frac{5}{2}\right]$  se descompone en tres partes:

- Dos trapecios, uno de área  $S_1 = \frac{1+\frac{3}{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$  y otro de área  $S_2 = \frac{1+\frac{3}{2}}{2} \cdot 1 = \frac{5}{4}$ .

- Un cuadrado menos un semicírculo:  $S_3 = 1 - \frac{\pi \left(\frac{1}{2}\right)^2}{2} = \frac{8-\pi}{8}$

Con todo esto  $\int_0^{\frac{5}{2}} h(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} h(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} h(x) dx + \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{5}{2}} h(x) dx = \frac{5}{8} + \frac{8-\pi}{8} + \frac{5}{4} = \frac{23-\pi}{8}$

Por tanto,  $h(c)\left(\frac{5}{2}-0\right) = \frac{23-\pi}{8} \Rightarrow h(c) = \frac{23-\pi}{20} \approx 0,99$ . Hay dos valores de  $c$  en la circunferencia que corresponden a  $c_1 \approx 0,5$  y  $c_2 \approx 1,5$ .

**12. Calcula las siguientes integrales definidas.**

a)  $\int_{-1}^1 x(x^2 - 1) dx$

c)  $\int_0^4 \sqrt{x} dx$

b)  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \cos t dt$

d)  $\int_0^{\pi} \text{sen}(2x - 1) dx$

a)  $\int_{-1}^1 x(x^2 - 1) dx = \left[ \frac{1}{2} \frac{(x^2 - 1)^2}{2} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{4} \cdot 0 - \frac{1}{4} \cdot 0 = 0$  (observa que la función  $f(x) = x(x^2 - 1) = x^3 - x$  es una función impar y como el intervalo de definición está centrado en el origen, la integral ha de ser cero).

b)  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \cos t dt = [\text{sen } t]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \text{sen } \frac{\pi}{3} - \text{sen } \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2}$

c)  $\int_0^4 \sqrt{x} dx = \left[ \frac{2\sqrt{x^3}}{3} \right]_0^4 = \frac{16}{3}$

d)  $\int_0^{\pi} \text{sen}(2x - 1) dx = \left[ -\frac{\cos(2x - 1)}{2} \right]_0^{\pi} = -\frac{\cos(2\pi - 1)}{2} + \frac{\cos(0 - 1)}{2} = 0$

**13. Determina el valor de estas integrales.**

a)  $\int_{-1}^1 \frac{3}{x^2 + 1} dx$

c)  $\int_e^{e^2} \frac{\ln x}{x} dx$

b)  $\int_{-2}^2 e^{-x} dx$

d)  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \text{tg } x dx$

a)  $\int_{-1}^1 \frac{3}{x^2 + 1} dx = [3 \arctg x]_{-1}^1 = 3 \left( \frac{\pi}{4} - \left( -\frac{\pi}{4} \right) \right) = \frac{3\pi}{2}$

b)  $\int_{-2}^2 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_{-2}^2 = -e^{-2} - (-e^{-(-2)}) = e^2 - \frac{1}{e^2}$

c)  $\int_e^{e^2} \frac{\ln x}{x} dx = \left[ \frac{(\ln x)^2}{2} \right]_e^{e^2} = \frac{(\ln e^2)^2}{2} - \frac{(\ln e)^2}{2} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

d)  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \text{tg } x dx = [-\ln(|\cos x|)]_0^{\frac{\pi}{4}} = -\ln \frac{\sqrt{2}}{2} = -\ln \sqrt{2} + \ln 2 = -\frac{1}{2} \ln 2 + \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2$



14. Ejercicio resuelto.

15. Calcula las derivadas de las siguientes funciones con estos métodos:

1. Calculando la integral y derivando.

2. Aplicando el teorema fundamental del cálculo.

a)  $g(x) = \int_x^0 2t \, dt$       b)  $g(x) = \int_0^x \operatorname{tg} t \, dt$       c)  $g(x) = \int_x^e ae^a \, da$

a) Integral y derivando:  $g(x) = \int_x^0 2t \, dt = -\int_0^x 2t \, dt = -\left[t^2\right]_0^x = -x^2 \Rightarrow g'(x) = -2x$

Teorema fundamental del cálculo:  $g(x) = \int_x^0 2t \, dt = -\int_0^x 2t \, dt \Rightarrow g'(x) = -2x$

b) Integral y derivando:  $g(x) = \int_0^x \operatorname{tg} t \, dt = [-\ln(\cos t)]_0^x \Rightarrow g(x) = -\ln(\cos x) \Rightarrow g'(x) = -\frac{(-\operatorname{sen} x)}{\cos x} = \operatorname{tg} x$

Teorema fundamental del cálculo:  $g(x) = \int_0^x \operatorname{tg} t \, dt \Rightarrow g'(x) = \operatorname{tg} x$

c) Integral y derivando:

$$g(x) = \int_x^e ae^a \, da = -\int_e^x ae^a \, da \Rightarrow g(x) = -[e^a(a-1)]_e^x = -e^x(x-1) + e^e(e-1) \Rightarrow g'(x) = -xe^x$$

Teorema fundamental del cálculo:  $g(x) = \int_x^e ae^a \, da = -\int_e^x ae^a \, da \Rightarrow g'(x) = -xe^x$

16. Halla las derivadas de las siguientes funciones.

a)  $g(x) = \int_{-x^2}^{x^3} \operatorname{sen} 2t \, dt$       b)  $g(x) = \int_{3x-2}^{x^2+x} e^{-t^2} \, dt$

a)  $f(x) = \left[\frac{-\cos 2t}{2}\right]_{-x^2}^{x^3} = \frac{1}{2}(-\cos(2x^3) + \cos(-2x^2))$ , su derivada es:  $f'(x) = 3x^2 \operatorname{sen}(2x^3) + 2x \operatorname{sen}(-2x^2)$

También se puede calcular observando que  $g(t) = \operatorname{sen} 2t$  es continua y por ello:

$$f(x) = [G(t)]_{-x^2}^{x^3} = G(x^3) - G(-x^2), \text{ donde } G'(t) = \operatorname{sen} 2t$$

Por tanto,  $f'(x) = G'(x^3)3x^2 - G'(-x^2)(-2x) = 3x^2 \operatorname{sen}(2x^3) + 2x \operatorname{sen}(-2x^2)$

b) La función  $h(t) = e^{-t^2}$  es continua  $\Rightarrow g(x) = [H(t)]_{3x-2}^{x^2+x} = H(x^2+x) - H(3x-2)$ , con  $H'(x) = e^{-x^2}$ , por tanto:

$$g'(x) = (2x+1)H'(x^2+x) - 3H'(3x-2) = (2x+1)e^{-(x^2+x)^2} - 3e^{-(3x-2)^2}$$

17. Ejercicio interactivo.

18 a 20. Ejercicios resueltos.

21. Calcula el área de la región limitada por la gráfica de  $y = \frac{x}{1+x^2}$ , el eje  $X$  y las rectas  $x=1$  y  $x=2$ .

La función es positiva en  $[1,2] \Rightarrow A = \int_1^2 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} [\ln(1+x^2)]_1^2 = \frac{1}{2} (\ln 5 - \ln 2) u^2$ .

22. Calcula el área de la región finita limitada por el eje horizontal y la gráfica de  $y = x^2 - 2x - 3$ .

La función es una parábola cóncava hacia arriba que corta al eje  $X$  en los puntos de abscisas  $-1$  y  $3$ .


La región queda por debajo del eje  $X \Rightarrow A = -\int_{-1}^3 (x^2 - 2x - 3) dx = -\left[\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x\right]_{-1}^3 = -\left(-\frac{32}{3}\right) = \frac{32}{3} u^2$ .

23. Dibuja el recinto encerrado entre las gráficas de las funciones  $y = x^2 - 6x$  e  $y = 3x$  y calcula su área.

La gráfica de  $f(x) = x^2 - 6x = x(x - 6)$  es una parábola cóncava hacia arriba que corta al eje  $X$  en los puntos  $A(0,0)$  y  $B(6,0)$ . La gráfica de  $y = 3x$  es una recta creciente que pasa por el origen. Los puntos de corte entre ambas gráficas se encuentran resolviendo la ecuación  $x^2 - 6x = 3x$ , es decir, son los puntos  $A(0,0)$  y  $C(9,27)$ .

El recinto está limitado superiormente por la recta e inferiormente por la parábola y su área es:

$$A = \int_0^9 [3x - (x^2 - 6x)] dx = \int_0^9 (-x^2 + 9x) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{9x^2}{2}\right]_0^9 = \frac{243}{2} = 121,50 u^2$$



24. Calcula el área de la región limitada por estas cuatro curvas:  $y = x + 5$ ,  $y = 2$ ,  $y = -1$ ,  $y^2 = x$

La gráfica de la curva  $y^2 = x$ , que no es una función, se puede obtener dibujando estas dos gráficas:

$$y = \sqrt{x} \qquad y = -\sqrt{x}$$


Por tanto, la región es la que se muestra.

Los vértices de la región son los puntos de intersección de las curvas que se cortan:

$$\begin{array}{ll} A(-6,-1) & B(-3,2) \\ C(4,2) & D(1,-1) \end{array}$$

La región que está a la izquierda del eje  $Y$  es un trapecio de altura 3 y bases 6 y 3.

Su área es  $A_1 = \frac{6+3}{2} \cdot 3 = \frac{27}{2} u^2$ .



Otra región está limitada superiormente por  $y = 2$  e inferiormente por  $y = \sqrt{x}$ , su área la da la integral:

$$A_2 = \int_0^4 (2 - \sqrt{x}) dx = \left[2x - \frac{2}{3}\sqrt{x^3}\right]_0^4 = 8 - \frac{16}{3} = \frac{8}{3} u^2$$

La otra región está limitada superiormente por  $y = -\sqrt{x}$  e inferiormente por  $y = -1$ , su área:

$$A_3 = \int_0^1 (-\sqrt{x} - (-1)) dx = \int_0^1 (1 - \sqrt{x}) dx = \left[x - \frac{2}{3}\sqrt{x^3}\right]_0^1 = \frac{1}{3} u^2 \Rightarrow A = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{27}{2} + \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = \frac{33}{2} u^2$$

25. Se considera el recinto del plano limitado por la curva  $y = -x^2 + 2x$  y por la curva  $y = x^2 - 10x$ .


a) Dibuja el recinto.

b) Calcula el área del recinto.

a) La función  $y = -x^2 + 2x$  es una parábola cóncava hacia abajo que corta al eje  $X$  en los puntos  $A(0,0)$  y  $C(2,0)$ .

La función  $y = x^2 - 10x$  es una parábola cóncava hacia arriba que corta al eje  $X$  en los puntos  $A(0,0)$  y  $D(10,0)$ .

Los puntos de corte entre ambas se encuentran resolviendo el sistema formado por sus expresiones y son  $A(0,0)$  y  $B(6,-24)$ .



b) El área del recinto es:

$$A = \int_0^6 [-x^2 + 2x - (x^2 - 10x)] dx = \int_0^6 (-2x^2 + 12x) dx = \left[ -\frac{2x^3}{3} + 6x^2 \right]_0^6 = 72 \text{ u}^2.$$

26. Dada la función  $f(x) = 3 + 2x^2 - x^4$ , halla los puntos de corte con el eje  $X$  y calcula el área de la región del plano encerrada entre esa curva y el eje  $X$ .

Los puntos de corte con el eje  $X$  se encuentran resolviendo la ecuación


bicuadrada  $3 + 2x^2 - x^4 = 0$  y obtenemos únicamente dos puntos:

$A(-\sqrt{3},0)$  y  $B(\sqrt{3},0)$ . Como la función es par y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ,

ya podemos realizar un esbozo de la gráfica y la región de la que se habla.

Como la función es par el área pedida será:

$$A = 2 \int_0^{\sqrt{3}} (3 + 2x^2 - x^4) dx = 2 \left[ 3x + \frac{2x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{32\sqrt{3}}{5} \approx 11,09 \text{ u}^2.$$



27. Calcula el área de la región encerrada entre las gráficas de  $f(x) = 2x - x^2$  y  $g(x) = x^2 - \frac{3}{2}$ .


Primero hay que calcular los puntos de corte de ambas funciones:

$$x^2 - \frac{3}{2} = 2x - x^2 \Rightarrow 4x^2 - 4x - 3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}, x = \frac{3}{2}$$

La región está limitada entre dos curvas:  $f(x) = 2x - x^2$  por arriba y  $g(x) = x^2 - \frac{3}{2}$

por debajo; así pues, el área pedida es:

$$A = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \left[ 2x - x^2 - \left( x^2 - \frac{3}{2} \right) \right] dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \left( -2x^2 + 2x + \frac{3}{2} \right) dx = \left[ -\frac{2x^3}{3} + x^2 + \frac{3x}{2} \right]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} = \frac{8}{3} \text{ u}^2.$$



28 y 29. Ejercicios resueltos.

30. Halla la longitud de la catenaria  $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  entre  $x = -1$  y  $x = 1$ .

$$f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \Rightarrow L_0^1 = \int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_0^1 \sqrt{\frac{4 + e^{2x} + e^{-2x} - 2}{4}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{e^{2x} + e^{-2x} + 2} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{(e^x + e^{-x})^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (e^x + e^{-x}) dx = \frac{1}{2} [e^x - e^{-x}]_0^1 = \frac{1}{2} \left( e - \frac{1}{e} \right) \text{ u.}$$

Por ser una función par  $L_{-1}^1 = 2L_0^1 = e - \frac{1}{e}$ .

31. Calcula la longitud de la llamada parábola semicúbica (aunque no lo es su gráfica se parece a una parábola)  $y = x^{\frac{3}{2}}$  entre  $x = 0$  y  $x = 4$ .

La derivada de la función  $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$  es  $f'(x) = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$ .

La longitud pedida es:

$$L_0^4 = \int_0^4 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_0^4 \sqrt{1 + \left[ \frac{3x^{\frac{1}{2}}}{2} \right]^2} dx = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9x}{4}} dx = \frac{4}{9} \int_0^4 \frac{9}{4} \sqrt{1 + \frac{9x}{4}} dx = \frac{4}{9} \left[ \frac{2}{3} \left( 1 + \frac{9x}{4} \right)^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 \approx 9,07 \text{ u.}$$

32. Sobre una partícula a  $x$  metros del origen, actúa una fuerza  $F(x) = 3x^2 + 2x$  (N). ¿Qué trabajo realiza  $F$  al moverla desde  $x = 1$  hasta  $x = 5$  m? (El trabajo se calcula como  $W = \int_1^5 F dx$ ).

$$W = \int_1^5 F(x) dx = \int_1^5 (3x^2 + 2x) dx = [x^3 + x^2]_1^5 = 148 \text{ J}$$

33. \* Halla el volumen del sólido que se forma al girar la región bajo la gráfica de  $y = 1 + \cos x$  en  $[0, 2\pi]$ .

$$V = \int_0^{2\pi} \pi(1 + \cos x)^2 dx = \pi \int_0^{2\pi} (1 + \cos x)^2 dx$$

$$\int (1 + \cos x)^2 dx = \int 1 + 2\cos x + \cos^2 x dx = x + 2\sin x + \int \cos^2 x dx$$

y, por partes:


$$f(x) = \cos x \qquad f'(x) = -\sin x dx$$

$$g'(x) = \cos x dx \qquad g(x) = \sin x$$

$$\int \cos^2 x dx = \sin x \cos x + \int \sin^2 x dx = \sin x \cos x + \int (1 - \cos^2 x) dx = \sin x \cos x + x - \int \cos^2 x dx$$

Despejando se obtiene:  $\int \cos^2 x dx = \frac{x + \sin x \cos x}{2} + C$

Por tanto,  $V = \pi \int_0^{2\pi} (1 + \cos x)^2 dx = \pi \left[ x + 2\sin x + \frac{x + \sin x \cos x}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi^2 \text{ u}^3$



34. La población de Circulandia, una típica ciudad, decrece conforme nos alejamos de su centro. En efecto, su densidad de población es  $10\,000(3-r)$  habitantes/ $\text{km}^2$  siendo  $r$  la distancia al centro en km.

a) ¿Cuál es el radio de la zona habitada de la ciudad?

b) ¿Cuál es la población de la ciudad?

a) Como la densidad en los confines de la ciudad es 0, entonces  $10\,000(3-r) = 0$ , es decir,  $r = 3$  km.

b)  $P \approx \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n 2\pi r_i \Delta r f(c_i) = \int_0^3 2\pi r 10\,000(3-r) dr$ . Se calcula esta integral:

$$\int_0^3 2\pi r 10\,000(3-r) dr = 20\,000\pi \int_0^3 (3r - r^2) dr = 20\,000\pi \left[ \frac{3r^2}{2} - \frac{r^3}{3} \right]_0^3 = 90\,000\pi \approx 282\,743 \text{ habitantes.}$$

35. Ejercicio interactivo.


36 a 44. Ejercicios resueltos.

www.yoquieroaprobar.es

## EJERCICIOS

### Área bajo una curva

45. Halla el área de la región sombreada utilizando los diferentes métodos propuestos en los distintos apartados. Comprueba que siempre obtienes el mismo resultado.



- a) Dividiendo el intervalo  $[2,3]$  en  $n$  subintervalos de longitud  $\frac{1}{n}$ , tomando como altura de cada rectángulo la ordenada de su extremo derecho y calculando, finalmente, el límite de la suma de las áreas de los rectángulos cuando  $n \rightarrow +\infty$ .
- b) Procediendo como en a, pero tomando como altura de cada rectángulo la ordenada de su extremo izquierdo.
- c) Hallando una primitiva  $F$  de la función cuya gráfica es la recta oblicua que limita la región y hallando  $F(3) - F(2)$ .
- d) Utilizando la fórmula que nos da el área de un trapecio.

a) La ecuación de la recta que limita superiormente el trapecio es  $y = x + 1$ .

$$S_n = \frac{1}{n} \left[ 2 + \frac{1}{n} + 1 + 2 + \frac{2}{n} + 1 + \dots + 2 + \frac{n}{n} + 1 \right] = \frac{1}{n} \left[ 3n + \frac{1+2+\dots+n}{n} \right] = \frac{1}{n^2} \left[ 3n^2 + \frac{1+n}{2} n \right] = \frac{1}{n^2} \left[ \frac{6n^2 + n + n^2}{2} \right] = \frac{1}{n^2} \left[ \frac{7n^2 + n}{2} \right] = \frac{7n+1}{2n} = \frac{7}{2} + \frac{1}{n}$$


El área del recinto es:  $A = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{7}{2} + \frac{1}{n} \right) = \frac{7}{2} \text{ u}^2$ .

$$\text{b) } S_n = \frac{1}{n} \left[ 2 + 1 + 2 + \frac{1}{n} + 1 + \dots + 2 + \frac{n-1}{n} + 1 \right] = \frac{1}{n} \left[ 3n + \frac{1+2+\dots+n-1}{n} \right] = \frac{1}{n^2} \left[ 3n^2 + \frac{1+n-1}{2} (n-1) \right] = \frac{1}{n^2} \left[ \frac{6n^2 + n^2 - n}{2} \right] = \frac{1}{n^2} \left[ \frac{7n^2 - n}{2} \right] = \frac{7n-1}{2n} = \frac{7}{2} - \frac{1}{2n} \Rightarrow A = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{7}{2} - \frac{1}{2n} \right) = \frac{7}{2} \text{ u}^2$$

c) Una primitiva de  $y = x + 1$  es  $F(x) = \frac{x^2}{2} + x \Rightarrow A = F(3) - F(2) = \frac{3^2}{2} + 3 - \left( \frac{2^2}{2} + 2 \right) = \frac{9}{2} + 3 - \left( \frac{4}{2} + 2 \right) = \frac{9}{2} + 3 - 4 = \frac{9}{2} - 1 = \frac{7}{2} \text{ u}^2$

d) La región sombreada es un trapecio de altura 1 y bases 4 y 3. Su área es  $A = \frac{4+3}{2} \cdot 1 = \frac{7}{2} \text{ u}^2$ .

46. Calcula el área limitada por la curva  $y = x^2 + 1$ , el eje horizontal y las rectas verticales  $x = -2$  y  $x = 2$ .



Se divide el intervalo  $[-2, 2]$  en  $4n$  subintervalos, cada uno de longitud  $\frac{1}{n}$ .

Se calcula la suma de las áreas de los rectángulos obtenidos tomando como base la longitud de cada subintervalo y como altura la ordenada del extremo derecho.

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{n} \left[ \left(-2 + \frac{1}{n}\right)^2 + 1 + \left(-2 + \frac{2}{n}\right)^2 + 1 + \dots + \left(-2 + \frac{4n}{n}\right)^2 + 1 \right] = \\ &= \frac{1}{n} \left[ 4 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 - \frac{4}{n} + 1 + 4 + \left(\frac{2}{n}\right)^2 - \frac{8}{n} + 1 + \dots + 4 + \left(\frac{4n}{n}\right)^2 - \frac{16n}{n} + 1 \right] = \\ &= \frac{1}{n} \left[ 20n + \frac{1^2 + 2^2 + \dots + (4n)^2}{n^2} - \frac{4 + 8 + \dots + 16n}{n} \right] \end{aligned}$$

Aplicando las fórmulas ya conocidas:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{n} \left[ 20n + \frac{4n(4n+1)(8n+1)}{6n^2} - \frac{2n(4+16n)}{n} \right] = \frac{1}{n} \left[ 20n + \frac{2(4n+1)(8n+1)}{3n} - 8(1+4n) \right] = \\ &= \frac{1}{3n^2} \left[ 60n^2 + 2(4n+1)(8n+1) - 24n(1+4n) \right] = \frac{28n^2 + 2}{3n^2} = \frac{28}{3} + \frac{2}{3n^2} \end{aligned}$$

El área del recinto es:  $A = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{28}{3} + \frac{2}{3n^2} \right) = \frac{28}{3} \text{ u}^2$

(Como la función  $y = x^2 + 1$  es simétrica respecto del eje Y y el intervalo  $[-2, 2]$  está centrado en el cero, podríamos haber calculado el área entre 0 y 2 y luego hallar su doble).

47. Determina el área de la región limitada por la función  $f(x) = x^3$ , el eje X y las rectas verticales  $x = 0$  y  $x = 1$ .


Para ello, usa la expresión  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left[ \frac{n(n+1)}{2} \right]^2$ .

Se divide el intervalo  $[0, 1]$  en  $n$  subintervalos, cada uno de longitud  $\frac{1}{n}$ .

Se calcula la suma de las áreas de los rectángulos obtenidos tomando como base la longitud de cada subintervalo y como altura la ordenada del extremo derecho.

$$S_n = \frac{1}{n} \left[ \left(\frac{1}{n}\right)^3 + \left(\frac{2}{n}\right)^3 + \dots + \left(\frac{n}{n}\right)^3 \right] = \frac{1}{n} \left[ \frac{1^3 + 2^3 + \dots + n^3}{n^3} \right] = \frac{1}{n} \left[ \frac{n^2(n+1)^2}{4n^3} \right] = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4n^4} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4n} + \frac{1}{4n^2}$$

El área del recinto es:  $A = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{4} + \frac{2}{4n} + \frac{1}{4n^2} \right) = \frac{1}{4} \text{ u}^2$




## Integral definida. Propiedades

48. Esboza la gráfica de  $f(x) = \frac{1}{x}$  en  $[1,2]$  y divide este intervalo en 5 subintervalos para probar que:

$$0,2 \left( \frac{1}{1,2} + \frac{1}{1,4} + \frac{1}{1,6} + \frac{1}{1,8} + \frac{1}{2} \right) < \int_1^2 \frac{1}{x} dx < 0,2 \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{1,2} + \frac{1}{1,4} + \frac{1}{1,6} + \frac{1}{1,8} \right)$$

Observando el dibujo se aprecia que el área bajo la curva es mayor que la suma de las áreas de los rectángulos inferiores y menor que la suma de las áreas de los rectángulos superiores.



## Teorema del valor medio. Regla de Barrow

49. Comprueba si se cumplen las condiciones para aplicar el teorema del valor medio a la función  $f(x) = (x-2)^2$  en el intervalo  $[0,2]$ . Si es así calcula el valor medio de  $f$  en dicho intervalo y la abscisa del punto en el que se alcanza dicho valor.

Como  $f$  es una función polinómica, entonces es continua en  $\mathbb{R}$ , en particular, en  $[0,2]$ . Aplicando el teorema del valor medio, se busca  $c \in [0,2]$  tal que  $\int_0^2 (x-2)^2 dx = f(c)(2-0)$ .

$$\int_0^2 (x-2)^2 dx = \left[ \frac{(x-2)^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}, \text{ por tanto, } \frac{8}{3} = f(c)2 \Rightarrow f(c) = \frac{4}{3} \Rightarrow (c-2)^2 = \frac{4}{3} \Rightarrow c = 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}, c = 2 - \frac{2\sqrt{3}}{3},$$

pero solo la segunda pertenece al intervalo  $[0,2]$ .

50. Calcula una aproximación por exceso y otra por defecto de  $\ln 2$  utilizando una partición en cinco subintervalos para calcular la integral definida  $\int_1^2 \frac{dx}{x}$ .

Por defecto: Se toman 5 rectángulos de base 0,2 y altura el extremo derecho.

Por exceso: Se toman 5 rectángulos de base 0,2 y altura el extremo izquierdo.


$$0,2 \left( \frac{1}{1,2} + \frac{1}{1,4} + \frac{1}{1,6} + \frac{1}{1,8} + \frac{1}{2} \right) < \int_1^2 \frac{1}{x} dx < 0,2 \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{1,2} + \frac{1}{1,4} + \frac{1}{1,6} + \frac{1}{1,8} \right)$$

Operando:  $0,6456 < \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 < 0,7456$ .

Por tanto,  $0,6456 < \ln 2 < 0,7456$ .



51. La siguiente región está limitada superiormente por la gráfica de la función  $y = e^x$ .



Halla la altura que debe tener un rectángulo de base 2 para que su área sea igual a la de la región sombreada.

El área de la región sombreada es  $\int_0^2 e^x dx = [e^x]_0^2 = e^2 - 1$ .

El teorema del valor medio nos asegura que existe un número  $c$  del intervalo  $[0,2]$  que cumple

$$\int_0^2 e^x dx = f(c)(2-0).$$

Así pues,  $e^2 - 1 = f(c)2 \Rightarrow f(c) = \frac{e^2 - 1}{2}$ .

Por tanto, el rectángulo de base 2 y altura  $\frac{e^2 - 1}{2}$  tiene igual área que el de la región.

52. Determina el valor de las siguientes integrales definidas.

a)  $\int_{-3}^1 (x^3 - 2x^2 + 5) dx$       d)  $\int_{-2}^0 2^x dx$       g)  $\int_{-1}^1 \frac{5}{1+x^2} dx$

b)  $\int_{-\pi}^{2\pi} \cos(3x-2) dx$       e)  $\int_0^3 \frac{x}{3x^2+1} dx$       h)  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} dx$

c)  $\int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}(2x-1) dx$       f)  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$       i)  $\int_{-2}^2 xe^{-x^2} dx$

a)  $\int_{-3}^1 (x^3 - 2x^2 + 5) dx = \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + 5x \right]_{-3}^1 = -\frac{56}{3}$

f)  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = [\operatorname{arcsen} x]_0^1 = \frac{\pi}{2}$

b)  $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(3x-2) dx = \left[ \frac{\operatorname{sen}(3x-2)}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$

g)  $\int_{-1}^1 \frac{5}{1+x^2} dx = [5\operatorname{arctg} x]_{-1}^1 = 5\frac{\pi}{2} \approx 7,85$

c)  $\int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}(2x-1) dx = \left[ \frac{-\cos(2x-1)}{2} \right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \approx 0,54$

h)  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} dx = \left[ \frac{1}{\cos x} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} - 1$

d)  $\int_{-2}^0 2^x dx = \left[ \frac{2^x}{\ln 2} \right]_{-2}^0 = \frac{3}{\ln 16} \approx 1,08$

i)  $\int_{-2}^2 xe^{-x^2} dx = \left[ -\frac{e^{-x^2}}{2} \right]_{-2}^2 = 0$

e)  $\int_0^3 \frac{x}{3x^2+1} dx = \left[ \frac{\ln(3x^2+1)}{6} \right]_0^3 = \frac{\ln 28}{6} \approx 0,56$

53. Calcula las siguientes integrales definidas.

- a)  $\int_0^1 x \arctg x \, dx$       d)  $\int_{-1}^1 x e^x \, dx$       g)  $\int_0^2 \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^2} \, dx$       j)  $\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^4}} \, dx$
- b)  $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sen x \, dx$       e)  $\int_{1+\sqrt{2}}^{1+\sqrt{5}} \frac{x+1}{x^2-2x} \, dx$       h)  $\int_0^3 \frac{1}{1+2e^x} \, dx$
- c)  $\int_1^2 \frac{dx}{x^2+2x}$       f)  $\int_0^1 \frac{(2x-1)^2}{4x^2+1} \, dx$       i)  $\int_0^1 \frac{x}{1+x^4} \, dx$

a)  $\int x \arctg x \, dx$ . Integración por partes:  $f(x) = \arctg x$ ,  $dg(x) = x$ ,  $df(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ,  $g(x) = \frac{x^2}{2}$ . Por tanto,

$$\int x \arctg x \, dx = \arctg x \frac{x^2}{2} - \int \frac{1}{1+x^2} \frac{x^2}{2} \, dx = \arctg x \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \left[ x - \int \frac{1}{1+x^2} \, dx \right] = \arctg x \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctg x + C \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^1 x \arctg x \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} \arctg x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctg x \right]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

b)  $\int x^2 \sen x \, dx$ . Integración por partes:  $f(x) = x^2$ ,  $dg(x) = \sen x$ ,  $df(x) = 2x$ ,  $g(x) = -\cos x$ , por lo que

$$\int x^2 \sen x \, dx = -x^2 \cos x + \int 2x \cos x \, dx$$

Para obtener ahora  $\int 2x \cos x \, dx$ , se procede de la misma forma:

$$f(x) = 2x, \quad dg(x) = \cos x, \quad df(x) = 2, \quad g(x) = \sen x, \quad \text{Por tanto:}$$

$$\int x^2 \sen x \, dx = -x^2 \cos x + \left[ 2x \sen x - \int 2 \sen x \, dx \right] = -x^2 \cos x + 2x \sen x + 2 \cos x + C.$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sen x \, dx = \left[ -x^2 \cos x + 2x \sen x + 2 \cos x \right]_{-\pi}^{\pi} = 0.$$

c)  $\int \frac{dx}{x^2+2x} = \int \left( \frac{1}{x} + \frac{-1}{x+2} \right) dx = \frac{1}{2} (\ln x - \ln(x+2)) + C \Rightarrow \int_1^2 \frac{dx}{x^2+2x} = \frac{1}{2} [\ln x - \ln(x+2)]_1^2 = \frac{1}{2} \ln \left( \frac{3}{2} \right)$

d)  $\int x e^x \, dx$ . Integración por partes:  $f(x) = x$ ,  $dg(x) = e^x$ ,  $df(x) = 1$ ,  $g(x) = e^x$ , luego

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx = x e^x - e^x + C = (x-1)e^x + C. \text{ Por tanto, } \int_{-1}^1 x e^x \, dx = \left[ (x-1)e^x \right]_{-1}^1 = \frac{2}{e}$$

e)  $\int \left( \frac{-1/2}{x} + \frac{3/2}{x-2} \right) dx = -\frac{1}{2} \ln|x| + \frac{3}{2} \ln|x-2| + C \Rightarrow \int_{1+\sqrt{2}}^{1+\sqrt{5}} \frac{x+1}{x^2-2x} \, dx = \left[ -\frac{1}{2} \ln|x| + \frac{3}{2} \ln|x-2| \right]_{1+\sqrt{2}}^{1+\sqrt{5}} \approx 1,49$

f)  $\int \frac{4x^2+1-4x}{4x^2+1} \, dx = \int \left( 1 - \frac{4x}{4x^2+1} \right) dx = x - \frac{1}{2} \ln(4x^2+1) + C \Rightarrow \int_0^1 \frac{(2x-1)^2}{4x^2+1} \, dx = \left[ x - \frac{1}{2} \ln(4x^2+1) \right]_0^1 = 1 - \frac{\ln 5}{2}$

g)  $\int_0^2 \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^2} \, dx = \left[ -\frac{1}{x^2+x+1} \right]_0^2 = -\frac{1}{7} + 1 = \frac{6}{7}$

h)  $\int_0^3 \frac{1}{1+2e^x} \, dx = \int_0^3 \left( 1 - \frac{2e^x}{1+2e^x} \right) dx = \left[ x - \ln(1+e^x) \right]_0^3 \approx 0,38$

i)  $\int \frac{x}{1+x^4} \, dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+(x^2)^2} \, dx = \frac{1}{2} \arctg(x^2) + C \Rightarrow \int_0^1 \frac{x}{1+x^4} \, dx = \frac{1}{2} \left[ \arctg(x^2) \right]_0^1 = \frac{\pi}{8}$

j)  $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^4}} \, dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+(x^2)^2}} \, dx = -\frac{1}{2} \ln(|\sqrt{x^4+1}-x^2|) + C \Rightarrow \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^4}} \, dx = \left[ -\frac{1}{2} \ln(|\sqrt{x^4+1}-x^2|) \right]_{-1}^1 = 0.$

54. Un profesor apresurado pidió a sus alumnos que calcularan la integral definida  $\int_{-3}^2 \frac{dx}{x^2}$ . Laila trabajó así:

$$\int_{-3}^2 \frac{dx}{x^2} = \left[ -\frac{1}{x} \right]_{-3}^2 = -\frac{1}{2} - \left( -\frac{1}{-3} \right) = -\frac{5}{6}$$

Y después razonó: “estoy segura de que hay algo mal porque sé que la función  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  es positiva en todo su dominio y por tanto, la integral pedida,  $\int_{-3}^2 \frac{dx}{x^2}$ , no puede ser negativa”. ¿Dónde está el error?

La función  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  no está definida para  $x = 0$ , por lo que no es continua en el intervalo  $(-3, 2)$ , así, que no existe la integral definida  $\int_{-3}^2 \frac{1}{x^2} dx$ .

55. Sabiendo que  $\sqrt[5]{2} \approx 1,1487$ ; puedes encontrar otra aproximación de  $\ln 2$  haciendo una partición en cinco subintervalos para calcular  $\int_0^1 2^x dx$ .

Utiliza la integral anterior y la regla de Barrow para demostrar que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} [n(\sqrt[n]{2} - 1)] = \ln 2$ .

Se divide el intervalo  $[0, 1]$  en 5 subintervalos, cada uno de longitud  $\frac{1}{5}$ .

$$S_5 = \frac{1}{5} \left[ 2^{\frac{1}{5}} + 2^{\frac{2}{5}} + 2^{\frac{3}{5}} + 2^{\frac{4}{5}} + 2^{\frac{5}{5}} \right] = \frac{1}{5} [1,1487 + 1,1487^2 + 1,1487^3 + 1,1487^4 + 1,1487^5] \approx 1,545$$

Por otra parte,  $\int_0^1 2^x dx = \left[ \frac{2^x}{\ln 2} \right]_0^1 = \frac{1}{\ln 2} \Rightarrow \frac{1}{\ln 2} \approx 1,545 \Rightarrow \ln 2 \approx 0,64724$

Análogamente, se divide el intervalo  $[0, 1]$  en  $n$  subintervalos, cada uno de longitud:  $\frac{1}{n}$

$$S_n = \frac{1}{n} \left[ 2^{\frac{1}{n}} + 2^{\frac{2}{n}} + \dots + 2^{\frac{n}{n}} \right] = \frac{1}{n} \left[ \frac{1}{2^{\frac{1}{n}} + 2^{\frac{2}{n}} + \dots + 2} \right] = \frac{1}{n} \left( \frac{2 \cdot 2^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n}}}{2^{\frac{1}{n}} - 1} \right) = \frac{2^{\frac{1}{n}}}{n} \left( \frac{1}{2^{\frac{1}{n}} - 1} \right) = \frac{\sqrt[n]{2}}{n} \left( \frac{1}{\sqrt[n]{2} - 1} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_0^1 2^x dx = \frac{1}{\ln 2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{2}}{n} \left( \frac{1}{\sqrt[n]{2} - 1} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2}}{\lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt[n]{2} - 1)} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt[n]{2} - 1)} = \frac{1}{\ln 2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt[n]{2} - 1) = \ln 2$$

**Teorema fundamental del cálculo**

**56. Calcula la derivada de las siguientes funciones.**

a)  $f(x) = \int_1^x \frac{\text{sen } t}{t} dt$

c)  $f(x) = \int_1^{\cos x} \frac{dt}{t}$

b)  $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{2t}$

d)  $f(x) = \int_x^{x^2+1} e^{-t^2} dt$

a) La integral  $\int \frac{\text{sen } t}{t} dt$  no es elemental, así que no se puede calcular dicha integral para después derivarla, pero  $g(t) = \frac{\text{sen } t}{t}$  es continua para  $t > 0$  y el teorema fundamental del cálculo nos asegura que la derivada de  $f(x) = \int_1^x \frac{\text{sen } t}{t} dt$  es  $f'(x) = \frac{\text{sen } x}{x}$ .

b)  $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{2t} = \frac{1}{2} [\ln t]_x^{x^2} = \frac{1}{2} (\ln x^2 - \ln x) = \frac{1}{2} (2 \ln x - \ln x) = \frac{\ln x}{2}$ , su derivada es  $f'(x) = \frac{1}{2x}$ .

c)  $f(x) = \int_1^{\cos x} \frac{dt}{t} = [\ln t]_1^{\cos x} = \ln(\cos x)$ , su derivada  $f'(x) = \frac{-\text{sen } x}{\cos x} = -\text{tg } x$ .

d) La integral  $\int e^{-t^2} dt$  no es elemental, así que no se puede emplear el método de los dos apartados anteriores. La función  $g(t) = e^{-t^2}$  es continua, así pues,  $f(x) = [G(t)]_x^{x^2+1} = G(x^2+1) - G(x)$ , siendo  $G'(x) = e^{-x^2}$ , por tanto:  $f'(x) = G'(x^2+1)2x - G'(x) = 2xe^{-(x^2+1)^2} - e^{-x^2}$

**57. Calcula  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_1^{1+h} \sqrt{x^2+8} dx}{h}$ .**

Si se llama  $f(x) = \sqrt{x^2+8}$  y  $F(x)$  a una primitiva suya,  $F'(x) = f(x)$ , entonces,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_1^{1+h} \sqrt{x^2+8} dx}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+h) - F(1)}{h} = F'(1) = f(1) = \sqrt{1^2+8} = 3.$$

**58. Halla los puntos de inflexión de la función  $g(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ .**

Por el teorema fundamental del cálculo se sabe que la derivada de  $g(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$  es  $g'(x) = e^{-x^2}$  y la segunda derivada es  $g''(x) = -2xe^{-x^2}$ , que se anula si  $x = 0$ .

Además, la segunda derivada es positiva a la izquierda de  $x = 0$  ( $g$  es cóncava hacia arriba) y es negativa a la derecha de  $x = 0$  ( $g$  es cóncava hacia abajo).

Así pues en  $x = 0$  se produce un cambio de curvatura, por tanto, el punto  $A(0, g(0)) = A(0, 0)$  es un punto de inflexión de  $g(x)$ .

59. Calcula la derivada de la función  $f(x) = \int_0^x \cos t^2 dt$ .

Por el teorema fundamental del cálculo se sabe que  $f'(x) = \cos x^2$ .

60. Halla la derivada de estas funciones.

a)  $f(x) = \int_3^x t^2 dt$

c)  $f(x) = \int_x^3 t^2 dt$

b)  $f(x) = \int_3^{\sin x} t^2 dt$

d)  $f(x) = \int_{x^2}^{1+x^3} t^2 dt$

a) Por el teorema fundamental del cálculo se sabe que  $f'(x) = x^2$ .

b)  $f(x) = \int_3^{\sin x} t^2 dt = \left[ \frac{t^3}{3} \right]_3^{\sin x} = \frac{\sin^3 x}{3} - 9$ . Su derivada es  $f'(x) = \sin^2 x$ .

c) Por las propiedades de la integral definida se sabe que  $f(x) = \int_x^3 t^2 dt = -\int_3^x t^2 dt$ . Por tanto,  $f'(x) = -x^2$ .

d)  $f(x) = \int_{x^2}^{1+x^3} t^2 dt = \left[ \frac{t^3}{3} \right]_{x^2}^{1+x^3} = \frac{(1+x^3)^3}{3} - \frac{x^6}{3} \Rightarrow f'(x) = \frac{3(1+x^3)^2 \cdot 3x^2}{3} - \frac{6x^5}{3} = 3x^2(1+x^3)^2 - 2x^5$ .

61. Calcula la derivada de estas funciones.

a)  $f(x) = \int_3^x \frac{1}{\ln(t^2+1)} dt$

c)  $f(x) = \int_3^{\sin x} \frac{1}{\ln(t^2+1)} dt$

b)  $f(x) = \int_x^3 \frac{1}{\ln(t^2+1)} dt$

d)  $f(x) = \int_{x^2}^{1+x^3} \frac{1}{\ln(t^2+1)} dt$

La integral  $\int \frac{1}{\ln(t^2+1)} dt$  no es elemental pero sí se sabe que la función  $g(t) = \frac{1}{\ln(t^2+1)}$  es continua.

a) Por el teorema fundamental del cálculo se sabe que  $f'(x) = \frac{1}{\ln(x^2+1)}$ .

b)  $f(x) = \int_x^3 \frac{1}{\ln(t^2+1)} dt = -\int_3^x \frac{1}{\ln(t^2+1)} dt$ , así pues,  $f'(x) = -\frac{1}{\ln(x^2+1)}$ .

c)  $f(x) = [G(t)]_3^{\sin x} = G(\sin x) - G(3)$ , siendo  $G'(t) = \frac{1}{\ln(t^2+1)}$ .

Por tanto:  $f'(x) = G'(\sin x) \cos x = \frac{\cos x}{\ln(\sin^2 x + 1)}$

d)  $f(x) = [G(t)]_{x^2}^{1+x^3} = G(1+x^3) - G(x^2)$ , siendo

$$G'(t) = \frac{1}{\ln(t^2+1)} \Rightarrow f'(x) = G'(1+x^3)3x^2 - G'(x^2)2x = \frac{3x^2}{\ln((1+x^3)^2+1)} - \frac{2x}{\ln(x^4+1)}$$

62. Sea  $F(x) = \int_1^{x^2} \ln t \, dt$  con  $x \geq 1$ .

a) Calcula  $F'(e)$ .

b) ¿Es  $F''(x)$  una función constante? Justifica tu respuesta.

a)  $F(x) = \int_1^{x^2} \ln t \, dt = [t \ln t - t]_1^{x^2} = x^2 \ln x^2 - x^2 + 1 \Rightarrow F'(x) = 2x \ln x^2 + x^2 \frac{2x}{x^2} - 2x = 2x \ln x^2 + 4x - 2x = 2x \ln x^2 + 2x = 4x \ln x + 2x$ .

Por tanto,  $F'(e) = 4e \ln e + 2e = 6e$ .

b)  $F''(x) = 4 \ln x + 4 + 2 = 4 \ln x + 6$ . No es una función constante porque su derivada no es nula.

63. Sea la función  $F(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} \, dt$  definida para  $x \geq 1$ . Halla los valores de  $x$  en los que alcanza sus máximos y mínimos relativos.

$F'(x) = \frac{\sin x}{x}$ . Esta derivada se anula si  $\sin x = 0$ , es decir, si  $x = \pi + k\pi$  con  $k = 0, 1, 2, \dots$ . Máximo si  $k = 0, 2, 4, \dots$ , y mínimo si  $k = 1, 3, 5, \dots$

64. La función  $F(x)$  está definida por  $F(x) = \int_1^{e^x - x - 1} e^{-t^2} \, dt$ . Halla los puntos en los que se anula  $F'(x)$ .

La integral  $\int e^{-t^2} \, dt$  no es elemental, así que no se puede calcular dicha integral para después derivarla. La función  $g(t) = e^{-t^2}$  es continua, así pues,  $F(x) = [G(t)]_1^{e^x - x - 1} = G(e^x - x - 1) - G(1)$ , siendo  $G'(x) = e^{-x^2}$ , por tanto:  $F'(x) = G'(e^x - x - 1)(e^x - 1) = e^{-(e^x - x - 1)^2} (e^x - 1)$ . Dicha derivada se anula si  $e^x - 1 = 0 \Rightarrow x = 0$ .

65. Sea  $F(x) = \int_0^{2x} e^{t^2} \, dt$ . Calcula  $F'(0)$ .

La función  $g(t) = e^{t^2}$  es continua, así pues,  $F(x) = [G(t)]_0^{2x} = G(2x) - G(0)$ , siendo  $G'(x) = e^{x^2}$ , por tanto:  $F'(x) = G'(2x) \cdot 2 = 2e^{(2x)^2} \Rightarrow F'(0) = 2$ .

66. a) Calcula los extremos relativos y absolutos de la función  $f: [-7,1] \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = x^3 + 6x^2 + 49$ .

b) Sea  $\beta$  el punto en el que  $f$  alcanza su máximo absoluto. Calcula  $\int_{-7}^{\beta} f(x) dx$ .

a)  $f'(x) = 3x^2 + 12x = 3x(x + 4)$  se anula si  $x = 0$  o si  $x = -4$ . Aplicando el criterio de la segunda derivada se ve que  $A(-4, 209)$  es un máximo relativo y  $B(0, 49)$  es un mínimo relativo. Se comparan los valores:

$$f(-4) = 209 \qquad f(0) = 49 \qquad f(-7) = 0 \qquad f(1) = 56$$

Así pues,  $A(-4, 209)$  es el máximo absoluto y  $C(-7, 0)$  es el mínimo absoluto.

b) Ya se ha calculado  $\beta = -4 \Rightarrow \int_{-7}^{-4} (x^3 + 6x^2 + 49) dx = \left[ \frac{x^4}{4} + 2x^3 + 49x \right]_{-7}^{-4} = \frac{675}{4}$

67. Si  $\int_c^x f(t) dt = 5x^3 + 40$ , ¿qué función es  $f(x)$ ? ¿Cuánto vale  $c$ ?

Sea  $g(x) = \int_c^x f(t) dt = 5x^3 + 40$ ; entonces  $g'(x) = f(x) = 15x^2$ .

Por otra parte, tomando  $x = c$ ,  $g(c) = 0 = 5c^3 + 40$ , de donde  $c = -2$ .

68. Halla el punto del intervalo  $[0, 2]$  en el que la función  $f(x) = \int_0^x \frac{t-1}{1+t^2} dt$  alcanza su mínimo.

Como la función  $g(t) = \frac{t-1}{1+t^2}$  es continua, se sabe que la derivada de  $f(x)$  es  $f'(x) = \frac{x-1}{1+x^2}$ .

Esta derivada se anula si  $x = 1$  y como a la izquierda de 1 es negativa y a su derecha es positiva, en el punto de abscisa  $x = 1$  se encuentra el mínimo de la función  $f(x)$ .

69. a) Si  $f$  es una función continua, obtén  $F'(x)$  siendo:  $F(x) = \int_0^x (f(t) + t^2 + t^3) dt$ .

b) Si  $f(1) = 1$  y además  $\int_0^1 f(t) dt = 1$ , halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de  $F(x)$  en el punto  $(1, F(1))$ .

a) Como la función  $g(t) = f(t) + t^2 + t^3$  es continua, el teorema fundamental del cálculo asegura que la derivada de  $F(x)$  es  $F'(x) = f(x) + x^2 + x^3$ .

b) La ecuación de la recta tangente buscada es  $y - F(1) = F'(1)(x - 1)$ . Se calcula entonces  $F(1)$  y  $F'(1)$ :

$$F(1) = \int_0^1 (f(t) + t^2 + t^3) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_0^1 t^2 dt + \int_0^1 t^3 dt = 1 + \left[ \frac{t^3}{3} \right]_0^1 + \left[ \frac{t^4}{4} \right]_0^1 = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{19}{12}$$

$$F'(1) = f(1) + 1^2 + 1^3 = 1 + 1 + 1 = 3$$

La recta tangente es  $y - \frac{19}{12} = 3(x - 1)$ , es decir,  $y = 3x - \frac{17}{12}$ .

70. Dada  $f(x) = \frac{-4x}{(1+x^2)^2}$ , determina el valor del parámetro  $a > 0$  para el que  $\int_0^a f(x) dx = -1$ .

$\int_0^a \frac{-4x}{(1+x^2)^2} dx = \left[ \frac{2}{1+x^2} \right]_0^a = \frac{2}{1+a^2} - 2 = -1 \Rightarrow \frac{2}{1+a^2} = 1 \Rightarrow 1+a^2 = 2 \Rightarrow a = 1, a = -1$ , y como solo vale la solución positiva, concluimos que  $a = 1$ .

71. Sean las funciones  $F(x) = \int_1^x \sqrt{5+e^{t^2}} dt$  y  $g(x) = x^2$ , calcula  $[F(g(x))]'$ .

Como la función  $f(t) = \sqrt{5+e^{t^2}}$  es continua, por el teorema fundamental del cálculo se tiene que  $F'(x) = \sqrt{5+e^{x^2}}$ . Aplicando la regla de la cadena,  $[F(g(x))]' = F'(g(x))g'(x) = F'(x^2)2x = 2x\sqrt{5+e^{x^4}}$ .

72. Calcula  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{x^3} e^{t^2} dt}{x \int_0^{x^2} e^{t^2} dt}$ .


Al presentarse una indeterminación del tipo  $\frac{\infty}{\infty}$  y estar en las hipótesis del teorema de L'Hôpital, se aplica la toma de derivadas en el límite y el teorema fundamental del cálculo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{x^3} e^{t^2} dt}{x \int_0^{x^2} e^{t^2} dt} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x^6} 3x^2}{\int_0^{x^2} e^{t^2} dt + xe^{x^4} 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x^5 e^{x^6} 3x^2 + 6xe^{x^6}}{2xe^{x^4} + 4xe^{x^4} + 2x^2 e^{x^4} 4x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6xe^{x^6} [3x^6 + 1]}{2xe^{x^4} [3 + 4x^4]} = +\infty$$

**Áreas de recintos**

73. Calcula el área encerrada entre  $f(x) = \frac{6x}{x^2+1}$  y el eje de abscisas para  $x \in [2, 5]$ .

$$A = \int_2^5 \left( \frac{6x}{x^2+1} \right) dx = [3\ln(x^2+1)]_2^5 = 3(\ln 26 - \ln 5) u^2.$$






74. Dibuja la superficie limitada por la recta  $y = x + 1$  y la parábola  $y = x^2 - 4x + 5$ . Halla su área.

Los puntos de corte de ambas funciones se obtienen resolviendo la ecuación:

$$x^2 - 4x + 5 = x + 1 \Rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Rightarrow x = 1, x = 4$$

Los puntos de corte son  $A(1,2)$  y  $B(4,5)$ .

La región está comprendida entre dos gráficas: la recta  $y = x + 1$  por encima y la parábola  $y = x^2 - 4x + 5$  por debajo.



$$\text{El área de la región es: } A = \int_1^4 (x + 1 - (x^2 - 4x + 5)) dx = \int_1^4 (-x^2 + 5x - 4) dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - 4x \right]_1^4 = \frac{9}{2} u^2$$


75. Dibuja la gráfica de  $f(x) = |x^2 - 4|$  en el intervalo  $[-3,3]$  y calcula su integral.

La gráfica de  $f(x)$  se dibuja muy fácilmente a partir de la de la función

$g(x) = x^2 - 4$ , sin más que reflejar su parte negativa respecto al eje X.

Como la función es positiva y simétrica respecto al eje Y, y el intervalo está centrado en el origen, se calcula la integral de esta forma:

$$\begin{aligned} \int_{-3}^3 |x^2 - 4| dx &= 2 \int_0^2 (-x^2 + 4) dx + 2 \int_2^3 (x^2 - 4) dx = \\ &= 2 \left[ -\frac{x^3}{3} + 4x \right]_0^2 + 2 \left[ \frac{x^3}{3} - 4x \right]_2^3 = \frac{46}{3} u^2. \end{aligned}$$



76. Halla el valor de  $a > 0$ , tal que  $\int_0^{a-1} (x+1) dx = \frac{9}{2}$ .

$$\int_0^{a-1} (x+1) dx = \left[ \frac{x^2}{2} + x \right]_0^{a-1} = \frac{(a-1)^2}{2} + a - 1 = \frac{9}{2} \Rightarrow a^2 - 2a + 1 + 2a - 2 = 9 \Rightarrow a^2 = 10.$$

Descartando la solución que no es positiva, concluimos que  $a = \sqrt{10}$ .


77. Halla el área de la región comprendida entre las parábolas  $y = x^2$  e  $y = -2x^2 + 3$ .

$$x^2 = -2x^2 + 3 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = -1, x = 1.$$

Los puntos de corte son  $A(-1,1)$  y  $B(1,1)$ . La región está comprendida entre dos gráficas,

$y = -2x^2 + 3$  está por arriba e  $y = x^2$  está por debajo. Como ambas funciones son simétricas respecto del eje Y, el área de la región es:

$$A = 2 \int_0^1 (-2x^2 + 3 - x^2) dx = 2 \int_0^1 (-3x^2 + 3) dx = 2[-x^3 + 3x]_0^1 = 4 \text{ u}^2.$$




78. Calcula el área de la región limitada por las curvas  $y = x^2$ ,  $y = x^{\frac{1}{3}}$  y las rectas  $x = -1$  y  $x = 1$ .

Las gráficas de las funciones se cortan en los puntos  $O(0,0)$  y  $A(1,1)$ .

La región está formada por dos trozos:

$$A = \int_{-1}^0 (x^2 - x^{\frac{1}{3}}) dx + \int_0^1 (x^{\frac{1}{3}} - x^2) dx = \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} \right]_{-1}^0 + \left[ \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{3}{2} \text{ u}^2$$




79. Calcula el área limitada por la gráfica de la función  $y = \ln x$ , el eje X y la recta tangente a dicha gráfica en el punto  $x = e$ .

La recta tangente tiene por ecuación  $y - f(e) = f'(e)(x - e)$ , es decir  $y = \frac{1}{e}x$ .

El recinto está formado por dos regiones. Una, limitada por la recta tangente y el eje X entre 0 y 1, es un triángulo de base 1 y altura  $\frac{1}{e}$ , su área es  $A_1 = \frac{1}{2e}$ .

$$\text{El área de la otra es: } A_2 = \int_1^e \left( \frac{x}{e} - \ln x \right) dx = \left[ \frac{x^2}{2e} - x \ln x + x \right]_1^e = \frac{e}{2} - \frac{1}{2e} - 1$$

$$\text{El área del recinto es } A = A_1 + A_2 = \frac{1}{2e} + \frac{e}{2} - \frac{1}{2e} - 1 = \frac{e}{2} - 1 \text{ u}^2.$$



80. \*a) Dibuja el recinto limitado por las curvas de ecuaciones  $y = \sin x$ ,  $y = \cos x$ ,  $x = 0$  y  $x = \frac{\pi}{3}$ .

b) Calcula el área del recinto del apartado anterior.


a) El punto de corte de ambas funciones se encuentra resolviendo la ecuación

$$\sin x = \cos x, \text{ cuya única solución en el intervalo } \left[ 0, \frac{\pi}{3} \right] \text{ es } x = \frac{\pi}{4}.$$

$$b) A_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx = [\sin x + \cos x]_0^{\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} - 1$$

$$A_2 = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\sin x - \cos x) dx = [-\cos x - \sin x]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{2}$$

$$A = A_1 + A_2 = \sqrt{2} - 1 - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{2} - 3 - \sqrt{3}}{2} \text{ u}^2.$$



81. a) Representa las curvas de ecuaciones  $y = x^2 - 3x + 3$  e  $y = x$ .

b) Halla el área del recinto limitado por dichas curvas.

a) Los puntos de corte se encuentran resolviendo la ecuación


$$x^2 - 3x + 3 = x \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1, x = 3$$

Los puntos de corte son  $A(1,1)$  y  $B(3,3)$ .

b) El recinto está limitado superiormente por la recta e inferiormente por la parábola.


Su área viene dada por el valor de la integral:

$$A = \int_1^3 (x - (x^2 - 3x + 3)) dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 3x \right]_1^3 = \frac{4}{3} \text{ u}^2.$$



82. Halla el área que encierra una loma de  $f(x) = \text{sen } x$ .

Elegimos la una loma que quede por encima del eje X, por ejemplo, la que nos encontramos entre 0 y  $\pi$ .



$$A = \int_0^{\pi} \text{sen } x dx = [-\cos x]_0^{\pi} = -\cos \pi + \cos 0 = 2 \text{ u}^2.$$

83. Se considera la función  $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } |x| < 2 \\ \frac{1}{x^2} & \text{si } |x| \geq 2 \end{cases}$ .

- a) Calcula  $a$  y  $b$  para que  $f$  sea continua y derivable en  $\mathbb{R}$ .
- b) Para los valores de  $a$  y  $b$  obtenidos en el apartado anterior, determina el área de la región acotada por la gráfica de  $f$ , el eje horizontal y las rectas  $x = 1$ ,  $x = 3$ .
- a) Como intervienen valores absolutos, debemos expresar la función desglosando dichos valores absolutos:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{si } x \leq -2 \\ ax^2 + b & \text{si } -2 < x < 2 \\ \frac{1}{x^2} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Está claro que la función es continua en el interior de los tres intervalos de definición. Se impone la condición de que sea continua en los extremos de estos intervalos.

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} \left( \frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (ax^2 + b) = 4a + b, \quad f(-2) = \frac{1}{4} \Rightarrow 4a + b = \frac{1}{4} \Rightarrow 16a + 4b = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (ax^2 + b) = 4a + b, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left( \frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{4}, \quad f(2) = \frac{1}{4} \Rightarrow 4a + b = \frac{1}{4}, \quad \text{que es la misma ecuación que la anterior.}$$

Así pues, si  $4a + b = \frac{1}{4}$ , es decir, si  $16a + 4b = 1$  la función será continua en todo  $\mathbb{R}$ .

Se impone ahora la condición de que también sea derivable.

La función derivada para valores de  $x$  distintos de  $-2$  y  $2$  es:  $f'(x) = \begin{cases} \frac{-2}{x^3} & \text{si } x < -2 \\ 2ax & \text{si } -2 < x < 2 \\ \frac{-2}{x^3} & \text{si } x > 2 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} \left( \frac{-2}{x^3} \right) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} 2ax = -4a \Rightarrow \frac{1}{4} = -4a \Rightarrow a = -\frac{1}{16}$$

(Muy importante: ahora hay que comprobar que este valor de  $a$  es el mismo que hace que exista  $f'(2)$ . Si no fuese el mismo, concluiríamos que  $f$  no es derivable en todo  $\mathbb{R}$ ).

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 2ax = 4a, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left( \frac{-2}{x^3} \right) = -\frac{1}{4} \Rightarrow -\frac{1}{4} = 4a \Rightarrow a = -\frac{1}{16}$$

Para este valor de  $a$ ,  $b = \frac{1}{4} - 4a = \frac{1}{2}$ .

Así pues, si  $a = -\frac{1}{16}$  y  $b = \frac{1}{2}$ , la función es continua y derivable en todo  $\mathbb{R}$ .  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{si } x \leq -2 \\ \frac{-x^2}{16} + \frac{1}{2} & \text{si } -2 < x < 2 \\ \frac{1}{x^2} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

- b) Como la función  $f(x)$  es positiva en todo  $\mathbb{R}$ , el área pedida coincide con esta integral definida:

$$A = \int_1^2 \left( \frac{-x^2}{16} + \frac{1}{2} \right) dx + \int_2^3 \left( \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[ \frac{-x^3}{48} + \frac{x}{2} \right]_1^2 + \left[ \frac{-2}{x^3} \right]_2^3 = \frac{17}{48} + \frac{1}{6} = \frac{25}{48} \text{ u}^2.$$

84. Halla el área del recinto limitado por la gráfica de la función  $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$ , y la recta tangente a dicha gráfica en el máximo relativo.


Representa gráficamente la función hallando los puntos de corte con los ejes y los extremos relativos.

La función  $f(x) = x^3 - 2x^2 + x = x(x-1)^2$  corta al eje Y en el punto  $O(0,0)$  y al eje X en los puntos  $O(0,0)$  y  $A(1,0)$ .

La derivada de la función es  $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$  y se anula si  $x = 1$  o si  $x = \frac{1}{3}$ .

$B\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{27}\right)$  es un máximo y  $A(1,0)$  es un mínimo.

La recta tangente en el máximo es  $y = \frac{4}{27}$ . Para hallar los puntos de corte de dicha



tangente con la gráfica de la función, se resuelve la ecuación  $x^3 - 2x^2 + x = \frac{4}{27}$ , cuyas soluciones son  $x = \frac{1}{3}$  y  $x = \frac{4}{3}$ . El recinto está limitado superiormente por la recta e inferiormente por la cúbica.


$$A = \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{4}{3}} \left( \frac{4}{27} - (x^3 - 2x^2 + x) \right) dx = \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{4}{3}} \left( -x^3 + 2x^2 - x + \frac{4}{27} \right) dx = \left[ -\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + \frac{4x}{27} \right]_{\frac{1}{3}}^{\frac{4}{3}} = \frac{1}{12} u^2.$$

85. Sean las funciones  $f(x) = x^2$  y  $g(x) = x^3$ , halla el área encerrada por las gráficas de  $f$ , de  $g$  y de la recta  $x = 2$ .

Las dos funciones se cortan en los puntos  $A(0,0)$  y  $B(1,1)$ .

Debemos hallar el área del recinto limitado superiormente por  $g(x) = x^3$  e inferiormente por  $f(x) = x^2$ , entre  $x = 1$  y  $x = 2$ .

$$\text{El área la da la integral: } A = \int_1^2 (x^3 - x^2) dx = \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right]_1^2 = 4 - \frac{8}{3} - \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) = \frac{17}{12} u^2$$



86. Sea la función definida por  $f(x) = x^2 + \sqrt{2}x + \frac{1}{4}$ .

a) Dibuja el recinto limitado por la gráfica de  $f$  y sus tangentes en los puntos de abscisa  $x_0 = \frac{1}{2}$  y  $x_1 = -\frac{1}{2}$ .


b) Prueba que el eje de ordenadas divide el recinto anterior en dos que tienen igual área.

a) La ecuación de la tangente en el punto de abscisa  $x_0 = \frac{1}{2}$  es  $y = (1 + \sqrt{2})x$  y la de la tangente en el punto de abscisa  $x_1 = -\frac{1}{2}$  es  $y = (-1 + \sqrt{2})x$ .

b) Si  $x < 0$ , el área es:

$$A = \int_{-\frac{1}{2}}^0 \left( x^2 + \sqrt{2}x + \frac{1}{4} - (-1 + \sqrt{2})x \right) dx = \left[ \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4} \right]_{-\frac{1}{2}}^0 = \frac{1}{24} u^2$$

$$\text{Si } x > 0, \text{ el área es: } A = \int_0^{\frac{1}{2}} \left( x^2 + \sqrt{2}x + \frac{1}{4} - (1 + \sqrt{2})x \right) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left( x^2 - x + \frac{1}{4} \right) dx = \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{24} u^2$$




87. a) Halla el área del triángulo formado por el eje  $X$  y las rectas tangente y normal a la curva  $y = e^{-x}$  en el punto de abscisa  $x = -1$ .
- b) Halla el área de la región limitada por la curva de ecuación  $y = e^{-x}$  y el eje  $X$  para los valores  $-1 \leq x \leq 0$ .

- a) La derivada de  $f(x) = e^{-x}$  es  $f'(x) = -e^{-x}$ . La recta tangente a  $f(x) = e^{-x}$  en el punto de abscisa  $x = -1$  es  $y - f(-1) = f'(-1)(x + 1)$ , es decir:  $y = -ex$ .

La recta normal es  $y - f(-1) = \frac{-1}{f'(-1)}(x + 1)$ , es decir:  $y = \frac{1}{e}x + \frac{1}{e} + e$ .

Así pues, estas rectas cortan al eje de abscisas en los puntos de abscisas  $x = 0$ ,  $x = -e^2 - 1$ , respectivamente, con lo que la base del triángulo en cuestión es  $e^2 + 1$  y su altura  $e$ .

Su área es  $\frac{e^3 + e}{2} u^2$ .




- b) La región está situada por encima del eje  $X$ .

Su área es el valor de la integral:  $A = \int_{-1}^0 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_{-1}^0 = -1 + e = e - 1 u^2$

88. Calcular  $a > 0$  para que el área encerrada por la gráfica de  $f(x) = \text{sen } x$ , el eje  $y = 0$ , y la recta  $x = a$ , sea  $\frac{1}{2}$ .

$$\int_0^a \text{sen } x dx = [-\cos x]_0^a = -\cos a + \cos 0 = -\cos a + 1 = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos a = \frac{1}{2} \Rightarrow a = \frac{\pi}{3}$$




89. Sea  $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  la función dada por  $f(x) = \ln(x + 1)$ .

- a) Esboza el recinto limitado por la gráfica de  $f$ , el eje  $Y$  y la recta  $y = 1$ . Calcula los puntos de corte de las gráficas.
- b) Halla el área del recinto anterior.

- a) La gráfica de  $f(x) = \ln(x + 1)$  es la gráfica del  $g(x) = \ln x$  desplazada hacia su izquierda una unidad. Su dominio es  $D(f) = (-1, +\infty)$ , es siempre creciente y tiene una asíntota vertical en  $x = -1$ .

Los puntos de corte con  $y = 1$ , se calculan resolviendo la ecuación  $\ln(x + 1) = 1$ , es decir.  $x + 1 = e$ ,  $x = e - 1$ . El único punto de corte es  $A(e - 1, 1)$ .



- b) El área del recinto pedido nos lo da el valor de la integral  $A = \int_0^{e-1} [1 - \ln(x + 1)] dx$ . Calculemos primero

$$\int \ln(x + 1) dx \text{ por partes: } f(x) = \ln(x + 1), f'(x) = \frac{1}{x + 1}, g'(x) = 1, g(x) = x$$

$$\int \ln(x + 1) dx = x \ln(x + 1) - \int \frac{x}{x + 1} dx = x \ln(x + 1) - \int \left(1 - \frac{1}{x + 1}\right) dx = x \ln(x + 1) - x + \ln(x + 1) =$$

$= (x + 1) \ln(x + 1) - x + C$  Por tanto, el área es:


$$A = \int_0^{e-1} [1 - \ln(x + 1)] dx = [x - ((x + 1) \ln(x + 1) - x)]_0^{e-1} = [2x - (x + 1) \ln(x + 1)]_0^{e-1} = e - 2 u^2$$

90. Dada la función  $f(x) = \frac{x^2 - 12}{x^2 + 4}$ , calcula el área de la región acotada encerrada por su gráfica y el eje X.

La función corta al eje X en los puntos  $A(-\sqrt{12}, 0) = A(-2\sqrt{3}, 0)$  y  $B(2\sqrt{3}, 0)$ .

El recinto está por debajo del eje X; además la función es simétrica respecto del eje Y, así

pues, el área de la región viene dada por:  $A = 2 \left( -\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{x^2 - 12}{x^2 + 4} dx \right)$



Se calcula esa integral:

$$\int \frac{x^2 - 12}{x^2 + 4} dx = \int \left( 1 - \frac{16}{x^2 + 4} \right) dx = \int dx - 8 \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{2}\right)^2} dx = x - 8 \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

$$A = 2 \left( -\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{x^2 - 12}{x^2 + 4} dx \right) = -2 \left[ x - 8 \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{2}\right) \right]_0^{2\sqrt{3}} = -2 \left( 2\sqrt{3} - \frac{8\pi}{3} \right) = \frac{16\pi}{3} - 4\sqrt{3} \text{ u}^2$$

91. a) Halla la recta tangente a la curva de ecuación  $y = x^3 - 3x$  en el punto de abscisa  $x = -1$ .

- b) Dibuja el recinto limitado por dicha recta tangente y la curva dada y calcula el área.


- a) La derivada de ecuación  $y = x^3 - 3x$  es  $f'(x) = 3x^2 - 3$ .

La ecuación de la recta tangente es  $y - f(-1) = f'(-1)(x - (-1))$ , es decir,  $y = 2$ .


- b) Los puntos de corte de la curva  $y = x^3 - 3x$  y la recta  $y = 2$  se obtienen resolviendo la ecuación  $x^3 - 3x = 2 \Rightarrow x^3 - 3x - 2 = 0 \Rightarrow (x+1)^2(x-2) = 0$ :

$A(-1, 2)$  y  $B(2, 2)$  son los puntos de corte.

$$A = \int_{-1}^2 (2 - (x^3 - 3x)) dx = \left[ \frac{-x^4}{4} + \frac{3x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^2 = 6 - \left( -\frac{3}{4} \right) = \frac{27}{4} \text{ u}^2$$



92. Sea  $f(x) = x^2$ , calcula en función de  $t$  el área limitada por la parábola y la cuerda  $OM$ . Sean  $N$  el punto de la parábola en el que la tangente es paralela a dicha cuerda. Demuestra que sea cual sea el valor de  $t$ , el área del segmento parabólico es  $\frac{4}{3}$  del área del triángulo  $OMN$ .



El punto  $M$  tiene por coordenadas  $M(t, t^2)$ , así pues, la pendiente de  $OM$  es  $\frac{t^2}{t} = t$ .

La recta tangente en el punto  $N(n, n^2)$  tiene, pues, pendiente  $t$ , así pues,  $f'(n) = t$ , es decir,  $2n = t$  y, por tanto,  $n = \frac{t}{2}$ . El punto  $N$  es  $N\left(\frac{t}{2}, \frac{t^2}{4}\right)$ . La recta que contiene a  $OM$  tiene por ecuación  $y = tx$ , así pues, el segmento parabólico tiene un área de:

$$A_1 = \int_0^t (tx - x^2) dx = \left[ \frac{tx^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^t = \frac{t^3}{2} - \frac{t^3}{3} = \frac{t^3}{6} \text{ u}^2$$

Hallemos ahora el área del triángulo  $OMN$ .

Tomamos como base el segmento  $OM$ , cuya longitud es  $\sqrt{(t^2)^2 + t^2} = t\sqrt{t^2 + 1}$ .

La altura,  $h$ , del triángulo  $OMN$  mide  $h = d\left(N, OM\right) = d\left(\left(\frac{t}{2}, \frac{t^2}{4}\right), tx - y = 0\right) = \frac{\left|\frac{t^2}{2} - \frac{t^2}{4}\right|}{\sqrt{t^2 + 1}} = \frac{t^2}{4\sqrt{t^2 + 1}}$ .

El área del triángulo es:  $A_2 = \frac{t\sqrt{t^2 + 1} \cdot \frac{t^2}{4\sqrt{t^2 + 1}}}{2} = \frac{t^3}{8} \text{ u}^2$ . Así pues,  $\frac{A_1}{A_2} = \frac{4}{3}$ , de donde  $A_1 = \frac{4}{3} A_2$ , como se quería probar.

### Aplicaciones de la integral

93. Un móvil se desplaza con la ecuación de movimiento  $y = \sqrt{(t+1)^3}$ , donde  $t$  representa el tiempo. Calcula el espacio recorrido en el intervalo de tiempo  $[0, 3]$ .

$$S = \int_0^3 \sqrt{(x+1)^3} dx = \left[ \frac{2}{5} \sqrt{(x+1)^5} \right]_0^3 = \frac{2}{5} \sqrt{4^5} - \frac{2}{5} \sqrt{1^5} = \frac{64}{5} - \frac{2}{5} = \frac{62}{5} \text{ u}$$



94. Esboza la gráfica de la función  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 9$  y halla la longitud de dicha curva entre  $x = 1$  y  $x = 27$ .

Se expresa la función de la curva de manera explícita, es decir,


$$\text{despejando } y: y^{\frac{2}{3}} = 9 - x^{\frac{2}{3}} \Rightarrow y = \left(9 - x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

$$\text{Su derivada es } y' = \frac{3}{2} \left(9 - x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} \left(-\frac{2}{3}\right) \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}.$$

$$(y')^2 = \frac{9 - x^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}}, \quad 1 + (y')^2 = \frac{9}{2} \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}}, \quad \int \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int \frac{3}{2} \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} dx = \frac{9\sqrt[3]{x^2}}{2}.$$

La longitud del tramo de curva pedido es:

$$L = \int_1^{27} \sqrt{1 + (y')^2} dx = \left[ \frac{9\sqrt[3]{x^2}}{2} \right]_1^{27} = \frac{9}{2} (9 - 1) = 36 \text{ u}$$




95. Dada  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$  calcula la longitud del arco de curva entre  $x = 0$  y  $x = b$  donde  $b < 1$ .

Representa gráficamente dicha función, calcula geoméricamente la longitud de dicho arco y observa la igualdad de los resultados obtenidos.

$$\text{La derivada de la función } f(x) = \sqrt{1 - x^2} \text{ es } f'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{1 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

La longitud pedida es:

$$L_0^b = \int_0^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_0^b \sqrt{1 + \left[\frac{-x}{\sqrt{1 - x^2}}\right]^2} dx = \int_0^b \sqrt{1 + \frac{x^2}{1 - x^2}} dx = \int_0^b \sqrt{\frac{1}{1 - x^2}} dx = [\arcsen x]_0^b = \arcsen b \text{ u}$$



La gráfica de la función es una semicircunferencia y la longitud del arco pedido es justamente el arco que corresponde al ángulo  $\beta$  que es precisamente el ángulo cuyo seno es  $b$ , es decir, el arco seno de  $b$ .

96. Calcula la longitud de los siguientes arcos de curva:

a)  $f(x) = \frac{\sqrt{x}(4x-3)}{6}$  en  $[1,9]$

b)  $f(x) = \frac{x^4}{8} + \frac{1}{4x^2}$  en  $[1,3]$

a) La derivada de la función  $f(x) = \frac{1}{6}\sqrt{x}(4x-3)$  es  $f'(x) = \frac{4x-1}{4\sqrt{x}}$ .

$$\text{La longitud pedida es } L_1^9 = \int_1^9 \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx = \int_1^9 \sqrt{1+\left[\frac{4x-1}{4\sqrt{x}}\right]^2} dx = \int_1^9 \sqrt{\frac{(4x+1)^2}{16x}} dx = \int_1^9 \frac{4x+1}{4\sqrt{x}} dx$$

Esa última integral la calcularemos mediante un cambio de variable:

$$g(x) = \sqrt{x} = t, \quad g'(x) dx = \frac{dx}{2\sqrt{x}} = dt \Rightarrow dx = 2\sqrt{x} dt = 2t dt$$

$$\int \frac{4x+1}{4\sqrt{x}} dx = \int \frac{4t^2+1}{4t} 2t dt = \int \frac{4t^2+1}{2} dt = \int \left(2t^2 + \frac{1}{2}\right) dt = \frac{2t^3}{3} + \frac{t}{2} = \frac{2(\sqrt{x})^3}{3} + \frac{\sqrt{x}}{2} + C$$


$$\text{Por tanto, } L_1^9 = \int_1^9 \frac{4x+1}{4\sqrt{x}} dx = \left[ \frac{2(\sqrt{x})^3}{3} + \frac{\sqrt{x}}{2} \right]_1^9 = \frac{55}{3} \text{ u}$$

b) La derivada de la función  $f(x) = \frac{x^4}{8} + \frac{1}{4x^2}$  es  $f'(x) = \frac{4x^3}{8} + \frac{-8x}{16x^4} = \frac{x^3}{2} - \frac{1}{2x^3} = \frac{x^6-1}{2x^3}$ .

$$\text{La longitud pedida es } L_1^3 = \int_1^3 \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx = \int_1^3 \sqrt{1+\left[\frac{x^6-1}{2x^3}\right]^2} dx = \int_1^3 \sqrt{\frac{(x^6+1)^2}{4x^6}} dx = \int_1^3 \frac{x^6+1}{2x^3} dx =$$

$$= \int_1^3 \left(\frac{x^3}{2} + \frac{1}{2x^3}\right) dx = \left[ \frac{x^4}{8} - \frac{1}{4x^2} \right]_1^3 = \frac{92}{9} \text{ u.}$$

97. Halla el volumen del cono que se obtiene al girar alrededor del eje X la región comprendida entre dicho eje y el segmento de la figura. Comprueba el resultado.



Se trata de hallar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar  $y = \frac{x}{2}$  alrededor del eje X.

$$\text{Se sabe que dicho volumen es igual a: } V = \int_0^4 \pi \left(\frac{x}{2}\right)^2 dx = \pi \int_0^4 \frac{x^2}{4} dx = \pi \left[ \frac{x^3}{12} \right]_0^4 = \pi \frac{4^3}{12} = \frac{16\pi}{3} \text{ u}^3$$

El sólido que se forma es un cono de radio 2 y altura 4. Su volumen es:  $V = \frac{1}{3} \pi \cdot 2^2 \cdot 4 = \frac{16\pi}{3} \text{ u}^3$

98. Calcula el volumen del cuerpo que se obtiene al girar la región entre el eje  $X$  y la gráfica de  $y = \frac{1}{\sqrt{2+x^2}}$ , en torno al eje  $X$  y entre las rectas  $x = 0$  y  $x = \sqrt{2}$ .


Se trata de hallar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar  $y = \frac{1}{\sqrt{2+x^2}}$  alrededor del eje  $X$ .

Se sabe que dicho volumen es igual a:  $V = \int_0^{\sqrt{2}} \pi \left( \frac{1}{\sqrt{2+x^2}} \right)^2 dx = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{2+x^2} dx$

Se calcula esta integral que va a dar lugar a una arco tangente.

$$\int \frac{1}{2+x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{\frac{\sqrt{2}}{1+\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2}}{1+\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C = \frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C$$

El volumen es:  $V = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{2+x^2} dx = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \left[ \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \cdot (\operatorname{arctg}1 - \operatorname{arctg}0) = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2\sqrt{2}}{8} u^3$



99. Halla el volumen engendrado por la región plana definida por el eje  $X$ , la curva de ecuación  $y = e^{-x}$ , el eje  $Y$  y la recta  $x = 3$  al girar alrededor del eje  $X$ .

$$V = \int_0^3 \pi (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^3 e^{-2x} dx = \pi \left[ \frac{-e^{-2x}}{2} \right]_0^3 = \pi \left( \frac{-e^{-6}}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \left( 1 - \frac{1}{e^6} \right) u^3.$$

100. Calcula el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje  $X$  el recinto limitado por la gráfica de  $f(x) = \ln(x)$ , y las rectas  $y = 0$ ,  $x = 1$ ,  $x = e$ .


El volumen nos lo da la integral  $\int_1^e \pi (\ln x)^2 dx = \pi \int_1^e (\ln x)^2 dx$ .

La integral  $\int (\ln x)^2 dx$  la calculamos por partes:  $f(x) = (\ln x)^2$ ,  $f'(x) = \frac{2 \ln x}{x}$ ,  $g'(x) = 1$ ,  $g(x) = x$

$$\int (\ln x)^2 dx = x(\ln x)^2 - \int \frac{2 \ln x}{x} x dx = x(\ln x)^2 - 2 \int \ln x dx = x(\ln x)^2 - 2(x \ln x - x) = x((\ln x)^2 - 2 \ln x + 2)$$

$$V = \int_1^e \pi (\ln x)^2 dx = \pi \int_1^e (\ln x)^2 dx = \pi \left[ x((\ln x)^2 - 2 \ln x + 2) \right]_1^e = (e-2)\pi \approx 2,26 u^3.$$

101. La velocidad de un móvil que parte del origen viene en m/s por la gráfica:



- a) Calcula la función que da el espacio recorrido en función del tiempo y esboza su gráfica.  
 b) Prueba que el área bajo la curva que da la velocidad coincide con el espacio total recorrido.
- a) La función espacio recorrido es una primitiva de la velocidad, puesto que la velocidad es la derivada del espacio. Observando la gráfica, la función velocidad es continua y está definida a trozos por la siguiente

$$\text{expresión: } v(t) = \begin{cases} 2t & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 2 & \text{si } 1 \leq t \leq 3 \\ -t + 5 & \text{si } 3 < t \leq 5 \end{cases}$$

$$\text{Por tanto, el espacio recorrido será: } s(t) = \begin{cases} t^2 + A & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 2t + B & \text{si } 1 \leq t \leq 3 \\ \frac{-t^2}{2} + 5t + C & \text{si } 3 < t \leq 5 \end{cases}$$

Falta calcular los valores de los parámetros  $A$ ,  $B$  y  $C$ :

Como  $s(0) = 0$ , entonces,  $A = 0$ . Además, por continuidad:


$$\lim_{x \rightarrow 1^-} s(t) = \lim_{x \rightarrow 1^-} t^2 = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} s(t) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2t + B) = 2 + B, \quad f(1) = 2 + B.$$

Así pues,  $2 + B = 1$ , es decir,  $B = -1$ .

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} s(t) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (2t + B) = 6 - 1 = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} s(t) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \left( \frac{-t^2}{2} + 5t + C \right) = \frac{21}{2} + C, \quad f(3) = 5.$$

$$\text{Así pues, } \frac{21}{2} + C = 5 \Rightarrow C = -\frac{11}{2}. \text{ La función espacio recorrido es: } s(t) = \begin{cases} t^2 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 2t - 1 & \text{si } 1 \leq t \leq 3 \\ \frac{-t^2}{2} + 5t - \frac{11}{2} & \text{si } 3 < t \leq 5 \end{cases}$$

cuya gráfica es:



- b) El espacio total recorrido es  $s(5) = 7$  m.

El área bajo la curva de la velocidad es la de un trapecio de altura 2 y bases 5 y 2, es decir,  $A = \frac{5+2}{2} \cdot 2 = 7 \text{ u}^2$ .

102. La densidad de población en miles de habitantes por  $\text{km}^2$  en una ciudad depende de la distancia  $r$  en kilómetros a su centro de acuerdo a  $f(r) = 3e^{-\frac{r}{3}}$ .

- a) ¿Cuántas personas viven a menos de 5 km del centro?
- b) ¿Cuántas viven entre 5 y 10 km del centro?

Primero calculamos la integral  $\int 2\pi r 3e^{-\frac{r}{3}} dr = 6\pi \int r e^{-\frac{r}{3}} dr$  por partes:

$$f(r) = r \qquad f'(r) = 1 \qquad g'(r) = e^{-\frac{r}{3}} \qquad g(r) = -3e^{-\frac{r}{3}}$$

$$6\pi \int r e^{-\frac{r}{3}} dr = 6\pi \left( -3r e^{-\frac{r}{3}} - \int -3e^{-\frac{r}{3}} dr \right) = 6\pi \left( -3r e^{-\frac{r}{3}} - 9e^{-\frac{r}{3}} \right) + C = -18\pi \left( e^{-\frac{r}{3}}(r+3) \right) + C$$

a)  $\int_0^5 2\pi r 3e^{-\frac{r}{3}} dr = -18\pi \left[ \left( e^{-\frac{r}{3}}(r+3) \right) \right]_0^5 \approx 84,201$  miles de habitantes, es decir, 84 201 habitantes.

b)  $\int_5^{10} 2\pi r 3e^{-\frac{r}{3}} dr = -18\pi \left[ \left( e^{-\frac{r}{3}}(r+3) \right) \right]_5^{10} \approx 59,220$  miles de habitantes, es decir, 59 220 habitantes.

Síntesis

103. Dada la función  $F(x) = \int_0^x (t^2 - 1)e^{-t^2} dt$ , con dominio  $\mathbb{R}$ :

- a) Calcula  $F'(x)$ , estudia el crecimiento de  $F(x)$  y halla las abscisas de sus máximos y mínimos relativos.
- b) Calcula  $F''(x)$ , estudia la concavidad y convexidad de  $F(x)$  y halla las abscisas de sus puntos de inflexión.

a)  $F'(x) = (x^2 - 1)e^{-x^2}$ . Esta derivada,  $F'(x)$ , se anula si  $x = -1$  o  $x = 1$ . Se estudia su signo:

$x$	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
Signo de $F'$	+	-	+
Comportamiento de $F$	Creciente	Decreciente	Creciente

Máximo relativo en  $x = -1$ . Mínimo relativo en  $x = 1$

b) La derivada segunda de  $F$  es  $F''(x) = 2x(2 - x^2)e^{-x^2}$ , que se anula si  $x = 0$ ,  $x = -\sqrt{2}$ ,  $x = \sqrt{2}$ :

$x$	$(-\infty, -\sqrt{2})$	$(-\sqrt{2}, 0)$	$(0, \sqrt{2})$	$(\sqrt{2}, +\infty)$
Signo de $F''$	+	-	+	-
Comportamiento de $F$	Cóncava hacia arriba	Cóncava hacia abajo	Cóncava hacia arriba	Cóncava hacia abajo

Puntos de inflexión en  $x = -\sqrt{2}$ ,  $x = 0$ ,  $x = \sqrt{2}$ .

104. Calcula el valor de la integral  $\int_{-\pi}^{2\pi} |x| \sin x dx$ .


$$\int_{-\pi}^{2\pi} |x| \sin x dx = \int_{-\pi}^0 -x \sin x dx + \int_0^{2\pi} x \sin x dx = [x \cos x - \sin x]_{-\pi}^0 + [-x \cos x + \sin x]_0^{2\pi} = -\pi - 2\pi = -3\pi$$

105. Dada la función  $y = \frac{x}{x^2 + 2}$ , calcula el área encerrada por la curva, el eje de abscisas y las rectas perpendiculares al eje  $X$  que pasan por el máximo y el mínimo de la función dada.

La derivada de la función es  $f'(x) = \frac{2 - x^2}{(x^2 + 2)^2}$ , que se anula si  $x = -\sqrt{2}$ ,  $x = \sqrt{2}$ .

Estudiando el signo de la derivada:  $A\left(-\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$  es mínimo y  $B\left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$  es máximo.

El recinto está comprendido entre  $x = -\sqrt{2}$  y  $x = \sqrt{2}$ .



La función es simétrica respecto del origen. Por tanto, el área pedida es igual a:

$$A = 2 \int_0^{\sqrt{2}} \frac{x}{x^2 + 2} dx = \left[ \ln(x^2 + 2) \right]_0^{\sqrt{2}} = \ln 4 - \ln 2 = \ln \frac{4}{2} = \ln 2 \text{ u}^2.$$

106. Sea  $F(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{x} \int_0^x e^{t^2} dt & \text{si } x > 0 \end{cases}$ .

- a) Prueba que  $F$  es continua en  $\mathbb{R}$ .
- b) Estudia si existe  $F'(x)$  si  $x \neq 0$  y si  $F$  es derivable en  $x = 0$ .
- c) Estudia la continuidad de  $F'(x)$ .

a) El único punto problemático sería  $x = 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x^2}}{1} = 1. \text{ Finalmente, como } F(0) = 1, F \text{ es continua en } x = 0.$$

b) Si  $x < 0$ ,  $F'(x) = -\text{sen } x$ . Si  $x > 0$ ,  $F'(x) = \left( \frac{\int_0^x e^{t^2} dt}{x} \right)'$ , que existe por tratarse de dos funciones derivables y no anularse el denominador.

Para estudiar si  $F$  es derivable en  $x = 0$  se calculan las derivadas laterales en  $x = 0$ ,  $F'(0^-) = -\text{sen } 0 = 0$  pues si  $x < 0$ ,  $F(x) = \cos x$ .

$$F'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(h) - F(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^h e^{t^2} dt - h}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{h^2} - 1}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2he^{h^2}}{2} = 0$$

Así pues,  $F$  es derivable en 0 y  $F'(0) = 0$ .

c) 
$$F'(x) = \begin{cases} -\operatorname{sen} x & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{xe^{x^2} - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$
 . Por un lado,  $F'$  es continua en  $\mathbb{R} - \{0\}$ . Se estudia la continuidad de  $F'$  en  $x = 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xe^{x^2} - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x^2} + 2x^2 e^{x^2} - e^{x^2}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-\operatorname{sen} x) = 0 \text{ y } F'(0) = 0, \text{ resulta que } F' \text{ es continua en } x = 0 \text{ y, por tanto, es continua en } \mathbb{R}.$$

107. a) Encuentra una primitiva de  $f(x) = \frac{6}{x^2 + 2x - 8}$ .

b) Calcula el área del recinto limitado por la gráfica de la función  $f(x)$ , el eje X y las rectas  $x = -2$  y  $x = 0$ .

a) Debemos descomponer en fracciones simples la función racional dada:

$$\frac{6}{x^2 + 2x - 8} = \frac{6}{(x+4)(x-2)} = \frac{A}{x+4} + \frac{B}{x-2} = \frac{A(x-2) + B(x+4)}{(x+4)(x-2)}$$

Si  $x = -4$ , obtenemos que  $A = -1$ . Si  $x = 2$ , obtenemos que  $B = 1$ . Por tanto:

$$f(x) = \frac{6}{x^2 + 2x - 8} = \frac{-1}{x+4} + \frac{1}{x-2}$$

$$\int \frac{6}{x^2 + 2x - 8} dx = \int \left( \frac{-1}{x+4} + \frac{1}{x-2} \right) dx = -\ln|x+4| + \ln|x-2| + C$$

b) Como la función  $f(x)$  es negativa en el intervalo  $(-4, 2)$ , el recinto se halla por debajo del eje de abscisas y su

área nos la da la integral:  $A = \int_{-2}^0 \left| \frac{6}{x^2 + 2x - 8} \right| dx = \left[ -\ln|x+4| + \ln|x-2| \right]_{-2}^0 = 2(\ln 4 - \ln 2) = 2 \ln 2 \text{ u}^2$

108. La curva  $y = 2x^2$  divide al cuadrado de vértices  $V_1(0, 0)$ ,  $V_2(1, 0)$ ,  $V_3(1, 1)$  y  $V_4(0, 1)$  en dos recintos. Dibújalos y halla el área del recinto mayor.


La abscisa del punto de intersección de la parábola y el segmento  $V_3V_4$  es  $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

Por tanto, el área del recinto de la izquierda viene dada por la integral:

$$A_1 = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (1 - 2x^2) dx = \left[ x - \frac{2x^3}{3} \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{2 \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3}{3} \approx 0,4714 \text{ u}^2.$$

El área del recinto de la derecha es  $A_2 = 1 - A_1 \approx 1 - 0,4714 = 0,5286 \text{ u}^2$ .

Con lo cual, el recinto mayor es el de la derecha.



109. Calcula el valor de  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a > 0$ , para que el área de la región plana encerrada entre la parábola  $y = x^2$  y la recta  $y = a$  sea igual a  $\frac{4}{3}$  de unidades de superficie.

El área nos la da la integral  $A = 2 \int_0^{\sqrt{a}} (a - x^2) dx = 2 \left[ ax - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{a}} = 2 \left[ a\sqrt{a} - \frac{a\sqrt{a}}{3} \right] = 2 \frac{2a\sqrt{a}}{3} = \frac{4}{3} a\sqrt{a} = \frac{4}{3} \Rightarrow a = 1$ , y como ha de ser igual a  $\frac{4}{3}$ , concluimos que  $a = \sqrt[3]{4}$ .

110. Calcula el volumen del paraboloides de revolución que se obtiene al girar la región comprendida entre la parábola  $y = x^2$  y el eje horizontal, alrededor del eje  $X$  desde  $x = 0$  hasta  $x = 4$ .

Se sabe que dicho volumen es igual a:  $V = \int_0^4 \pi (x^2)^2 dx = \pi \int_0^4 x^4 dx = \pi \left[ \frac{x^5}{5} \right]_0^4 = \frac{1024\pi}{5} u^3$ .

### CUESTIONES

111. ¿Cuál es el valor de  $\int_{-1}^1 \frac{\text{sen } x}{(x^2 + 1)^7} dx$ ?

$f(x) = \frac{\text{sen } x}{(x^2 + 1)^7}$  es una función impar pues  $f(-x) = \frac{\text{sen}(-x)}{((-x)^2 + 1)^7} = -\frac{\text{sen } x}{(x^2 + 1)^7} = -f(x)$ , así que  $\int_{-1}^1 \frac{\text{sen } x}{(x^2 + 1)^7} dx = 0$ .

112. Sea  $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  continua y tal que  $\int_{-2}^{-1} f(t) dt = \int_1^2 f(t) dt$ .

¿Se puede asegurar que existen  $b$  y  $c$  en  $[-2, 2]$  tales que  $b \leq -1$ ,  $c \geq 1$  y  $f(b) = f(c)$ ? Justifica la respuesta.

Por el teorema del valor medio se sabe que:

A) Existe un número  $c$  del intervalo  $[1, 2]$  que cumple  $\int_1^2 f(t) dt = f(c)(2 - 1) = f(c)$ .

B) Existe un número  $b$  del intervalo  $[-2, -1]$  que cumple  $\int_{-2}^{-1} f(t) dt = f(b)(-1 - (-2)) = f(b)$ .

Como ambas integrales son iguales, se concluye que, en efecto, existen  $b$  y  $c$  en  $[-2, 2]$  con  $b \leq -1$ ,  $c \geq 1$  y  $f(b) = f(c)$ .



113. ¿Qué número es mayor,  $\int_1^2 \frac{\text{sen}^2 x}{x^2} dx$  o  $\int_1^2 \frac{\text{sen} x}{x} dx$  ?

En el intervalo  $[1,2]$ ,  $\text{sen} x$  es positivo y como  $\text{sen} x \leq 1$ , tenemos que  $\text{sen}^2 x \leq \text{sen} x$ .

Por otra parte, en dicho intervalo,  $x \leq x^2$ , así que  $\frac{\text{sen}^2 x}{x^2} \leq \frac{\text{sen} x}{x}$  por lo que  $\int_1^2 \frac{\text{sen}^2 x}{x^2} dx \leq \int_1^2 \frac{\text{sen} x}{x} dx$ , de hecho es estrictamente menor pues la función  $f(x) = \frac{\text{sen} x}{x} - \frac{\text{sen}^2 x}{x^2}$  es continua en  $[1,2]$ ,  $f(x) \geq 0$ , y no es idénticamente nula por lo que  $\int_1^2 \left( \frac{\text{sen} x}{x} - \frac{\text{sen}^2 x}{x^2} \right) dx > 0$ , es decir,  $\int_1^2 \frac{\text{sen} x}{x} dx > \int_1^2 \frac{\text{sen}^2 x}{x^2} dx$ .

114. Demuestra la igualdad  $\int_0^b f(x) dx = \int_0^b f(b-x) dx$ . Para ello, realiza el cambio  $t = b - x$ .

Se utiliza el teorema de sustitución en integrales definidas llamando  $g(x) = b - x$  y entonces  $g'(x) = -1$ .

$$\int_0^b f(b-x) dx = -\int_0^b f(g(x))g'(x)dx = -\int_{g(0)}^{g(b)} f(t)dt = -\int_b^0 f(t)dt = \int_0^b f(t)dt = \int_0^b f(x)dx.$$

115. Razona si son ciertas o no las siguientes afirmaciones.

a)  $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$

b)  $\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx$

c) Si  $\int_a^b f(x) dx = 0$ , entonces  $a = b$ .

d) Si  $\int_a^b f(x) dx = 0$  y  $f(x) > 0$  para todo  $x$ , entonces  $a = b$ .

e)  $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

a) Es verdadera. Es la propiedad 6 de la integral definida.

b) Es falsa. Por ejemplo,  $\left( \int_0^2 1x dx = 2 \right) \neq \left( \int_0^2 1 dx \cdot \int_0^2 x dx = 2 \cdot 2 = 4 \right)$ .

c) Es falsa. Por ejemplo,  $\int_{-1}^1 x dx = 0$ .

d) Es verdadera. Si la función es positiva en  $[a,b]$ ,  $\int_a^b f(x) dx$  mide el área bajo la curva, así pues, esa área solo puede ser cero si  $a = b$ .

e) Es verdadera. Es la propiedad 4 de la integral definida.

116. Sea  $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$  con  $a > 0$ , continua y tal que  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ .


- a) ¿Es necesariamente  $f(x) = 0$  para todo  $x$  de  $[-a, a]$ ?
- b) ¿Es necesariamente  $\int_{-a}^a |f(x)| dx = 0$ ? ¿Y  $\int_{-a}^a |f(-x)| dx = 0$ ?
- c) Calcula  $\int_{-a}^a (f(x) + 2x) dx$ .

Supongamos que  $f$  sea una función impar, por ejemplo,  $f(x) = 2x$  y  $a = 1$ . Así pues  $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 2x dx = 0$ .

- a) Ciertamente no es necesario, que como acabamos de ver, por ejemplo,  $f(x) = 2x$ .
- b) Obviamente tampoco pues en nuestro caso

$\int_{-1}^1 |f(x)| dx$  es el área sombreada que obviamente no es cero.

Tampoco  $\int_{-1}^1 |f(-x)| dx = 0$  En nuestro caso  $f(-x) = -2x$ ,



por lo que  $\int_{-1}^1 |-2x| dx$  vuelve a ser el área rayada, obviamente no cero.


c)  $\int_{-a}^a (f(x) + 2x) dx = \int_{-a}^a f(x) dx + \int_{-a}^a 2x dx = 0 + [x^2]_{-a}^a = 0 + 0 = 0$ .

117. Para calcular  $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 - 4} dx$ , un amigo te sugiere que pongas  $x = \frac{2}{\cos t}$ . ¿Le harías caso?

Con amigos así no hacen falta enemigos, pues si  $x$  está en  $[-1, 1]$ , es imposible que  $x = \frac{2}{\cos t}$  ya que  $|\frac{2}{\cos t}| \geq 2$  así que  $|x| \geq 2$ , o sea, no estaría en  $[-1, 1]$ .

118. Para calcular  $\int_1^e \ln x dx$ , si no se quiere integrar por partes, se puede utilizar el

dibujo de la derecha. Justifica esta afirmación y calcula dicha integral.



Como las funciones  $y = e^x$ ,  $y = \ln x$  son inversas la una de la otra, sus gráficas son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante por lo que las áreas sombreadas son iguales, así que:

$$\int_1^e \ln x dx = e \cdot 1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1$$

119. ¿Existe  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \operatorname{sen} \sqrt{t} dt}{x^3}$  ?

Dicho límite presenta una indeterminación del tipo  $\frac{0}{0}$  por lo que, aplicando el teorema de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \operatorname{sen} \sqrt{t} dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \sqrt{x^2} 2x}{3x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \operatorname{sen} x}{x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = \frac{2}{3}.$$

120. Sea  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , integrable y tal que para  $x \in [-1, 1]$  es  $|f(x)| \leq 1 + x^2$ . ¿Cuáles de entre los números  $-3$ ;  $-2$ ;  $-1$ ;  $2,5$  y  $2,75$  pueden ser el valor de  $\int_{-1}^1 f(x) dx$  ?

Como  $-(1 + x^2) \leq f(x) \leq 1 + x^2$ , se tiene que  $-\int_{-1}^1 (1 + x^2) dx \leq \int_{-1}^1 f(x) dx \leq \int_{-1}^1 (1 + x^2) dx$ .

Es decir,  $-\frac{8}{3} \leq \int_{-1}^1 f(x) dx \leq \frac{8}{3}$  por lo que solo  $-2$ ,  $-1$  y  $2,5$  podrían ser el valor de la integral.

PROBLEMAS

121. Halla el volumen del sólido formado al girar en torno al eje  $X$  la región bajo la gráfica de  $y = \sqrt{\operatorname{sen} x}$  en el intervalo  $[0, \pi]$  ?

$$V = \int_0^{\pi} \pi f^2(x) dx = \pi \int_0^{\pi} \operatorname{sen} x dx = \pi [-\cos x]_0^{\pi} = 2\pi u^3$$


122. Determina el volumen generado al girar respecto al eje de abscisas la región acotada por las gráficas de las funciones  $f(x) = x^2$  y  $g(x) = 2x$ .

Ambas gráficas se cortan en los puntos  $O(0,0)$  y  $A(2,4)$ .

La recta va por arriba y la parábola por debajo.

El volumen pedido lo da la integral:

$$V = \int_0^2 \pi (2x)^2 dx - \int_0^2 \pi (x^2)^2 dx = \pi \int_0^2 (4x^2 - x^4) dx = \pi \left[ \frac{4x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \frac{64\pi}{15} u^3.$$



123. Calcula  $\int_0^{\pi} |f(x)| dx$  siendo  $f(x) = \operatorname{sen} x - \frac{1}{2}$ .

En el intervalo  $[0, \pi]$ ,  $\operatorname{sen} x - \frac{1}{2} \geq 0$  si  $x \in \left[ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right]$ , siendo negativa en el resto.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \left| \operatorname{sen} x - \frac{1}{2} \right| dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left( \frac{1}{2} - \operatorname{sen} x \right) dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \left( \operatorname{sen} x - \frac{1}{2} \right) dx + \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\pi} \left( \frac{1}{2} - \operatorname{sen} x \right) dx = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left( \frac{1}{2} - \operatorname{sen} x \right) dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \left( \frac{1}{2} - \operatorname{sen} x \right) dx + \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\pi} \left( \frac{1}{2} - \operatorname{sen} x \right) dx = \left[ \frac{x}{2} + \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{6}} + \left[ \frac{x}{2} + \cos x \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} + \left[ \frac{x}{2} + \cos x \right]_{\frac{5\pi}{6}}^{\pi} = \\ &= \left( \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right) + \left( \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{5\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \left( \frac{\pi}{2} - 1 - \frac{5\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2\sqrt{3} + \frac{\pi}{6} - 2. \end{aligned}$$

**124.** La función  $\rho(x) = 300[2 + \text{sen}(4\sqrt{x+0,15})]$ , da la densidad de coches (en coches por km) en los primeros 20 km de una autovía, siendo  $x$  la distancia en kilómetros al comienzo de la misma. Calcula el número total de coches en los 20 km.

$$\int_0^{20} \rho(x) dx = \int_0^{20} 300(2 + \text{sen} 4\sqrt{x+0,15}) dx = 600 \int_0^{20} dx + 300 \int_0^{20} \text{sen} 4\sqrt{x+0,15} dx$$

Se cambia de variable:  $\sqrt{x+0,15} = t$ ,  $\frac{dx}{2\sqrt{x+0,15}} = dt \Rightarrow dx = 2\sqrt{x+0,15} dx = 2t dt$

$$\int \text{sen} 4\sqrt{x+0,15} dx = \int 2t \text{sen}(4t) dt = 2 \int t \text{sen}(4t) dt; f(t) = t, g'(t) = \text{sen}(4t), f'(t) = 1, g(t) = -\frac{\cos(4t)}{4}$$

$$2 \int t \text{sen}(4t) dt = 2 \cdot \left( \frac{-t \cos(4t)}{4} + \frac{1}{4} \int \cos(4t) dt \right) = \frac{-t \cos(4t)}{2} + \frac{\text{sen}(4t)}{8} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int \text{sen} 4\sqrt{x+0,15} dx = \frac{-\sqrt{x+0,15} \cos(4\sqrt{x+0,15})}{2} + \frac{\text{sen}(4\sqrt{x+0,15})}{8} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^{20} 300(2 + \text{sen} 4\sqrt{x+0,15}) dx = 600 \cdot 20 + 300 \left[ \frac{-\sqrt{x+0,15} \cos(4\sqrt{x+0,15})}{2} + \frac{\text{sen}(4\sqrt{x+0,15})}{8} \right]_0^{20} \approx$$

$\approx 11513$  coches

**125.** La aceleración en  $\text{m/s}^2$  de un móvil con movimiento rectilíneo viene dada en función del tiempo  $t$  por la expresión  $a(t) = 3\cos(2t+1)$ . Si la posición y la velocidad de la partícula en  $t = 0$  eran  $x(0) = 5$  m y  $v(0) = 1$  m/s, respectivamente, determina:

a) La función que da la velocidad del móvil en función de  $t$ .

b) La función que da la posición del móvil en función de  $t$ .

a) La velocidad es la integral de la aceleración, así pues:

$$v(t) = \int a(t) dt = \int 3\cos(2t+1) dt = \frac{3}{2} \int 2\cos(2t+1) dt = \frac{3}{2} \text{sen}(2t+1) + C$$

Como sabemos que  $v(0) = 1$ , ya podemos calcular la constante  $C$ :

$$v(0) = \frac{3}{2} \text{sen}(2 \cdot 0 + 1) + C = 1 \Rightarrow C = 1 - \frac{3}{2} \text{sen} 1$$

La función velocidad es  $v(t) = \frac{3}{2} \text{sen}(2t+1) + 1 - \frac{3}{2} \text{sen} 1$ .

b) La posición es la integral de la velocidad, así pues:

$$x(t) = \int v(t) dt = \int \left[ \frac{3}{2} \text{sen}(2t+1) + 1 - \frac{3}{2} \text{sen} 1 \right] dt = -\frac{3}{4} \cos(2t+1) + \left( 1 - \frac{3}{2} \text{sen} 1 \right) t + C$$

Como sabemos que  $x(0) = 5$ , ya podemos calcular la constante  $C$ :

$$x(0) = -\frac{3}{4} \cos(2 \cdot 0 + 1) + \left( 1 - \frac{3}{2} \text{sen} 1 \right) \cdot 0 + C = 5 \Rightarrow C = 5 + \frac{3}{4} \cos 1$$

La función posición es  $x(t) = -\frac{3}{4} \cos(2t+1) + \left( 1 - \frac{3}{2} \text{sen} 1 \right) t + 5 + \frac{3}{4} \cos 1$ .

126. Un objeto se mueve sobre una recta debido a la acción de una fuerza  $F$  que depende de su posición  $x$  a lo largo de dicha recta en la forma,  $F(x) = \frac{2}{(x-1)^2}$ . El trabajo realizado por  $F$  al mover el objeto desde  $x = a$

hasta  $x = b$  es  $W = \int_a^b F(x) dx$ .

a) Calcula el trabajo para ir desde  $x = 3$  hasta  $x = 5$ .

b) Determina si la fuerza  $G(x) = \frac{2}{(x^2+1)^2}$  realiza más o menos trabajo que  $F(x)$  para el mismo desplazamiento.

a) El trabajo es  $W = \int_3^5 \frac{2}{(x-1)^2} dx = \left[ \frac{2}{1-x} \right]_3^5 = \frac{1}{2}$  J.

b) Al ser ambas fuerzas positivas en  $[3,5]$ , se pueden identificar los trabajos con las áreas que encierran las fuerzas bajo ellas.

Como  $G(x) = \frac{2}{(x^2+1)^2} < \frac{2}{(x-1)^2} = F(x)$  en  $[3,5]$ , ya que el denominador de  $G(x)$  es mayor que el de  $F(x)$ ,

se concluye que el trabajo de la fuerza  $G(x)$  es menor que el de  $F(x)$ .

127. Para estudiar la capacidad de memorizar de un niño se usa el siguiente modelo: si  $x$  es su edad en años, entonces dicha capacidad viene dada por:  $f(x) = 1 + 2x \ln x$  con  $0 \leq x \leq 5$ .

Calcula el valor medio de la capacidad de memorizar de un niño entre su primer y su tercer cumpleaños.

El teorema del valor medio nos asegura que existe un número  $c$  del intervalo  $[1,3]$  que cumple

$\int_1^3 (1 + 2x \cdot \ln x) dx = f(c)(3 - 1)$ . El valor  $f(c)$  será el valor medio pedido.

Se calcula, pues, el valor de la integral y luego se halla  $f(c)$ :  $\int (1 + 2x \ln x) dx = \int dx + 2 \int x \ln x dx = x + 2 \int x \ln x dx$ .

Esta última integral se calcula por partes:

$$f(x) = \ln x, f'(x) = \frac{1}{x}, g'(x) = x, g(x) = \frac{x^2}{2}$$

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{1}{x} \frac{x^2}{2} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{2} \left( \ln x - \frac{1}{2} \right)$$


Entonces:

$$\int (1 + 2x \ln x) dx = x + x^2 \left( \ln x - \frac{1}{2} \right) \Rightarrow \int_1^3 (1 + 2x \ln x) dx = \left[ x + x^2 \left( \ln x - \frac{1}{2} \right) \right]_1^3 = 7,89 \Rightarrow f(c) \cdot 2 = 7,89 \Rightarrow f(c) = 3,95$$

es el valor medio de la capacidad de memorizar de un niño entre su primer y tercer cumpleaños.

128. Sea  $f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x \leq 1 \\ \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$ . Dibuja el recinto acotado por la gráfica de  $f(x)$  y la recta  $y = 1$ , y determina su área.

La parábola  $g(x) = (x-1)^2$  y el logaritmo  $h(x) = \ln x$  se cortan en el punto  $A(1,0)$  y el recinto, como se aprecia, está formado por dos recintos.



Calculemos sus áreas:  $A_1 = \int_0^1 [1 - (x-1)^2] dx = \int_0^1 (-x^2 + 2x) dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^1 = \frac{2}{3} u^2$ .

$A_2 = \int_1^e (1 - \ln x) dx = [x - (x \ln x - x)]_1^e = [2x - x \ln x]_1^e = e - 2 u^2$ .

El área del recinto es  $\frac{2}{3} + e - 2 = e - \frac{4}{3} u^2$ .

Recuerda que la integral del logaritmo neperiano se calcula por partes:  $I = \int \ln x dx$ .

$$\left. \begin{aligned} u = \ln x &\Rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv = dx &\Rightarrow v = \int dx = x \end{aligned} \right\} \Rightarrow I = x \ln x - \int \frac{1}{x} x dx = x \ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C$$

129. Si  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ , ¿será entonces  $\int_{-a}^a x f(x) dx = 0$ ? Si es cierto, pruébalo, si es falso confírmalo con un ejemplo.

Es falso: basta que  $f$  sea impar para que  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ .

Por ejemplo  $f(x) = x$ , por lo que  $\int_{-a}^a x f(x) dx = \int_{-a}^a x^2 dx \neq 0$ .

130. a) Sea  $g$  una función derivable que cumple  $g(6) = \int_5^6 g(x) dx$ . Calcula  $\int_5^6 (x-5)g'(x) dx$ .

b) Sea  $f$  continua y tal que  $\int_1^e f(u) du = \frac{1}{2}$ . Calcula  $\int e^{\frac{x}{2}} f\left(e^{\frac{x}{2}}\right) dx$ .

a) Calculamos la integral  $\int (x-5)g'(x) dx$  por partes:

$$f(x) = x-5, \quad f'(x) = 1, \quad g'(x) = g'(x), \quad g(x) = g(x)$$

$$\int (x-5)g'(x) dx = (x-5)g(x) - \int g(x) dx$$


Por tanto, la integral definida pedida es:  $\int_5^6 (x-5)g'(x) dx = [(x-5)g(x)]_5^6 - \int_5^6 g(x) dx = g(6) - 0 - g(6) = 0$

b) Para calcular  $\int_0^2 e^{\frac{x}{2}} f\left(e^{\frac{x}{2}}\right) dx$  empleamos el teorema de sustitución en integrales definidas:

Si  $f$  y  $g'$  son continuas, entonces  $\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt$ .

Así pues:  $\int_0^2 e^{\frac{x}{2}} f\left(e^{\frac{x}{2}}\right) dx = 2 \int_0^2 f\left(e^{\frac{x}{2}}\right) \frac{e^{\frac{x}{2}}}{2} dx = 2 \int_{e^0}^{e^2} f(t) dt = 2 \int_1^e f(t) dt = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

131. Sea  $g(x) = \int_0^x f(t) dt$  con  $f$ , definida en  $[0,10]$ , dada en la figura.



- a) ¿Tiene  $g$  algún máximo o mínimos relativos? ¿Dónde están?
- b) ¿En qué valores de  $x$  alcanza  $g$  el máximo y el mínimo absolutos?
- c) ¿En qué intervalo es la gráfica de  $g$  cóncava hacia arriba?
- d) Esboza la gráfica de  $g$ .

Al ser  $g'(x) = f(x)$ , se ve que  $g'(x) = 0$  si  $x = 1, 3, 5, 7, 9$ .

a) En los puntos de abscisa 1, 5, 9,  $g'(x)$  pasa de ser positiva a negativa, luego  $g$  pasa de ser creciente a decreciente, es decir, se trata de máximos relativos.

En los puntos de abscisa 3, 7,  $g'(x)$  pasa de ser negativa a positiva, así que en ellos  $g(x)$  presenta mínimos relativos.


b) Se estudia el valor de  $g$  en  $x = 0$  y  $x = 10$  y en los puntos del interior en los que se anula la derivada.

$$g(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0; \quad g(1) > 0, \quad g(3) < g(1), \quad g(5) < g(1), \quad g(7) < g(1) \text{ pues } g(7) < g(5), \quad g(9) = g(5) \text{ y } g(10) < g(9).$$

Así pues, el máximo absoluto de  $g$  se alcanza en  $x = 1$ . Análogamente, se ve que el mínimo se alcanza en 3.

c)  $g''(x) > 0$  si  $f'(x) > 0$  y eso ocurre en  $(2,4) \cup (6,8)$ .

d)




132. Determina un polinomio  $P(x)$  de segundo grado sabiendo que  $P(0) = P(2) = 1$  y que  $\int_0^2 P(x) dx = \frac{1}{3}$ .

$P(x) = ax^2 + bx + c$  con  $a \neq 0$ .  $P(0) = c = P(2) = 4a + 2b + c = 1$ , es decir,  $4a + 2b = 0$  y  $c = 1$ .

Por otra parte,  $\int_0^2 (ax^2 + bx + 1) dx = \frac{1}{3}$ , es decir:  $a \frac{8}{3} + 2b + 2 = \frac{1}{3}$ ,

Por tanto, si  $2a + b = 0$  y  $\frac{4}{3}a + b = -\frac{5}{6}$ , se tiene que  $\frac{2}{3}a = \frac{5}{6}$ ,  $a = \frac{5}{4}$ ,  $b = -\frac{5}{2}$ , y  $P(x) = \frac{5}{4}x^2 - \frac{5}{2}x + 1$ .

133. En la figura se muestra la parte positiva de la gráfica de  $y = 4x - x^2$ . Encuentra la ecuación de una recta vertical para que el área de la zona sombreada sea de  $9 u^2$ .



$\int_0^a (4x - x^2) dx = 9$ , es decir:  $\left[ 2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^a = 9$ ,  $2a^2 - \frac{a^3}{3} = 9$ ,  $a^3 - 6a^2 + 27 = 0$ ,  $(a-3)(a^2 - 3a - 9) = 0$ ,  $a = 3$ ,  
pues las otras soluciones no están en  $[0, 4]$ .

La recta buscada es  $x = 3$ .

PARA PROFUNDIZAR

134. Sea  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua tal que si  $x \neq 0$ ,  $g(x) = \frac{x}{e^x - 1}$  y sea  $f(x) = \int_{-x}^x g(t) dt$ .

Calcula  $g(0)$ , estudia la continuidad de  $f$  y obtén  $f'(x)$ .

Como  $g$  es continua en 0, se tiene que  $g(0) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1} = 1$ .

$f$  es continua en  $\mathbb{R}$  pues es derivable ya que  $g$  es continua y, al ser  $f(x) = \int_{-x}^x g = \int_{-x}^0 g + \int_0^x g$ , se tiene que:

$$f'(x) = (-g(-x))(-1) + g(x) = g(-x) + g(x) = \frac{-x}{e^{-x} - 1} + \frac{x(e^x + 1)}{e^x - 1}$$

135. Sea  $f$  una función continua y positiva en el intervalo  $[0, 1]$ . Halla razonadamente el número de raíces en  $(0, 1)$  de la función  $F(x) = \int_0^x f(t) dt - \int_x^1 f(t) dt$ .

La función  $F(x)$  es continua en  $[0, 1]$  (pues es derivable), siendo  $F(0) = \int_0^0 f - \int_0^1 f = 0 - \int_0^1 f < 0$  pues  $f$  es positiva en  $[0, 1]$ .

Análogamente,  $F(1) = \int_0^1 f - \int_1^1 f = \int_0^1 f - 0 > 0$ .

Así pues,  $F$  tiene al menos una raíz en  $(0, 1)$ .


Se estudia  $F'(x)$ :  $F'(x) = f(x) - f(x)(-1) = 2f(x) > 0$

Así pues, como  $F'(x)$  nunca se hace cero en  $(0, 1)$ , se desprende que  $F$  no puede tener más de una raíz en dicho intervalo por lo que, junto al argumento anterior, se concluye que solo tiene una raíz.



136. La figura muestra un semicírculo de radio 1, diámetro horizontal  $AB$  y rectas tangentes en  $A$  y  $B$ . ¿A qué distancia del diámetro debe colocarse la recta horizontal  $MN$  para minimizar el área sombreada?

Hazlo de dos formas: minimizando una función integral y minimizando una función que dependa de  $\alpha$ .



Se toma un sistema de ejes perpendiculares con origen en el centro del semicírculo, cuya ecuación sería:

$y = \sqrt{1-x^2}$ . Sea  $y = k$  la ecuación de la recta  $MN$  y se escribe el área sombreada en función de  $k$ .

$$A = 2 \left[ \int_0^{\sqrt{1-k^2}} \sqrt{1-x^2} dx - k\sqrt{1-k^2} + k(1-\sqrt{1-k^2}) - \int_{\sqrt{1-k^2}}^1 \sqrt{1-x^2} dx \right] =$$

$$= 2 \left[ \int_0^{\sqrt{1-k^2}} \sqrt{1-x^2} dx + \int_1^{\sqrt{1-k^2}} \sqrt{1-x^2} dx + k - 2k\sqrt{1-k^2} \right] = f(k)$$

Para obtener el mínimo valor de  $f(x)$ , con  $k \in [0,1]$ , se calcula su derivada respecto de  $k$ .

$$f'(k) = 2 \left[ k \cdot \frac{(-k)}{\sqrt{1-k^2}} + k \cdot \frac{(-k)}{\sqrt{1-k^2}} + 1 - 2 \left( \sqrt{1-k^2} - \frac{k^2}{\sqrt{1-k^2}} \right) \right] = 2 \left[ \frac{-2k^2}{\sqrt{1-k^2}} + 1 - 2\sqrt{1-k^2} + \frac{2k^2}{\sqrt{1-k^2}} \right] =$$

$$= 2 \left[ 1 - 2\sqrt{1-k^2} \right]. \text{ Así pues, } f'(k) = 0 \text{ si } \sqrt{1-k^2} = \frac{1}{2}, k = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Así pues, la recta  $MN$  se debe situar a una distancia de  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  del diámetro  $AB$ . Se comprueba, posteriormente, que para ese valor de  $k$ ,  $f$  alcanza el mínimo absoluto.

Se resuelve ahora el problema sin utilizar el cálculo integral, como indica el enunciado. El área sombreada es:

$$2 \left[ \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} - \frac{1}{2} \sin \alpha \cos \alpha + \frac{1 + 1 - \cos \alpha}{2} \sin \alpha - \frac{\alpha}{2} \right] = 2 \left[ \frac{\pi}{4} - \alpha + \sin \alpha - \sin \alpha \cos \alpha \right] = f(\alpha) \text{ con } \alpha \in \left[ 0, \frac{\pi}{2} \right]$$

$f'(\alpha) = 2[-1 + \cos \alpha - \cos 2\alpha] = 0$  si  $\cos 2\alpha - \cos \alpha + 1 = 0$ , es decir,  $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha - \cos \alpha + 1 = 0$ , es decir,  $2\cos^2 \alpha - \cos \alpha = 0$ . Así pues,  $\cos \alpha = 0, \cos \alpha = \frac{1}{2}$

Se nota que el valor  $\cos \alpha = \frac{1}{2}$  corresponde al valor de  $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$  obtenido por el procedimiento anterior.

Se comprueba que  $\cos \alpha = \frac{1}{2}$  corresponde efectivamente al mínimo absoluto.

$$\text{Si } \cos \alpha = \frac{1}{2}, \alpha = \frac{\pi}{3} \text{ y } f(0) = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \approx 1,57, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cdot \left[ \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} + 1 \right] = 2 \cdot \left[ 1 - \frac{\pi}{4} \right] = \frac{4 - \pi}{2} \approx 0,43$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2 \cdot \left[ \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right] = 2 \cdot \left[ \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{12} \right] = \frac{3\sqrt{3} - \pi}{6} \approx 0,34$$

Así pues, el mínimo valor corresponde a  $\alpha = \frac{\pi}{3}$  o  $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

137. a) Escribe  $\int \operatorname{sen}^n x \, dx$  en términos de  $\int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx$ .

(Haz  $u = \operatorname{sen}^{n-1} x$  y  $dv = \operatorname{sen} x \, dx$  e integra por partes).

b) Utiliza el apartado anterior para demostrar:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx$$

c) Si  $n$  es un impar positivo, prueba la fórmula de Wallis:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^n x \, dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot n}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \operatorname{sen}^n x \, dx &= -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + \int (n-1) \operatorname{sen}^{n-2} x \cos^2 x \, dx = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \operatorname{sen}^{n-2} x (1 - \operatorname{sen}^2 x) \, dx = \\ &= -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx - (n-1) \int \operatorname{sen}^n x \, dx \end{aligned}$$

$$n \int \operatorname{sen}^n x \, dx = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx \Rightarrow \int \operatorname{sen}^n x \, dx = \frac{-1}{n} \operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx$$

$$\text{b) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^n x \, dx = \left[ -\frac{1}{n} \operatorname{sen}^{n-1} x \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx, \text{ es decir, } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx$$

$$\text{c) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx = \frac{n-3}{n-2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^{n-4} x \, dx, \text{ es decir: } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^{n-4} x \, dx$$

Reiterando, si  $n$  es un entero positivo impar:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \frac{n-5}{n-4} \dots \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen} x \, dx = \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \frac{n-5}{n-4} \dots \frac{2}{3} \cdot 1$$

138. Sea  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = xe^{1-x}$ .

a) Calcula  $I_1 = \int_0^1 f(x) dx$ .

Para cada  $n \geq 1$ , sea  $I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx$ .

b) Demuestra que si  $x \in [0, 1]$ , entonces  $x^n \leq x^n e^{1-x} \leq ex^n$ .

c) Calcula  $J_n = \int_0^1 x^n dx$  y prueba que si  $n \geq 1$ , entonces  $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$ . Deduce que  $I_n$  no es un número entero.

d) Por integración por partes demuestra que  $I_{n+1} = (n+1)I_n - 1$ .

e) Sea  $k_n = n!e - I_n$ , escribe  $k_{n+1}$  en función de  $k_n$  y prueba que  $k_n$  es un número entero para todo  $n$ .

f) Utilizando c) y d) prueba que  $n!e = k_n + I_n$  no es un entero.

g) Demuestra que el número  $e$  es irracional.

a)  $I_1 = \int_0^1 xe^{1-x} dx = [-xe^{1-x}]_0^1 + \int_0^1 1 \cdot e^{1-x} dx = e - 2$

b) Si  $x \in [0, 1]$ ,  $1 \leq e^{1-x} \leq e$ , así que  $x^n \leq x^n e^{1-x} \leq ex^n$

c)  $\frac{1}{n+1} \leq \int_0^1 x^n e^{1-x} \leq e \cdot \frac{1}{n+1} \Rightarrow \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$

Por tanto, si  $n \geq 2$ , es  $\frac{1}{3} \leq I_n \leq \frac{e}{3}$ ,  $I_1 = e - 2$ . Luego  $I_n$  no es un número entero.

d)  $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{1-x} dx = [-x^{n+1} \cdot e^{1-x}]_0^1 + (n+1) \int_0^1 x^n e^{1-x} dx = -1 + (n+1)I_n$

e) Por inducción:

Si  $n = 1$ ,  $k_1 = 1!e - I_1 = e - (e - 2) = 2$ .

Suponiendo que  $k_n$  es entero se demuestra para  $k_{n+1}$ .

$k_{n+1} = (n+1)!e - I_{n+1} = (n+1)!e - (n+1)I_n - 1 = (n+1)[n!e - I_n] + 1 = (n+1)k_n + 1$  es entero.

f) Como, según c),  $I_n$  no es entero con  $n \geq 1$ , sigue que  $n!e = k_n + I_n$  no es entero con  $n \geq 1$ .

g) Si  $n!e$  no es entero,  $e$  es irracional pues, en caso contrario,  $e = \frac{a}{b}$ , se tomaría  $n = b$  y  $n!e = b! \frac{a}{b} = (b-1)!a$  sería entero.

Autoevaluación

Comprueba qué has aprendido

1. En la parábola que corresponde a la función  $f(x) = x^2 + a$ , siendo  $a$  un número real, las tangentes en los puntos de abscisas 1 y  $-1$  pasan por el origen de coordenadas.


Obtén  $a$  y calcula el área del recinto limitado por la gráfica de  $f$  y dichas tangentes.

Los puntos de abscisas 1 y  $-1$  tienen ordenada  $1 + a$ .

Las rectas tangentes en dichos puntos son  $y - (1+a) = 2(x-1)$  e  $y - (1+a) = -2(x+1)$ .

Al pasar por  $O(0,0)$ , la primera, por ejemplo, es  $-(1+a) = -2$ ,  $a = 1$ .

Así pues, la parábola es  $y = x^2 + 1$  y nos piden el área del recinto sombreado.



$$\text{Área sombreada} = 2 \int_0^1 (x^2 + 1 - 2x) dx = 2 \left[ \frac{(x-1)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3} \text{ u}^2$$


2. Calcula el valor del área limitada por la curva  $y = \frac{x-1}{x^2-4}$ , el eje  $X$  y las rectas  $x=3$  y  $x=4$ .

Un esbozo de la región de la que nos piden el área sería la sombreada.

Así que el área pedida es  $\int_3^4 \frac{x-1}{x^2-4} dx$ .

$$\frac{x-1}{x^2-4} = \frac{x-1}{(x+2)(x-2)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-2} = \frac{A(x-2) + B(x+2)}{x^2-4}$$

Luego  $x-1 = A(x-2) + B(x+2)$ . Por tanto, si  $\begin{cases} x=2 \Rightarrow 1=4B \\ x=-2 \Rightarrow -3=-4A \end{cases}$  por lo que:



$$\int_3^4 \frac{x-1}{x^2-4} dx = \left[ \frac{3}{4} \ln|x+2| + \frac{1}{4} \ln|x-2| \right]_3^4 = \frac{3}{4} \ln 6 + \frac{1}{4} \ln 2 - \frac{3}{4} \ln 5 = \frac{3}{4} \ln \frac{6}{5} + \frac{1}{4} \ln 2 \text{ u}^2$$


3. Obtén el área del recinto acotado limitado por las gráficas de  $f(x) = x^2 - x - 2$  y  $g(x) = 1 - |x|$ .

El recinto del que se pide el área es el sombreado.

Así pues, las coordenadas de los puntos de corte son las soluciones de los sistemas:

$$\begin{cases} y = x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2) \\ y = x+1 \end{cases} \quad \begin{cases} y = (x+1)(x-2) \\ y = -x+1 \end{cases}$$

que son  $x = -1$  y  $x = \sqrt{3}$ , respectivamente, por lo que el área pedida será:



$$\begin{aligned} & \int_{-1}^0 [x+1 - (x+1)(x-2)] dx + \int_0^{\sqrt{3}} [-x+1 - (x+1)(x-2)] dx = \int_{-1}^0 (-x^2 + 2x + 3) dx + \int_0^{\sqrt{3}} (-x^2 + 3) dx = \\ & = \left[ -\frac{x^3}{3} + x^2 + 3x \right]_{-1}^0 + \left[ -\frac{x^3}{3} + 3x \right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{1}{3} - 1 + 3 + (-\sqrt{3} + 3\sqrt{3}) = 2\sqrt{3} + \frac{7}{3} \text{ u}^2 \end{aligned}$$


4. Dibuja el recinto limitado por las gráficas de las funciones  $y = \frac{1}{x^2}$ ,  $y = x$  e  $y = 8x$  y calcula su área.

$$A: \begin{cases} y = \frac{1}{x^2} \Rightarrow A\left(\frac{1}{2}, 4\right); \\ y = 8x \end{cases}; B: \begin{cases} y = \frac{1}{x^2} \Rightarrow B(1, 1); \\ y = x \end{cases}; C\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{Área del triángulo } OCA: \frac{1}{2} \left(4 - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{8} u^2$$

$$\text{Área región } ACB = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{1}{x^2} - x\right) dx = \left[-\frac{1}{x} - \frac{x^2}{2}\right]_{\frac{1}{2}}^1 = -1 - \frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{8} = \frac{5}{8} u^2$$

$$\text{Así que el área del recinto sombreado es } \frac{7}{8} + \frac{5}{8} = \frac{3}{2} u^2.$$



5. Halla el área del recinto limitado por la gráfica de la función  $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$  y la recta tangente a dicha gráfica en el máximo relativo.

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = 0 \text{ si } x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{6} \Rightarrow x = 1, x = \frac{1}{3}$$

$$f''(x) = 6x - 4, \quad f''\left(\frac{1}{3}\right) < 0 \text{ por lo que el máximo relativo es } P\left(\frac{1}{3}, f\left(\frac{1}{3}\right)\right).$$

Nos piden el área de la región sombreada.


$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4}{27} \quad B: \begin{cases} y = x^3 - 2x^2 + x \\ y = \frac{4}{27} \end{cases}$$

Resolvemos la ecuación  $x^3 - 2x^2 + x - \frac{4}{27} = 0$ . Sabemos que una solución es  $x = \frac{1}{3}$ , así que factorizamos como

$$x^3 - 2x^2 + x - \frac{4}{27} = \left(x - \frac{1}{3}\right) \left(x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{4}{9}\right).$$

$$x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{4}{9} = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}, x = \frac{4}{3} \text{ por lo que } B\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right) \text{ y el área pedida es:}$$

$$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{4}{3}} \left[\frac{4}{27} - (x^3 - 2x^2 + x)\right] dx = \left[\frac{4x}{27} - \frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2}\right]_{\frac{1}{3}}^{\frac{4}{3}} = \frac{1}{12} u^2$$



6. Si  $I = \int_0^1 e^{1-t} \cos t dt$  y  $J = \int_0^1 e^{1-t} \sin t dt$ , comprueba que  $\begin{cases} J + I = -\cos 1 + e \\ J - I = -\sin 1 \end{cases}$ , y calcula después los integrales.

$$I = \int_0^1 e^{1-t} \cos t dt = \left[ e^{1-t} \sin t \right]_0^1 + \int_0^1 e^{1-t} \sin t dt = \sin 1 + J$$

$\downarrow$        $\downarrow$   
 $f$        $g'$

$$J = \int_0^1 e^{1-t} \sin t dt = \left[ -e^{1-t} \cos t \right]_0^1 - \int_0^1 e^{1-t} \cos t dt = -\cos 1 + e - I$$

$\downarrow$        $\downarrow$   
 $f$        $g'$

$$I = \sin 1 + J, \text{ debemos probar que } I + J = -\cos 1 + e \text{ y efectivamente, } I - J = \sin 1 \quad (1^{\text{a}} \text{ ecuación})$$

$$J = -\cos 1 + e - I, \text{ } I - J = \sin 1 \text{ y efectivamente, } I + J = -\cos 1 + e \quad (2^{\text{a}} \text{ ecuación})'$$

$$\text{por tanto, } I = \frac{1}{2}(\sin 1 - \cos 1 + e), \quad J = \frac{1}{2}(-\sin 1 - \cos 1 + e).$$


7. Encuentra el valor de  $c$  para que la recta  $x = c$  divida al área de la región bajo la gráfica de  $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$  entre 1 y 2 en dos regiones, tales que el área de la de la izquierda sea el doble del área de la de la derecha.

Hay que hallar  $c$  para que  $\int_1^c \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx = 2 \int_c^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx$ , es decir:

$$\left[x + \frac{1}{x}\right]_1^c = 2 \left[x + \frac{1}{x}\right]_c^2, \text{ así que } c + \frac{1}{c} - 2 = 2 \left(2 + \frac{1}{2} - c - \frac{1}{c}\right),$$

$$c + \frac{1}{c} - 2 = 5 - 2c - \frac{2}{c}, \text{ o sea:}$$

$$3 \left(c + \frac{1}{c}\right) = 7 \Rightarrow c + \frac{1}{c} = \frac{7}{3} \Rightarrow 3c^2 - 7c + 3 = 0 \Rightarrow c = \frac{7 \pm \sqrt{13}}{6} \text{ y como } c > 1, \text{ la solución es } c = \frac{7 + \sqrt{13}}{6}$$



8. Calcula los puntos donde se anula la derivada de la función  $f(x) = -2x + \int_0^{2x} e^{t^2 - 10t + 24} dt$ .

$$f'(x) = -2 + e^{4x^2 - 20x + 24} \cdot 2 = 0 \text{ si } e^{4x^2 - 20x + 24} = 1, \text{ es decir, } 4x^2 - 20x + 24 = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ y } x = 3$$

9. Calcula el volumen del cuerpo generado en la rotación alrededor del eje  $X$  de la superficie limitada por la curva  $y = \sin x$  con  $0 \leq x \leq \pi$  y el eje.

$$V = \pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = \pi \int_0^\pi \frac{1}{2} (1 - \cos 2x) dx = \frac{\pi}{2} \left[ x - \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^\pi = \frac{\pi}{2} \pi = \frac{\pi^2}{2} u^3$$

Relaciona y contesta

Elige la única respuesta correcta en cada caso

1. Si  $f(x) = \int_0^x \operatorname{tg}^4 t dt$  y  $g(x) = 2x^2$ , entonces  $(g \circ f)' \left( \frac{\pi}{4} \right)$  es igual a:

- A.  $2\pi - 1$       B.  $3\pi - \frac{1}{4}$       C.  $2\pi - \frac{2}{3}$       D.  $\pi - \frac{8}{3}$

La solución es D.  $(g \circ f)' \left( \frac{\pi}{4} \right) = g' \left( f \left( \frac{\pi}{4} \right) \right) f' \left( \frac{\pi}{4} \right)$ .

$$g(x) = 2x^2, \quad g'(x) = 4x, \quad f(x) = \int_0^x \operatorname{tg}^4 t dt;$$

$$\begin{aligned} f \left( \frac{\pi}{4} \right) &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^4 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^2 t (1 + \operatorname{tg}^2 t - 1) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^2 t (1 + \operatorname{tg}^2 t) dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^2 t dt = \left[ \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 t \right]_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \operatorname{tg}^2 t - 1) dt = \\ &= \frac{1}{3} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \operatorname{tg}^2 t) dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} dt = \frac{1}{3} - [\operatorname{tg} t]_0^{\frac{\pi}{4}} + [t]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{3} - 1 + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Por otra parte,  $f'(x) = \operatorname{tg}^4 x$ , con lo que  $f' \left( \frac{\pi}{4} \right) = 1$ .  $g' \left( f \left( \frac{\pi}{4} \right) \right) = 4 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \right) = \pi - \frac{8}{3}$ . Así pues,  $(g \circ f)' \left( \frac{\pi}{4} \right) = \pi - \frac{8}{3}$

2. Sobre la integral  $\int_0^{2\pi} |\operatorname{sen} x| dx$  podemos afirmar:

- A. Vale 0. C. Vale 4.  
 B. No existe, pues  $y = |\operatorname{sen} x|$  no es integrable. D. Es  $|\operatorname{sen} 2\pi| + |\operatorname{sen} 0|$ .

La solución es C.

$$\int_0^{2\pi} |\operatorname{sen} x| dx = \int_0^{\pi} |\operatorname{sen} x| dx + \int_{\pi}^{2\pi} |\operatorname{sen} x| dx = \int_0^{\pi} \operatorname{sen} x dx - \int_{\pi}^{2\pi} \operatorname{sen} x dx = [-\operatorname{cos} x]_0^{\pi} + [\operatorname{cos} x]_{\pi}^{2\pi} = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

3. Sea  $f$  una función definida en el intervalo abierto  $(0,4)$  con derivada segunda continua. Si  $f$  tiene extremos locales en los puntos 1 y 2, de la integral  $I = \int_1^2 xf''(x) dx$ , podemos asegurar que:

- A.  $I = f(2) - f(1)$  B.  $I = f(1) - f(2)$  C.  $I = f'(1) - f'(2)$  D.  $I = 2f'(2) - f'(1)$

La solución es B.  $I = \int_1^2 xf''(x) dx = [xf'(x)]_1^2 - \int_1^2 f'(x) dx = [xf'(x)]_1^2 - [f(x)]_1^2 = 2f'(2) - f'(1) - (f(2) - f(1))$

Al tener  $f$  extremos locales en 1 y 2, se tiene  $f'(2) = f'(1) = 0$  por lo que  $I = f(1) - f(2)$ .

Señala, en cada caso, las respuestas correctas

4. Sean  $I = \int_0^1 t \cos^2(\pi t) dt$  y  $J = \int_0^1 t \operatorname{sen}^2(\pi t) dt$ .

- A.  $I > 0$  B.  $I + J = 1$  C.  $I \leq 1$  D.  $I - J \leq \int_0^1 t \cos 2\pi t dt$


La respuesta A es verdadera pues las funciones continuas  $f(t) = t \cos^2(\pi t)$  y  $g(t) = t \operatorname{sen}^2(\pi t)$  son no negativas en el intervalo  $[0,1]$ .

La respuesta B es falsa porque  $I + J = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$

La respuesta C es verdadera porque  $I = \int_0^1 t \cos^2(\pi t) dt \leq \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$ .

La respuesta D es verdadera porque  $I - J = \int_0^1 t(\cos^2(\pi t) - \operatorname{sen}^2(\pi t)) dt = \int_0^1 t \cos(2\pi t) dt$ .

5. Sea  $f$  la función definida en  $[0, \pi]$  cuya representación gráfica es la de la figura.



A.  $\int_0^{\pi} f(x) dx \geq 0$

C.  $\left| \int_0^{\pi} f(x) dx \right| = \int_0^{\pi/2} f(x) dx - \int_{\pi/2}^{\pi} f(x) dx$

B.  $\int_0^{\pi} |f(x)| dx = \left| \int_0^{\pi} f(x) dx \right|$

D. El valor medio de  $f$  en  $[0, \pi]$  es inferior a 1.

La respuesta A es verdadera pues  $\int_0^{\pi/2} f(x) dx > -\int_{\pi/2}^{\pi} f(x) dx$ .

La respuesta B es falsa, pues  $\int_0^{\pi} |f(x)| dx > \int_0^{\pi/2} f(x) dx$  y  $\left| \int_0^{\pi} f(x) dx \right| < \int_0^{\pi/2} f(x) dx$ .

La respuesta C es falsa pues  $\int_0^{\pi} f(x) dx > 0$ , por lo que

$$\left| \int_0^{\pi} f(x) dx \right| = \int_0^{\pi} f(x) dx = \int_0^{\pi/2} f(x) dx + \int_{\pi/2}^{\pi} f(x) dx \neq \int_0^{\pi/2} f(x) dx - \int_{\pi/2}^{\pi} f(x) dx.$$

La respuesta D es verdadera ya que  $\int_0^{\pi} f(x) dx < \int_0^{\pi/2} f(x) dx < \frac{\pi}{2} \cdot 2 = \pi$ , por lo que el valor medio de  $f$  en  $[0, \pi]$  es menor que  $\frac{\pi}{\pi} = 1$ .

**Elige la relación correcta entre las dos afirmaciones dadas**

6. \*Sea  $f$  una función continua en  $[a, b]$ .

1.  $\left| \int_a^b f(x) dx \right| = 0$

2.  $f(x) = 0$  en  $[a, b]$

A.  $1 \Leftrightarrow 2$

B.  $1 \Rightarrow 2$ , pero  $2 \not\Rightarrow 1$

C.  $2 \Rightarrow 1$  pero  $1 \not\Rightarrow 2$

D. 1 y 2 se excluyen entre sí.

La solución es C. Si  $f(x) = 0$  en  $[a, b]$ , es  $\int_a^b f(x) dx = 0$ , por lo que  $2 \Rightarrow 1$ . Obviamente  $1 \not\Rightarrow 2$ , como lo justifica cualquier función cuya gráfica sea como la del ejercicio, es decir, simétrica respecto del punto medio del intervalo  $[a, b]$ .

**Señala el dato innecesario para contestar**

7. Para calcular  $\int_0^8 f(x) dx$  nos dan estos datos:

1.  $f(x)$  es periódica de periodo 4.

2.  $f(x)$  es una función par.

3.  $f(x) = x$  para  $0 \leq x < 2$ .

A. Puede eliminarse el dato 1.

C. Puede eliminarse el dato 3.

B. Puede eliminarse el dato 2.

D. No puede eliminarse ningún dato.

La solución es D. Los datos 1, 2 y 3 son los tres necesarios para saber cómo es la función en  $[0, 8]$ . Así pues no puede eliminarse ningún dato.



PRUEBA I SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } -2 \leq x \leq -1 \\ \frac{x^2 - 3}{2} & \text{si } -1 < x \leq 0 \end{cases}$$

- a) Prueba que  $f(x)$  es continua en el intervalo  $[-2, 0]$  y derivable en el intervalo  $(2, 0)$ .
- b) Estudia si la función es creciente o decreciente en los intervalos  $(-2, -1)$  y  $(-1, 0)$ .

a) Se estudia la continuidad de la función en el intervalo  $[-2, 0]$ , tan sólo en el punto  $x = -1$ , ya que  $g(x) = \frac{1}{x}$  es

continua en  $\mathbb{R} - \{0\}$  y  $h(x) = \frac{x^2 - 3}{2}$  es continua en  $\mathbb{R}$ .

Como  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x} = -1$ ,  $f(x)$  es continua en dicho intervalo.

La derivabilidad se estudia en el punto  $x = -1$ .

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x^2} & \text{si } -2 < x < -1 \\ x & \text{si } -1 < x < 0 \end{cases}$$

Como  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} -\frac{1}{x^2} = -1$ ,  $f(x)$  es derivable en el intervalo dado.

- b) El dominio son todos los reales, ya que el denominador no se anula para ningún valor de  $x$ . Para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función se iguala la primera derivada a cero:

$$f'(x) = 0 \rightarrow \begin{cases} -\frac{1}{x^2} = 0, \text{ no existe} & \text{si } -2 < x < -1 \\ x = 0 & \text{si } -1 < x \leq 0 \end{cases}$$

Luego no tiene máximos o mínimos ya que el único punto en el que pudiera haberlos,  $x = 0$ , coincide con el extremo absoluto de la función.

	-2	-1	0
$f'$	-	-	
$f$	↘	↘	

Por tanto, la función es estrictamente decreciente ya que la derivada es siempre negativa en todo el intervalo.

2. Resuelve:

- a) Sea  $f$  la función definida como  $f(x) = \frac{ax^2 + b}{a - x}$  para  $x \neq a$ . Calcula  $a$  y  $b$  para que la gráfica de  $f$  pase por el punto  $(2, 3)$  y tenga una asíntota oblicua con pendiente  $-4$ .

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^2 + 2x + 2} - \sqrt{3x^2 + x}$

- a) La función pasa por el punto  $(2, 3)$ :  $f(2) = \frac{4a + b}{a - 2} = 3 \rightarrow 4a + b = 3a - 6 \rightarrow a + b = -6$

Como  $m = -4$ , pendiente de la asíntota oblicua, se tiene que:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + b}{a - x} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + b}{ax - x^2} = \frac{a}{-1} = -4 \rightarrow a = 4$$

Por lo tanto  $a + b = -6 \rightarrow 4 + b = -6 \rightarrow b = -10$ . La función es:  $f(x) = \frac{4x^2 - 10}{4 - x}$ .

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{3x^2 + 2x + 2} - \sqrt{3x^2 + x}) \cdot (\sqrt{3x^2 + 2x + 2} + \sqrt{3x^2 + x})}{(\sqrt{3x^2 + 2x + 2} + \sqrt{3x^2 + x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x + 2 - 3x^2 - x}{(\sqrt{3x^2 + 2x + 2} + \sqrt{3x^2 + x})} =$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 2}{(\sqrt{3x^2 + 2x + 2} + \sqrt{3x^2 + x})} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

3. Sea  $h(x) = x^4 - 2x^3 - 1$ :

- a) Enuncia el teorema de Bolzano.
  - b) Determina los extremos relativos y estudia la monotonía de  $h$ .
  - c) Utiliza el teorema de Bolzano para probar que la ecuación  $h(x) = 0$  tiene exactamente dos soluciones reales.
- a) Si  $f$  es una función real y continua en un intervalo cerrado  $[a, b]$  y, además,  $\text{signo } f(a) \neq \text{signo } f(b)$ , entonces existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = 0$ .
- b) Se iguala la primera derivada a cero:  $h'(x) = 4x^3 - 6x^2 = 0 \rightarrow 2x^2(2x - 3) = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \quad x = 0$

Estos valores son los candidatos a extremos. Para estudiar la monotonía de la función.

	$-\infty$	$0$	$\frac{3}{2}$	$\infty$
$h'$	-	-	+	
$h$				

Por lo que es decreciente en  $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right)$  y creciente en  $\left(\frac{3}{2}, \infty\right)$ .

$$h''(x) = 12x^2 - 12x \Rightarrow h''(0) = 0 \quad h''\left(\frac{3}{2}\right) = 12 \cdot \frac{9}{4} - 12 \cdot \frac{3}{2} > 0$$

Para  $x = 0$  tenemos un punto de inflexión, y para  $x = \frac{3}{2}$  un mínimo.

- c) Resolver la ecuación  $x^4 - 2x^3 - 1 = 0$  es equivalente a hallar los puntos de corte de  $h(x)$  con el eje X. Para ello, aplicamos el teorema de Bolzano. Teniendo en cuenta que la función es continua en todos los reales, buscamos valores para los que la función tiene signo distinto y vamos acotando:

$$h(-2) = (-2)^4 - 2(-2)^3 - 1 > 0 \quad h(0) = -1 < 0 \quad h(2) = 2^4 - 2 \cdot 2^3 - 1 < 0$$

$$h(-1) = (-1)^4 - 2(-1)^3 - 1 > 0 \quad h(1) = 1^4 - 2 \cdot 1^3 - 1 < 0 \quad h(3) = 3^4 - 2 \cdot 3^3 - 1 > 0$$

Por lo tanto podemos resumir:


$$\begin{cases} h(-1) > 0 \\ h(0) < 0 \end{cases} \Rightarrow \exists c_1 \in (-1, 0) \text{ tal que } h(c_1) = 0 \quad \begin{cases} h(2) > 0 \\ h(3) < 0 \end{cases} \Rightarrow \exists c_2 \in (2, 3) \text{ tal que } h(c_2) = 0.$$

Es imposible que haya más soluciones si atendemos a la monotonía de la función.

4. Dadas las funciones  $f(x) = 5 - x$  y  $g(x) = \frac{4}{x}$  para  $x \neq 0$ :

- a) Esboza el recinto limitado por las gráficas de  $f$  y  $g$  indicando sus puntos de corte.
- b) Calcula el área del recinto.

- a)  $f(x) = 5 - x$  es una recta y  $g(x) = \frac{4}{x}$ , es una hipérbola de I y III cuadrante.



Para ver los puntos de corte se iguala  $f(x)$  y  $g(x)$ , es decir,

$$5 - x = \frac{4}{x}, \text{ de donde } x^2 - 5x + 4 = 0.$$

Resolviendo la ecuación obtenemos  $x = 1$  y  $x = 4$ .

- b)  $A = \int_1^4 [f(x) - g(x)] dx = 5x - \frac{x^2}{2} - 4 \ln|x| \Big|_1^4 = \frac{15}{2} - 4 \ln 4$

5. Calcula las siguientes integrales, explicando el método de resolución:

a)  $\int x \cos(3x) dx$

b)  $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{(x^2 - x)(x - 1)}$

a) Se aplica el método de integración por partes:  $\int u(x) dv(x) = u(x) \cdot v(x) - \int v(x) du(x)$

$$u = x \rightarrow du = dx$$

$$dv = \cos(3x) dx \rightarrow v = \int \cos(3x) dx = \frac{1}{3} \operatorname{sen}(3x)$$

$$\int x \cos(3x) dx = \frac{x}{3} \operatorname{sen}(3x) - \frac{1}{3} \int \operatorname{sen}(3x) dx = \frac{x}{3} \operatorname{sen}(3x) + \frac{1}{9} \cos(3x) + C$$

b)  $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{(x^2 - x)(x - 1)} = \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x(x - 1)(x - 1)} = \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x(x - 1)^2}$ , que se puede descomponer en fracciones simples:

$$\frac{1}{x(x - 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{(x - 1)^2} = \frac{A(x - 1)^2 + Bx(x - 1) + Cx}{x(x - 1)^2}$$

$$1 = A(x - 1)^2 + Bx(x - 1) + Cx$$

Para  $x = 0$  tenemos que  $1 = A$ .

Para  $x = 1$  tenemos que  $1 = C$ .

Para  $x = 2$  tenemos que  $1 = A + 2B + 2C$ , y sustituyendo los valores  $A = 1$  y  $C = 1$ ,  $B = -1$ .

Por tanto, la integral queda:  $\int_{-2}^{-1} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx = \ln|x| - \ln|x - 1| - \frac{1}{(x - 1)} \Big|_{-2}^{-1} = \frac{1}{6} - 2 \ln 2 + \ln 3$

## PRUEBA II SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Se quiere obtener el límite  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{P(x)}{Q(x)}$  donde  $P(x)$  y  $Q(x)$  son funciones polinómicas. Se dan los siguientes datos:

1.  $P(0) = Q(0) = 0$

3. El resto de dividir  $Q(x)$  entre  $(x + 2)$  es 0.

2. El resto de dividir  $P(x)$  entre  $(x + 2)$  es 3

4. El resto de dividir  $Q(x)$  entre  $(x + 2)^2$  es 2.

¿Cuál es el dato innecesario para contestar y, por ello, puede eliminarse?

A. Puede eliminarse el dato 1.


C. Puede eliminarse el dato 3.

B. Puede eliminarse el dato 2.

D. Puede eliminarse el dato 4.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{P(x)}{Q(x)} = \left[ \frac{0}{0} \right]_{\text{ind}} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{P_1(x)(x+2)+3}{Q_1(x)(x+2)+0} = \left[ \frac{3}{0} \right] = \infty \quad \text{Solución D}$$

2. A la vista de la gráfica de la siguiente función, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?:



- A. Tiene una discontinuidad evitable en  $x = -1$ .  
 B. Tiene una discontinuidad de salto infinito en  $x = 2$ .  
 C. Tiene una discontinuidad de salto finito en  $x = 9$ .  
 D. Es continua por la derecha y por la izquierda en  $x = 15$ .

Solución: (B, C)

3. Se desea construir un paralelepípedo rectangular de 9 L de volumen de tal forma que un lado de la base sea el doble que el otro. Las longitudes de sus lados para que el área total de sus 6 caras sea mínima son:

A.  $x = \frac{3}{2}$  dm,  $h = 2$  dm      C.  $x = \frac{3}{2}$  cm,  $h = 2$  cm

B.  $x = 2$  dm,  $h = \frac{3}{2}$  dm      D.  $x = 2$  cm,  $h = \frac{3}{2}$  cm

Para relacionar las variables se utiliza la fórmula del volumen:  $V = A_b \cdot h = 2x \cdot x \cdot h = 2x^2h = 9 \rightarrow h = \frac{9}{2x^2}$

Por tanto, el área queda:  $A(x) = 4x^2 + 6xh = 4x^2 + \frac{27}{x} = \frac{4x^3 + 27}{x}$

E igualando la primera derivada a cero:  $A'(x) = \frac{8x^3 - 27}{x^2} = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2}$  dm

$\frac{3}{2}$		
A'	-	+
A	↘	↗

Como  $x = \frac{3}{2}$  dm  $\rightarrow h = 2$  dm      Solución: A

4. Para que la función  $f(x) = ax^3 + bx + c$  pase por el origen de coordenadas y tenga un mínimo en el punto  $(1, -1)$  los valores de  $a$ ,  $b$  y  $c$  tienen que ser:

A.  $a = 0, b = \frac{1}{2}, c = 0$

C.  $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}, c = 0$

B.  $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}, c = 0$

D. Este caso no puede ocurrir.

Si  $f(x)$  pasa por el origen de coordenadas entonces  $f(0) = c = 0$ , entonces  $f(x) = ax^3 + bx$

Por otro lado, sabemos que la función pasa por el punto  $(1, -1)$  y que además éste es un mínimo:

$$\begin{cases} f(1) = a + b = -1 \\ f'(x) = 3ax^2 + b = 0 \rightarrow f'(1) = 3a + b = 0, \text{ entonces} \end{cases} \begin{cases} a + b = -1 \\ 3a + b = 0 \end{cases}$$

Y resolviendo el sistema:  $a = \frac{1}{2}, b = -3a = -\frac{3}{2}$

Por lo tanto la función será  $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$  Solución: B

5. Lorenzo, que no sabe derivar, dice que las funciones  $f(x)$  y  $g(x)$  son primitivas de una misma función. Señala cuál o cuáles de las siguientes opciones verifican las afirmaciones de Lorenzo.

A.  $f(x) = \frac{x}{x+1}, g(x) = \frac{2x+1}{x+1}$

B.  $f(x) = \ln(2x^2 + 1), g(x) = \ln(24x^2 + 12)$

C.  $f(x) = \sin^{\sqrt{2}}x \cdot \cos^8x - \cos x, g(x) = \cos^5x \sin^{\sqrt{2}}x + \cos x$

D.  $f(x) = \operatorname{arctg}x, g(x) = -\operatorname{arctg} \frac{1}{x}$

Dos funciones son primitivas de una misma función sólo si difieren en una constante.

A.  $g(x) = \frac{2x+1}{x+1} = \frac{x+1}{x+1} + \frac{x}{x+1} = 1 + f(x)$ , luego A es verdadera.

B.  $g(x) = \ln[12(2x^2 + 1)] = \ln 12 + \ln(2x^2 + 1) = \ln 12 + f(x)$  y B es verdadera.

C.  $g(x) - f(x) = 2\cos x + \sin^{\sqrt{2}}x \cos^5x(1 - \cos^3x)$  por lo que C es falsa.

D.  $f(x) - g(x) = \operatorname{arctg}x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ , con lo que D es verdadera.

Solución: A, B y D

6. El área de la región limitada por la gráfica de la función  $f(x) = \begin{cases} \text{sen}(x) & \text{si } x \in [-2\pi, 0) \\ x^2 - 2x & \text{si } x \in [0, 3] \end{cases}$ , el eje de abscisas y las rectas verticales  $x = 0$  y  $x = 3$  es:


A. 0

B.  $\frac{\pi}{4}$

C. 1

D.  $\frac{8}{3}$

La gráfica de la función es:



Observando la gráfica de la función, el área pedida es:

$$\int_0^{-2} -(x^2 - 2x) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \left( -\frac{x^3}{3} + x^2 \right) \Big|_0^{-2} + \left( \frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_2^3 = \frac{8}{3} \text{ u}^2$$

El solucionario de **Matemáticas II de 2.º de Bachillerato** forma parte del Proyecto Editorial de Educación de SM. En su realización ha participado el siguiente equipo:

**Autoría**

Fernando Alcaide, Joaquín Hernández, María Moreno, Esteban Serrano, Vicente Rivière, José Miguel Gómez

**Edición**

Fernando de Blas, Oiana García, Fernando García, Arturo García

**Corrección científica**

Juan Jesús Donaire

**Corrección**

Javier López

**Ilustración**

Juan Antonio Rocafort, Bartolomé Seguí

**Diseño de cubierta e interiores**

Estudio SM

**Responsable de proyecto**

Arturo García

**Coordinación editorial de Matemáticas**

Josefina Arévalo

**Dirección de Arte del proyecto**

Mario Dequel

**Dirección editorial**

Aída Moya

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, [www.cedro.org](http://www.cedro.org)) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

