

Examen de Matemáticas 2º Bachillerato (CS)

Abril 2012

Problema 1 Se supone que el tiempo medio diario dedicado a ver TV en una cierta zona se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica 5 minutos. Se ha tomado una muestra aleatoria simple de 400 espectadores de TV en dicha zona, obteniéndose que el tiempo medio diario dedicado a ver TV es de 3 horas.

- Determinése un intervalo de confianza para μ con un nivel de confianza del 95 %.
- ¿Cuál ha de ser el tamaño mínimo de la muestra para que el error en la estimación de μ sea menor o igual que 3 minutos, con un nivel de confianza del 90 %?

(Madrid Junio 2011)

Solución:

- $N(\mu, 15)$, $n = 400$, $\bar{X} = 180$ minutos y $z_{\alpha/2} = 1,96$:

$$IC = \left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = (178,53; 181,47)$$

- $z_{\alpha/2} = 1,645$:

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies n = \left(z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{E} \right)^2 = 67,65$$

Como n tiene que ser un número natural $n = 68$

Problema 2 Se supone que el precio (en euros) de un refresco se puede aproximar mediante una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica igual a 0,09. Se toma una muestra aleatoria simple del precio del refresco en 10 establecimientos y resulta:

1,50; 1,60; 1,10; 0,90; 1,00; 1,60; 1,40; 0,90; 1,30; 1,20

- Determinése un intervalo de confianza al 95 % para μ .
- Calcúlese el tamaño mínimo que ha de tener la muestra elegida para que el valor absoluto de la diferencia entre la media de la muestral y la μ sea menor o igual que 0,10 euros con probabilidad mayor o igual que 0,99.

(Madrid Junio 2011)

Solución:

a) $N(\mu, 0,09)$, $n = 10$, $\bar{X} = 1,25$ y $z_{\alpha/2} = 1,96$:

$$IC = \left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = (1,194; 1,306)$$

b) $z_{\alpha/2} = 2,575$:

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies n = \left(z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{E} \right)^2 = 5,37$$

Como n tiene que ser un número natural $n = 6$

Problema 3 La edad a la que obtienen el permiso de conducir los habitantes de una determinada población es una variable aleatoria que se puede aproximar por una distribución normal de media 24 años y desviación típica 4 años. Se elige aleatoriamente una muestra de 100 habitantes de dicha población. Sea \bar{X} la media muestral de la edad de obtención del permiso de conducir.

a) ¿Cuáles son la media y la varianza de \bar{X} ?

b) Halle un intervalo de confianza al 90% para \bar{X} .

(Aragón Junio 2011) **Solución:**

a) $X \equiv N(24, 4) \implies \bar{X} \equiv N\left(24, \frac{4}{\sqrt{100}}\right) = N(24; 0,4)$

b) $z_{\alpha/2} = 1,645$:

$$IC = \left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = (23,34; 24,66)$$

Problema 4 El número de vehículos que pasan por un determinado semáforo de Móstoles entre las 09:00 y las 09:15 siguen una distribución normal de media 30 y una desviación típica de 5 coches. Se pide calcular:

a) La probabilidad de que pasen menos de 28 coches un día elegido al azar en el intervalo horario de 09:00 a 09:15.

b) La probabilidad de que pasen más de 34 coches un día elegido al azar en el intervalo horario de 09:00 a 09:15.

c) La probabilidad de que pasen entre 22 y 31 coches un día elegido al azar en el intervalo horario de 09:00 a 09:15.

Solución:

a) $P(X \leq 28) = P\left(Z \leq \frac{28 - 30}{5}\right) = P(Z \leq -0,4) = 1 - P(Z \leq 0,4) = 1 - 0,6554 = 0,3446$

b) $P(X \geq 34) = P\left(Z \geq \frac{34 - 30}{5}\right) = P(Z \geq 0,8) = 1 - P(Z \leq 0,8) = 1 - 0,7881 = 0,2119$

c) $P(22 \leq X \leq 31) = P\left(\frac{22 - 30}{5} \leq Z \leq \frac{31 - 30}{5}\right) = P(-1,6 \leq Z \leq 0,2) = P(Z \leq 0,2) - P(Z \leq -1,6) = P(Z \leq 0,2) - (1 - P(Z \leq 1,6)) = 0,5793 - (1 - 0,9452) = 0,5245$

Problema 5 Seguimos con el problema anterior: Años más tarde queremos contrastar si la cantidad de coches que pasan por el semáforo se siguen comportando como la normal $N(30,5)$. Para ello hacemos 10 medidas durante varios días en el mismo intervalo horario y hemos obtenido los siguientes resultados:

25, 27 31 22 20 33 32 28 30 27

Se pide:

- Calcular la distribución de la media muestral.
- Con esta nueva media, calcular la probabilidad de que ésta sea mayor de 33.
- Calcular el intervalo de confianza para esta media con un nivel de confianza del 95 %
- Decidir si la media ha variado lo suficiente como para considerar que la antigua media es obsoleta.

Solución:

a) $\bar{X} \approx N\left(27,5; \frac{5}{\sqrt{10}}\right) = N(27,5; 1,58)$

b) $P(\bar{X} \geq 33) = P\left(Z \geq \frac{33 - 27,5}{1,58}\right) = P(Z \geq 3,48) = 1 - P(Z \leq 3,48) = 1 - 0,9998 = 0,0002$

c) $z_{\alpha/2} = 1,96$:

$$IC = \left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = (24,403; 30,597)$$

- Como el intervalo de confianza contiene a 30 podemos considerar que la antigua media es todavía válida.