

## CONTINUIDAD Y LÍMITES DE FUNCIONES

1. En cada apartado, representa una función  $f(x)$  que cumpla:

a)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$f(x)$  es una función par

2. Califica cada una de las siguientes aseveraciones como **cierta** (explicando en qué concepto te basas) o **falsa** (poniendo un ejemplo que la contradiga)

a) Si  $f(2) = 3$  necesariamente se cumple que  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$

b) Si  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$  necesariamente se cumple que  $f(2) = 3$

c) Si una función está definida en todos los reales, necesariamente debe ser continua en cualquiera de sus puntos.

3. Estudia el dominio, las discontinuidades y esboza la gráfica de  $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{Si } x \leq -1 \\ 1-x^2 & \text{Si } -1 < x \leq 2 \\ \frac{1}{x-3} & \text{Si } x > 2 \end{cases}$

4. Estudia el dominio, las discontinuidades y esboza la gráfica de  $f(x) = \begin{cases} 2-x & \text{Si } x \leq -1 \\ \frac{3x}{4x^2-1} & \text{Si } -1 < x < 0 \\ x^2-3x & \text{Si } x \geq 0 \end{cases}$ .

5. Estudia el dominio, las asíntotas de la función y representa gráficamente la función:  $f(x) = \frac{6-x^2-x}{x^2+3x}$

6. Halla: a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5-1}{x^7-1}$

b)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+8}{x^2+4x+4}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1-\sqrt{x^2-3}}{x-2}$

d)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-2x-3}{2x^2-5x-3}$

7. Estudia el dominio, las discontinuidades y esboza la gráfica de  $f(x) = \frac{x^2-2x+1}{x^2+3x-4}$

8. Estudia el dominio, las asíntotas de la función y esboza la gráfica de  $f(x) = \frac{2}{1-e^x}$

9. ¿Para qué valores de  $a$  la función  $f(x) = \begin{cases} x+a & \text{Si } x \leq 1 \\ 3-ax^2 & \text{Si } x > 1 \end{cases}$  es continua en  $x=1$ ?

10. Dada la función:  $f(x) = \frac{ax^2+b}{x^3+2ax^2+bx+3}$  se pide:

a) Determinar  $a$  y  $b$  sabiendo que la función  $f(x)$  presenta una discontinuidad evitable en el punto  $x=1$

b) Definir una función  $g(x)$  que sea continua en  $x=1$  y que coincida con  $f(x)$  en el dominio de definición de ésta.

11. Obtener la expresión analítica de una función  $f(x)$  que en  $x=-3$  tenga una discontinuidad evitable, en  $x=1$  tenga una discontinuidad asíntótica con  $\lim_{x \rightarrow +1} f(x) = +\infty$  y además  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$

12. Un comerciante vende determinado producto. Por cada unidad de producto cobra la cantidad de 5€. No obstante, si se le encargan mas de 10 unidades, decide disminuir el precio por unidad y cobra  $\sqrt{ax^2 + 500}$  € por  $x$  unidades. Por lo tanto el precio de compra de  $x$  unidades viene dado por la función:


$$c(x) = \begin{cases} 5x & \text{si } 0 < x \leq 10 \\ \sqrt{ax^2 + 500} & \text{si } x > 10 \end{cases}$$



Se pide:

- El valor de  $a$  para que el precio varíe de forma continua al variar el número de unidades que se compran.
  - Define la función  $U(x)$  'precio por unidad'
  - ¿A cuánto tiende el precio de una unidad cuando se compran "muchísimas" unidades?
13. La puntuación obtenida por un estudiante en un examen depende del tiempo ( $t$  expresado en horas) que haya dedicado a su preparación en los siguientes términos:


$$p(t) = \begin{cases} \frac{t}{3} & \text{Si } 0 \leq t \leq 15 \\ \frac{20t}{2t + 30} & \text{Si } t > 15 \end{cases}$$

- Comprueba que la función es continua
  - Demuestra que la función  $p(t)$  es creciente en todo su dominio. (*Sugerencia: divide  $20t$  entre  $2t + 30$* )
  - Comprueba que si un estudiante ha dedicado menos de 15 horas su puntuación será inferior a 5 puntos
  - Justifica que la puntuación nunca podrá ser superior a 10 puntos
14. En el diagrama se muestra la gráfica de una función  $f(x)$  para  $-2 < x < 8$ . Esboza la gráfica de  $1/f(x)$  rotulando las asíntotas y los puntos máximos o mínimos relativos:






② a) Falsa. Por ejemplo:




sería  $f(2)=3$ , pero  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=1 \neq 3$

b) Falsa. Por ejemplo:



en que  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=3$ , pero no existe  $f(2)$

o también:



en que  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=3$ , pero  $f(2)=1 \neq 3$

c) Falsa. Podría tener discontinuidades:



Este está definido en  $\mathbb{R}$   
pero no es continuo  
en  $x=1$

③  $x-3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$   $\text{dom} f = (-\infty, -1] \cup (-1, 2] \cup (2, +\infty) - \{3\} = \boxed{\mathbb{R} - \{3\}}$

- $f(x)$  es continua en  $(-\infty, -1) \cup (-1, 2) \cup (2, +\infty) - \{3\}$  por tener expresiones polinómicas y racionales. No será continua en  $x=3$ , por anularse el denominador. Quedan por estudiar  $x=-1$  y  $x=2$ .

en  $x=-1$ :

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -1 + 1 = 0$$

$$f(-1) = -1 + 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 - (-1)^2 = 0$$

$\Rightarrow f(x)$  es continua en  $x=-1$

en  $x=2$ :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1 - 2^2 = -3$$

$$f(2) = 1 - 2^2 = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{1}{2-3} = -1$$


$\Rightarrow f(x)$  tiene una discontinuidad de Salto Finito en  $x=2$

en  $x=3$ :

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \frac{1}{3-3} = \frac{1}{0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \frac{1}{3^+-3} = \frac{1}{+0} = +\infty$$

$f(x)$  tiene una discontinuidad de Salto Infinito en  $x=3$



$f(x)$  es continua en  $\mathbb{R} - \{3, 2\}$

Para esbozar la gráfica:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty + 1 = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{+\infty-3} = \frac{1}{+\infty} = 0$

④  $4x^2 - 1 = 0$  ;  $4x^2 = 1$  ;  $x^2 = \frac{1}{4}$  ;  $x = \rightarrow \frac{1}{2}$  ~~o~~  $\frac{1}{2} \notin (-1, 2]$   
 $\rightarrow -\frac{1}{2}$


$\text{dom}f = (-\infty, -1] \cup (-1, 0) \cup \{-\frac{1}{2}\} \cup [0, +\infty) = \mathbb{R} - \{-\frac{1}{2}\}$

•  $f(x)$  es continua en  $(-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, +\infty) - \{-\frac{1}{2}\}$  por tener expresiones polinómicas y racionales. No es continua en  $x = -\frac{1}{2}$  por anularse el denominador, puede por estudiar  $x = -1$ ,  $x = 0$ .

• en  $x = -1$ :

$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 2 - (-1) = 3$   
 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{-3}{4-1} = \frac{-3}{3} = -1$   
 $f(-1) = 2 - (-1) = 3$

$\Rightarrow f(x)$  tiene una discontinuidad de salto finito en  $x = -1$



• en  $x = 0$ :

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{0}{-1} = 0$   
 $f(0) = 0^2 - 3 \cdot 0 = 0$   
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0^2 - 3 \cdot 0 = 0$

$\Rightarrow f(x)$  es continua en  $x = 0$

•  $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^-} f(x) = \frac{-3/2}{+0} = -\infty$   
 $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} f(x) = \frac{-3/2}{-0} = +\infty$

$\Rightarrow f(x)$  tiene una discontinuidad de salto infinito en  $x = -\frac{1}{2}$

x	y
0	0
1/5	-2/25
3	0

$f(x)$  es continua en  $\mathbb{R} - \{-1, -\frac{1}{2}\}$

Para esbozar la gráfica:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 - (-\infty) = +\infty$  ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$


⑤  $f(x) = \frac{6-x^2-x}{x^2+3x}$

$x^2+3x=0$  ;  $x = \begin{matrix} 0 \\ -3 \end{matrix}$   $\text{dom}f = \mathbb{R} - \{0, -3\}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -1 \rightarrow \text{Asíntota Horizontal } y = -1$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{6}{-0} = -\infty$   
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{6}{+0} = +\infty$

$\rightarrow \text{Asíntota Vertical } x = 0$



$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \frac{6-9+3}{9-9} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)(-x+2)}{x(x+3)} = \frac{5}{-3} \rightarrow \text{Discontinuidad Evitable en } x = -3$

$\frac{-3-1}{-1} = \frac{-4}{-1} = 4$   
 $\frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$   
 $\frac{6}{0} = \infty$



13) a) Las expresiones son polinómica y racional, por lo tanto definidas y continuas salvo que se anule el denominador:

$$2t+30=0 \rightarrow t=-15 \text{ porque } -15 \neq 10$$

o Si lo fue estudiar  $t=15$ :

$$\lim_{t \rightarrow 15^-} P(t) = \frac{15}{3} = 5$$

$$P(15) = \frac{15}{3} = 5$$

$$\lim_{t \rightarrow 15^+} P(t) = \frac{20 \cdot 15}{2 \cdot 15 + 30} = \frac{300}{60} = 5$$

$\Rightarrow P(t)$  también es continua en  $t=15$ .

b)  $\frac{t}{3}$  es creciente por tratarse de una recta con pendiente positiva:  $\frac{1}{3}$

$$\frac{20t}{2t+30} = 10 - \frac{300}{2t+30}$$

$$\frac{20t}{2t+30} = \frac{20t}{10} - \frac{300}{10}$$

$10 - \frac{300}{2t+30}$  va creciendo conforme aumenta  $t$ , ya que es sustrayendo se


hacia cada vez más pequeño, aumenta el valor de la resta.

c) Al ser  $P(t)$  creciente y continua, como  $P(15)=5$ , para  $t < 15 \Rightarrow P(t) < 5$ .


d) Al ser  $P(t)$  creciente y continua, su mayor valor lo alcanzará con valores infinitos de  $t$ :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{20t}{2t+30} = \frac{20}{2} = 10 \text{ Puntuación a la que se tenderá con } \text{i infinitos horas! de estudio.}$$

14)



X	f
-2	5
-1	0
0	-2
2	0
3	1
5	0
8	-1



X	1/f
-2	1/5
-1	X
0	-1/2
2	X
3	1
5	X
8	-1