

## Probabilidad condicionada

1. Sean  $A$  y  $B$  dos sucesos tales que las probabilidades  $P(A) = a$ ,  $P(B) = b$  y  $P(A \cap B) = c$  son conocidas. Calcular en función de  $a$ ,  $b$  y  $c$ :  $P(A \cup B)$ ,  $P(\bar{A} \cap \bar{B})$  y  $P(\bar{A} \cup B)$ .
- 

2. Sea  $S$  un espacio de sucesos y  $A$  y  $B$  dos sucesos de  $S$ , tales que  $P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0'3$ ,  $P(A) = 0'6$  y  $P(B) = 0'7$ . Calcular:  $P(A \cup B)$  y  $P(A \cap B)$ .
- 

3. Sean  $A$  y  $B$  dos sucesos aleatorios tales que:  $P(A) = \frac{3}{4}$ ,  $P(B) = \frac{1}{2}$  y  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{20}$   
Calcúlese:

a)  $P(A \cup B)$       b)  $P(A \cap B)$       c)  $P\left(\frac{\bar{A}}{B}\right)$       d)  $P\left(\frac{\bar{B}}{A}\right)$

---

4. Sean los tres sucesos  $A$ ,  $B$  y  $C$  de un experimento aleatorio tales que:  $P(A) = \frac{1}{2}$ ,  $P(B) = \frac{1}{3}$ ,  $P(C) = \frac{1}{4}$ ,  $P(A \cup B \cup C) = \frac{2}{3}$ ,  $P(A \cap B \cap C) = 0$ ,  $P(A/B) = \frac{1}{2}$  y  $P(C/A) = \frac{1}{2}$ .  
Calcular  $P(C \cap B)$  y  $P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C})$ .
- 

5. Sean  $A$  y  $B$  dos sucesos de un espacio de probabilidad de forma que:  $P(A) = 0'4$ ,  $P(B) = 0'3$  y  $P(A \cap B) = 0'1$ . Calcular razonadamente:

a)  $P(A \cup B)$       b)  $P(\bar{A} \cup \bar{B})$       c)  $P(A/B)$       d)  $P(\bar{A} \cap B)$

---

6. Se consideran dos sucesos  $A$  y  $B$  tales que:  $P(A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(B/A) = \frac{1}{4}$  y  $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ ,  
calcúlese razonadamente: a)  $P(A \cap B)$       b)  $P(B)$       c)  $P\left(\frac{\bar{B}}{A}\right)$       d)  $P\left(\frac{\bar{A}}{\bar{B}}\right)$
- 

7. Sean  $A$  y  $B$  sucesos de un experimento aleatorio tales que:  $P(A \cap B) = 0'1$ ,  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0'6$  y  $P(A/B) = 0'5$ . Calcúlese: a)  $P(B)$       b)  $P(A \cup B)$       c)  $P(A)$       d)  $P\left(\frac{\bar{B}}{A}\right)$


## Probabilidad condicionada

1. Sean  $A$  y  $B$  dos sucesos tales que las probabilidades  $P(A) = a$ ,  $P(B) = b$  y  $P(A \cap B) = c$  son conocidas. Calcular en función de  $a$ ,  $b$  y  $c$ :  $P(A \cup B)$ ,  $P(\bar{A} \cap \bar{B})$  y  $P(\bar{A} \cup B)$ .

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = a + b - c$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) \stackrel{\text{De Morgan}}{=} P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (a + b - c) = 1 - a - b + c$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cup B) &= P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A} \cap B) = 1 - P(A) + P(B) - (P(B) - P(A \cap B)) \\ &= 1 - a + b - (b - c) = 1 - a + c \end{aligned}$$



Directamente, del diagrama de Venn, se veía que:  $\bar{A} \cup B = \bar{A} \cup (A \cap B)$

2. Sea  $S$  un espacio de sucesos y  $A$  y  $B$  dos sucesos de  $S$ , tales que  $P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0'3$ ,  $P(A) = 0'6$  y  $P(B) = 0'7$ . Calcular:  $P(A \cup B)$  y  $P(A \cap B)$ .

$$P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0'3 ; P(A) = 0'6 ; P(B) = 0'7$$

Se puede resolver con un sistema donde  $x = P(A \cup B)$  y  $y = P(A \cap B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow x = 0'6 + 0'7 - y$$

$$P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0'3 \Rightarrow x - y = 0'3 \rightarrow x = y + 0'3$$

$$y + 0'3 = 1'3 - y \Rightarrow 2y = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2} = 0'5 \Rightarrow x = 0'5 + 0'3 = 0'8$$

Solución:  $P(A \cup B) = 0'8$        $P(A \cap B) = 0'5$

3. Sean  $A$  y  $B$  dos sucesos aleatorios tales que :  $P(A) = \frac{3}{4}$ ,  $P(B) = \frac{1}{2}$  y  $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{1}{20}$

Calcúlese:

- a)  $P(A \cup B)$       b)  $P(A \cap B)$       c)  $P(\overline{A}/B)$       d)  $P(\overline{B}/A)$

DATOS:  $P(A) = \frac{3}{4}$      $P(B) = \frac{1}{2}$      $P(A \cap B) = \frac{1}{20} = P(\overline{A} \cap \overline{B})$

a)  $P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - \frac{1}{20} = \frac{19}{20}$

b)  $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{19}{20} = \frac{15 + 10 - 19}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

c)  $P(\overline{A}/B) = \frac{P(\overline{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{10}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{2}{10}}{\frac{1}{2}} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

d)  $P(\overline{B}/A) = \frac{P(\overline{B} \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{4} - \frac{3}{10}}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{15}{20} - \frac{6}{20}}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{9}{20}}{\frac{3}{4}} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3} = \frac{3}{5}$

También se podría haber razonado con una tabla de contingencia, pero quizá sea más largo

	A	$\overline{A}$	
B	$\frac{3}{10}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{3}{4}$
$\overline{B}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

4. Sean los tres sucesos  $A$ ,  $B$  y  $C$  de un experimento aleatorio tales que:  $P(A) = \frac{1}{2}$ ,  $P(B) = \frac{1}{3}$ ,  $P(C) = \frac{1}{4}$ ,  $P(A \cup B \cup C) = \frac{2}{3}$ ,  $P(A \cap B \cap C) = 0$ ,  $P(A/B) = \frac{1}{2}$  y  $P(C/A) = \frac{1}{2}$ .

Calcular  $P(C \cap B)$  y  $P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C})$ .

Sabemos que

→ Datos

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Por otro lado, sabemos que

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$P(C/A) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C/A) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Despejando de la primera fórmula se obtiene:

$$\begin{aligned} P(C \cap B) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C) - P(A \cup B \cup C) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + 0 - \frac{2}{3} = \frac{12 + 8 + 6 - 4 - 3 - 16}{24} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Por otro lado

$$P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = P(\overline{A \cap B \cap C}) = 1 - P(A \cap B \cap C) = 1 - 0 = 1$$

5. Sean  $A$  y  $B$  dos sucesos de un espacio de probabilidad de forma que:  $P(A) = 0'4$ ,  $P(B) = 0'3$  y  $P(A \cap B) = 0'1$ . Calcular razonadamente:

a)  $P(A \cup B)$

b)  $P(\bar{A} \cup \bar{B})$

c)  $P(A/B)$

d)  $P(\bar{A} \cap \bar{B})$

$$a) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0'4 + 0'3 - 0'1 = 0'6$$

$$b) P(\bar{A} \cup \bar{B}) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{DM}}}{=} P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0'1 = 0'9$$

$$c) P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0'1}{0'3} = \frac{1}{3} = 0'3$$

$$d) P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(B) - P(A \cap B) = 0'3 - 0'1 = 0'2$$

6. Se consideran dos sucesos  $A$  y  $B$  tales que:  $P(A) = 1/3$ ,  $P(B/A) = 1/4$  y  $P(A \cup B) = 1/2$ , calcúlese razonadamente: a)  $P(A \cap B)$  b)  $P(B)$  c)  $P(\bar{B}/A)$  d)  $P(\bar{A}/\bar{B})$

$$a) P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$b) P(B) = P(A) + P(A \cap B) + P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{12} + \frac{1}{2} = \frac{-4 + 1 + 6}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$c) P(\bar{B}/A) = \frac{P(\bar{B} \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/3 - 1/12}{1/3} = \frac{1/4}{1/3} = \frac{3}{4}$$

$$d) P(\bar{A}/\bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A \cup B)}{1 - P(B)} = \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(B)} = \frac{1 - 1/2}{1 - 1/4} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

7. Sean  $A$  y  $B$  sucesos de un experimento aleatorio tales que:  $P(A \cap B) = 0'1$ ,  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0'6$  y

$P(A/B) = 0'5$ . Calcúlese: a)  $P(B)$     b)  $P(A \cup B)$     c)  $P(A)$     d)  $P\left(\frac{\bar{B}}{\bar{A}}\right)$

$$a) P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A/B)} = \frac{0'1}{0'5} = \frac{1}{5} = 0'2$$

$$b) P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0'6 = 0'4$$

$$c) P(A) = P(A \cup B) - P(B) + P(A \cap B) = 0'4 - 0'2 + 0'1 = 0'3$$

$$d) P\left(\frac{\bar{B}}{\bar{A}}\right) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{A})} = \frac{0'6}{1 - 0'1} = \frac{0'6}{0'9} = \frac{2}{3} = 0'6$$