



EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
206-MATEMÁTICAS II.
 EBAU2021 - JULIO

OBSERVACIONES IMPORTANTES: Se debe responder a un máximo de 4 cuestiones y no es necesario hacerlo en el mismo orden en que están enunciadas. Cada cuestión tiene una puntuación de 2,5 puntos. Si se responde a más de 4 cuestiones, sólo se corregirán las 4 primeras, en el orden que haya respondido el estudiante. Solo se podrán usar las tablas estadísticas que se adjuntan. No se podrán usar calculadoras gráficas ni programables.

1: Considere el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro a :

$$\begin{cases} x + ay - z = 0 \\ 2x + y + az = 0 \\ x + 5y - az = a + 1 \end{cases}$$

- a) [0,75 p.] Determine para qué valores de a el sistema tiene solución única.
- b) [1 p.] Determine para qué valor de a el sistema tiene infinitas soluciones y resuélvalo en ese caso.
- c) [0,75 p.] Determine para qué valor de a el sistema no tiene solución.

2: Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & a \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

- a) [1 p.] Si se denota por $\text{tr}(A)$ la traza de la matriz A (es decir, la suma de los elementos de su diagonal principal) y por $|A|$ el determinante de A , compruebe que, para cualquier valor de a , se cumple la ecuación $A^2 = \text{tr}(A)A - |A|I$, donde I denota la matriz identidad de orden 2.
- b) [0.5 p.] Determine para qué valores de a la matriz A es regular (o inversible).
- c) [1 p.] Para $a = -3$, resuelva la ecuación matricial $AX - A^t = A$, donde A^t denota la matriz traspuesta de A .

3: Dada la función $f(x) = x^2 e^{-x}$ definida para todo valor de $x \in \mathbb{R}$, se pide:

- a) [1,5 p.] Calcule sus extremos relativos (máximos y mínimos) y determine sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- b) [1 p.] Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

4:

- a) [1,5 p.] Calcule la integral indefinida $\int x \text{sen}(x^2) dx$ utilizando el método de cambio de variable (o método de sustitución).
- b) [1 p.] Determine el menor valor de $a > 0$ para el cual se cumple $\int_0^a x \text{sen}(x^2) dx = 1$

5: Considere las rectas de ecuaciones

$$r: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1} \quad \text{y} \quad s: \begin{cases} x-2y = -1 \\ y+z = 1 \end{cases}.$$

- [0,75 p.]** Compruebe que las rectas se cortan en un punto y calcule su punto de corte.
- [1 p.]** Determine el ángulo que forman las dos rectas.
- [0,75 p.]** Calcule la ecuación del plano que contiene a las dos rectas.

6: Los puntos $A = (2, 0, 0)$ y $B = (-1, 12, 4)$ son dos vértices de un triángulo. El tercer vértice C se encuentra en la recta r dada por

$$r: \begin{cases} 4x + 3z = 33 \\ y = 0 \end{cases}$$

- [1,5 p.]** Calcule las coordenadas del tercer vértice C sabiendo que la recta r es perpendicular a la recta que pasa por A y C .
- [1 p.]** Determine si el triángulo ABC tiene un ángulo recto en A y calcule su área.

7: Una urna contiene cinco bolas negras, numeradas del 1 al 5, y siete bolas blancas, numeradas del 1 al 7. Se saca de la urna una bola al azar. Calcule:

- [0,5 p.]** La probabilidad de que la bola sea blanca.
- [0,5 p.]** La probabilidad de que bola esté numerada con un número par.
- [0,5 p.]** La probabilidad de que bola esté numerada con un número par, sabiendo que es una bola blanca.
- [0,5 p.]** La probabilidad de que bola sea blanca y esté numerada con un número par.
- [0,5 p.]** La probabilidad de que bola sea blanca, sabiendo que está numerada con un número par

8: Juan es un estudiante bastante despistado y su tutora está cansada de que llegue tarde a clase. Él se defiende diciendo que no es para tanto y que la tutora le tiene manía. Ella le propone el siguiente trato: si en los próximos 9 días Juan llega tarde como mucho 2 días, la tutora le sube 1 punto en la nota final de la evaluación. Sabiendo que la probabilidad de que Juan llegue tarde a clase cada día es 0,45, determine:

- [1 p.]** El tipo de distribución que sigue la variable aleatoria que cuenta el número de días que Juan llega tarde a clase en los próximos 9 días. ¿Cuáles son sus parámetros?
- [0,5 p.]** ¿Cuál es la media y la desviación típica de esta distribución?
- [1 p.]** ¿Cuál es la probabilidad de que Juan consiga la ansiada subida de 1 punto en la nota final?

SOLUCIONES

1: Considere el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro a :

$$\begin{cases} x + ay - z = 0 \\ 2x + y + az = 0 \\ x + 5y - az = a + 1 \end{cases}$$

- a) **[0,75 p.]** Determine para qué valores de a el sistema tiene solución única.
 b) **[1 p.]** Determine para qué valor de a el sistema tiene infinitas soluciones y resuélvalo en ese caso.
 c) **[0,75 p.]** Determine para qué valor de a el sistema no tiene solución.

Realizamos el estudio completo y luego respondemos a las preguntas planteadas en cada apartado.

Consideramos la matriz de coeficientes $A = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & 5 & -a \end{pmatrix}$

y la matriz ampliada $A/B = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 & 0 \\ 2 & 1 & a & 0 \\ 1 & 5 & -a & a+1 \end{pmatrix}$.

Averiguamos donde se anula el determinante de la matriz de coeficientes A .

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & -1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & 5 & -a \end{vmatrix} = -a + a^2 - 10 + 1 + 2a^2 - 5a = 3a^2 - 6a - 9$$

$$|A| = 0 \Rightarrow 3a^2 - 6a - 9 = 0 \Rightarrow a^2 - 2a - 3 = 0 \Rightarrow$$

$$a = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 + 12}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2} = \begin{cases} \frac{2+4}{2} = 3 \\ \frac{2-4}{2} = -1 \end{cases}$$

Analizamos tres casos por separado.

CASO 1. $a \neq -1$ y $a \neq 3$

En este caso el determinante de A es no nulo y su rango es 3. El rango de la ampliada A/B también es 3, así como el número de incógnitas.

El sistema es compatible determinado (**solución única**).

CASO 2. $a = -1$

Las matrices quedan $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ y $A/B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Como la matriz ampliada solo tiene añadida una cuarta columna con todo ceros el rango de A y de A/B van a ser el mismo, por lo que el sistema es compatible. Como el rango de A no es 3 pues el determinante es nulo, el rango de $A =$ Rango de A/B pero menor que el número de incógnitas (3).

El sistema es compatible indeterminado (infinitas soluciones).

CASO 3. $a = 3$

Las matrices quedan $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}$ y $A/B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & -3 & 4 \end{pmatrix}$.

Transformamos la matriz A/B en otra matriz triangular equivalente con el método de Gauss.

$$A/B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & -3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Fila } 2^a - 2 \cdot \text{Fila } 1^a \\ 2 \quad 1 \quad 3 \quad 0 \\ \hline -2 \quad -6 \quad 2 \quad 0 \\ 0 \quad -5 \quad 5 \quad 0 \\ \text{Nueva Fila } 2^a \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Fila } 3^a - \text{Fila } 1^a \\ 1 \quad 5 \quad -3 \quad 4 \\ \hline -1 \quad -3 \quad 1 \quad 0 \\ 0 \quad 2 \quad -2 \quad 4 \\ \text{Nueva Fila } 3^a \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{5} \cdot \text{Fila } 2^a \rightarrow \text{Nueva Fila } 2^a \\ \frac{1}{2} \cdot \text{Fila } 3^a \rightarrow \text{Nueva Fila } 3^a \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Fila } 3^a + \text{Fila } 2^a \\ 0 \quad 1 \quad -1 \quad 2 \\ \hline 0 \quad -1 \quad 1 \quad 0 \\ 0 \quad 0 \quad 0 \quad 2 \\ \text{Nueva Fila } 3^a \end{array} \right\} \Rightarrow (A/B)' = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Observando la matriz triangular obtenida vemos que al quitar la 4ª columna nos queda una matriz triangular con 2 filas no nulas, el rango de A es 2, pero si la miramos al completo observamos que hay 3 filas no nulas, el rango de A/B es 3. Los rangos de A y de A/B son distintos. Por lo que el sistema es incompatible (no tiene solución).

- a) El sistema tiene solución única para $a \neq -1$ y $a \neq 3$
- b) El sistema tiene infinitas soluciones para $a = -1$.

$$\left\{ \begin{array}{l} x - y - z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ x + 5y + z = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Ecuación } 2^a - 2 \cdot \text{Ecuación } 1^a \\ 2x \quad +y \quad -z \quad = 0 \\ \hline -2x \quad +2y \quad +2z \quad = 0 \\ 0 \quad 3y \quad +z \quad = 0 \\ \text{Nueva ecuación } 2^a \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Ecuación } 3^a - \text{Ecuación } 1^a \\ x \quad +5y \quad +z \quad = 0 \\ \hline -x \quad +y \quad +z \quad = 0 \\ 0 \quad 6y \quad +2z \quad = 0 \\ \text{Nueva ecuación } 3^a \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - y - z = 0 \\ 3y + z = 0 \\ 6y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Ecuación 3}^a - 2 \cdot \text{Ecuación 2}^a \\ 6y + 2z = 0 \\ -6y - 2z = 0 \\ \hline 0 \quad 0 = 0 \\ \text{Nueva ecuación 3}^a \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x - y - z = 0 \\ 3y + z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - y - z = 0 \\ 3y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - y - z = 0 \\ z = -3y \end{cases} \Rightarrow x - y + 3y = 0 \Rightarrow x + 2y = 0 \Rightarrow \boxed{x = -2y}$$

Las soluciones del sistema son $x = -2t$; $y = t$, $z = -3t$.

c) Para $a = 3$ el sistema no tiene solución.

2: Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & a \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

a) [1 p.] Si se denota por $\text{tr}(A)$ la traza de la matriz A (es decir, la suma de los elementos de su diagonal principal) y por $|A|$ el determinante de A , compruebe que, para cualquier valor de a , se cumple la ecuación $A^2 = \text{tr}(A)A - |A|I$, donde I denota la matriz identidad de orden 2.

b) [0.5 p.] Determine para qué valores de a la matriz A es regular (o inversible).

c) [1 p.] Para $a = -3$, resuelva la ecuación matricial $AX - A^t = A$, donde A^t denota la matriz traspuesta de A .

a) Calculamos la expresión de ambos miembros de la igualdad $A^2 = \text{tr}(A)A - |A|I$

$$\text{Primer miembro} \rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 2 & a \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & a \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-a & 2a+2a \\ -2-2 & -a+4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4-a & 4a \\ -4 & 4-a \end{pmatrix}}$$

$$\begin{aligned} \text{Segundo miembro} \rightarrow \text{tr}(A)A - |A|I &= (2+2) \begin{pmatrix} 2 & a \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & a \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= 4 \begin{pmatrix} 2 & a \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - (4+a) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 4a \\ -4 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4+a & 0 \\ 0 & 4+a \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 8-4-a & 4a-0 \\ -4-0 & 8-4-a \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4-a & 4a \\ -4 & 4-a \end{pmatrix}} \end{aligned}$$

Como se comprueba se obtiene lo mismo.

b) Vemos cuando el determinante de A es no nulo.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & a \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + a$$

$$|A| = 0 \Rightarrow 4 + a = 0 \Rightarrow a = -4$$

La matriz A es regular para cualquier valor de a distinto de -4 .

c) Para $a = -3$ la matriz es invertible.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = 1 \neq 0$$

Calculamos su inversa.

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A^t)}{|A|} = \frac{\text{Adj} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}}{1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Despejamos en la ecuación la matriz X .

$$AX - A^t = A \Rightarrow AX = A + A^t \Rightarrow X = A^{-1}(A + A^t)$$

Sustituimos y obtenemos el valor de la matriz X.

$$X = A^{-1}(A + A')$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8-12 & -8+12 \\ 4-8 & -4+8 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$$

3: Dada la función $f(x) = x^2 e^{-x}$ definida para todo valor de $x \in \mathbb{R}$, se pide:

a) [1,5 p.] Calcule sus extremos relativos (máximos y mínimos) y determine sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

b) [1 p.] Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

a) Derivamos e igualamos a cero en busca de los puntos críticos.

$$f(x) = x^2 e^{-x} \Rightarrow f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = (2-x)x e^{-x}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow (2-x)x e^{-x} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=2 \end{cases}$$

Tenemos dos puntos críticos, comprobamos el comportamiento de la función antes, entre y después de estos valores.

- En $(-\infty, 0)$ tomo $x = -1$ y la derivada vale $f'(-1) = (2 - (-1))(-1)e^{-(-1)} = -3e < 0$. La función decrece en $(-\infty, 0)$.
- En $(0, 2)$ tomo $x = 1$ y la derivada vale $f'(1) = (2-1)(1)e^{-1} = \frac{3}{e} > 0$. La función crece en $(0, 2)$.
- En $(2, +\infty)$ tomo $x = 3$ y la derivada vale $f'(3) = (2-3)(3)e^{-3} = -\frac{3}{e^3} < 0$. La función decrece en $(2, +\infty)$.

La función sigue el esquema siguiente:



La función crece en $(0, 2)$ y decrece en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

La función presenta un mínimo relativo en $x = 0$.

Como $f(0) = 0^2 e^{-0} = 0$ las coordenadas del mínimo relativo son $P(0, 0)$.

La función presenta un máximo relativo en $x = 2$.

Como $f(2) = 2^2 e^{-2} = \frac{4}{e^2}$ las coordenadas del máximo relativo son $Q\left(2, \frac{4}{e^2}\right)$

b)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = \frac{+\infty}{\infty} = \frac{\infty}{\infty} = \text{In det er min acción (L'Hôpital)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} = \frac{\infty}{\infty} = \text{In det er min acción (L'Hôpital)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = \frac{2}{\infty} = \boxed{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = (-\infty)^2 e^{+\infty} = (+\infty)(+\infty) = +\infty$$

4:

a) [1,5 p.] Calcule la integral indefinida $\int x \operatorname{sen}(x^2) dx$ utilizando el método de cambio de variable (o método de sustitución).

b) [1 p.] Determine el menor valor de $a > 0$ para el cual se cumple $\int_0^a x \operatorname{sen}(x^2) dx = 1$

a)

$$\int x \operatorname{sen}(x^2) dx = \left\{ \begin{array}{l} x^2 = t \\ 2x dx = dt \\ dx = \frac{dt}{2x} \end{array} \right\} = \int \cancel{x} \operatorname{sen}(t) \frac{dt}{2\cancel{x}} = \frac{1}{2} \int \operatorname{sen} t dt = -\frac{1}{2} \cos t =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} \text{Deshacemos el cambio de variable} \\ x^2 = t \end{array} \right\} = \boxed{-\frac{1}{2} \cos(x^2) + K}$$

b)

$$\int_0^a x \operatorname{sen}(x^2) dx = 1 \Rightarrow \left[-\frac{1}{2} \cos(x^2) \right]_0^a = 1 \Rightarrow \left[-\frac{1}{2} \cos(a^2) \right] - \left[-\frac{1}{2} \cos(0^2) \right] = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \cos(a^2) + \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow -\cos(a^2) + 1 = 2 \Rightarrow \cos(a^2) = -1 \Rightarrow a^2 = \arccos(-1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a^2 = \pi + 2\pi k, \text{ siendo } k = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

Como nos piden el valor de a positivo más pequeño.

$$a^2 = \pi \Rightarrow \boxed{a = \sqrt{\pi}}$$

5: Considere las rectas de ecuaciones

$$r: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1} \quad \text{y} \quad s: \begin{cases} x-2y = -1 \\ y+z = 1 \end{cases}.$$

- a) [0,75 p.] Compruebe que las rectas se cortan en un punto y calcule su punto de corte.
 b) [1 p.] Determine el ángulo que forman las dos rectas.
 c) [0,75 p.] Calcule la ecuación del plano que contiene a las dos rectas.

a)

$$r: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1} \Rightarrow \begin{cases} \vec{u}_r = (1, 1, -1) \\ P_r = (1, 0, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x-2y = -1 \\ y+z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 + 2y \\ z = 1 - y \end{cases} \Rightarrow s: \begin{cases} x = -1 + 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{v}_s = (2, 1, -1) \\ Q_s = (-1, 0, 1) \end{cases}$$

Comprobamos si sus vectores directores tienen coordenadas proporcionales.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{u}_r = (1, 1, -1) \\ \vec{v}_s = (2, 1, -1) \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{2} \neq \frac{1}{1} = \frac{-1}{-1}$$

Los vectores directores no tienen coordenadas proporcionales y por tanto las rectas no son ni paralelas ni coincidentes.

Consideramos los vectores \vec{u}_r , \vec{v}_s y $\overrightarrow{P_r Q_s}$ y vemos si su producto mixto es nulo o no.

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{P_r Q_s} = (-1, 0, 1) - (1, 0, 1) = (-2, 0, 0) \\ \vec{u}_r = (1, 1, -1) \\ \vec{v}_s = (2, 1, -1) \end{array} \right\} \Rightarrow [\vec{u}_r, \vec{v}_s, \overrightarrow{P_r Q_s}] = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

El producto mixto es nulo y las rectas son coplanarias con distinta dirección y por lo tanto se cortan en un punto.

Averiguamos el punto de corte resolviendo el sistema formado por sus ecuaciones.

$$r: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1} \Rightarrow r: \begin{cases} x = 1 + \alpha \\ y = \alpha \\ z = 1 - \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 + \alpha = -1 + 2\lambda \\ \alpha = \lambda \\ 1 - \alpha = 1 - \lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -2 + 2\lambda \\ \alpha = \lambda \\ \alpha = \lambda \end{cases} \Rightarrow \lambda = -2 + 2\lambda \Rightarrow$$

$$s: \begin{cases} x - 2y = -1 \\ y + z = 1 \end{cases} \Rightarrow s: \begin{cases} x = -1 + 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2 = \lambda \Rightarrow \begin{cases} x = -1 + 4 = 3 \\ y = 2 \\ z = 1 - 2 = -1 \end{cases} \Rightarrow C(3, 2, -1)$$

El punto de corte de las rectas es $C(3, 2, -1)$

b) Vemos el ángulo que forman sus vectores directores.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{u}_r = (1, 1, -1) \\ \vec{v}_s = (2, 1, -1) \end{array} \right\} \Rightarrow \cos(\vec{u}_r, \vec{v}_s) = \frac{\vec{u}_r \cdot \vec{v}_s}{|\vec{u}_r| \cdot |\vec{v}_s|} = \frac{(1, 1, -1)(2, 1, -1)}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2} \sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{2+1+1}{\sqrt{3}\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{18}}$$

$$(r, s) = (\vec{u}_r, \vec{v}_s) = \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{18}}\right) \approx 19,47^\circ$$

Las rectas forman un ángulo de 19° .

c) El plano que contiene las dos rectas tiene como vectores directores los vectores directores de las rectas y el punto $C(3, 2, -1)$ pertenece al plano.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{u} = \vec{u}_r = (1, 1, -1) \\ \vec{v} = \vec{v}_s = (2, 1, -1) \\ C(3, 2, -1) \in \pi \end{array} \right\} \Rightarrow \pi \equiv \begin{vmatrix} x-3 & y-2 & z+1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cancel{x-3} - 2y + 4 + z + 1 - 2z - 2 + y - 2 + \cancel{x-3} = 0 \Rightarrow -y - z + 1 = 0 \Rightarrow \boxed{\pi \equiv y + z - 1 = 0}$$


6: Los puntos $A = (2, 0, 0)$ y $B = (-1, 12, 4)$ son dos vértices de un triángulo. El tercer vértice C se encuentra en la recta r dada por

$$r: \begin{cases} 4x + 3z = 33 \\ y = 0 \end{cases}$$

a) [1,5 p.] Calcule las coordenadas del tercer vértice C sabiendo que la recta r es perpendicular a la recta que pasa por A y C .

b) [1 p.] Determine si el triángulo ABC tiene un ángulo recto en A y calcule su área.

a) La situación planteada es la del dibujo siguiente.



Sabemos que el punto C pertenece a la recta r , por lo que cumple sus ecuaciones.

$$r: \begin{cases} 4x + 3z = 33 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P(0, 0, 11) \in r \\ Q(3, 0, 7) \in r \end{cases} \Rightarrow r: \begin{cases} P(0, 0, 11) \in r \\ \vec{v}_r = \overrightarrow{QP} = (0, 0, 11) - (3, 0, 7) = (-3, 0, 4) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r: \begin{cases} x = -3\alpha \\ y = 0 \\ z = 11 + 4\alpha \end{cases}$$

El punto C tiene coordenadas $C(-3a, 0, 11 + 4a)$.

Como el vector \overrightarrow{AC} es perpendicular a la recta r , el producto escalar de \overrightarrow{AC} y \vec{v}_r debe ser cero.

$$\overrightarrow{AC} = (-3a, 0, 11 + 4a) - (2, 0, 0) = (-3a - 2, 0, 11 + 4a)$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \vec{v}_r = 0 \Rightarrow (-3a - 2, 0, 11 + 4a) \cdot (-3, 0, 4) = 0 \Rightarrow 9a + 6 + 0 + 44 + 16a = 0 \Rightarrow$$


$$\Rightarrow 25a = -50 \Rightarrow a = -2 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} C(-3a, 0, 11 + 4a) \\ a = -2 \end{array} \right\} \Rightarrow C(6, 0, 3)$$

El punto C tiene coordenadas $C(6, 0, 3)$

b) Para que tenga ángulo recto en A el producto escalar de los vectores \overrightarrow{AC} y \overrightarrow{AB} debe ser nulo.

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{AC} = (6,0,3) - (2,0,0) = (4,0,3) \\ \overrightarrow{AB} = (-1,12,4) - (2,0,0) = (-3,12,4) \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = (4,0,3) \cdot (-3,12,4) = -12 + 12 = 0$$

El ángulo en el vértice A es de 90° .



Por ser un triángulo rectángulo el área del triángulo es la mitad del producto de la base (módulo del vector \overrightarrow{AC}) por la altura (módulo del vector \overrightarrow{AB}).

$$\left. \begin{array}{l} |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{4^2 + 0^2 + 3^2} = 5 \\ |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-3)^2 + 12^2 + 4^2} = 13 \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\text{Área} = \frac{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{AB}|}{2} = \frac{5 \cdot 13}{2} = 32.5 \text{ u}^2}$$

7: Una urna contiene cinco bolas negras, numeradas del 1 al 5, y siete bolas blancas, numeradas del 1 al 7. Se saca de la urna una bola al azar. Calcule:

- [0,5 p.]** La probabilidad de que la bola sea blanca.
- [0,5 p.]** La probabilidad de que bola esté numerada con un número par.
- [0,5 p.]** La probabilidad de que bola esté numerada con un número par, sabiendo que es una bola blanca.
- [0,5 p.]** La probabilidad de que bola sea blanca y esté numerada con un número par.
- [0,5 p.]** La probabilidad de que bola sea blanca, sabiendo que está numerada con un número par

Nombramos y describimos los sucesos necesarios para calcular las probabilidades pedidas.

\bar{B} = Sacar bola blanca = {1 blanco, 2 blanco, 3 blanco, 4 blanco, 5 blanco}

\bar{B} = Sacar bola negra.

A = Sacar número par = {2 negro, 4 negro, 2 blanco, 4 blanco, 6 blanco}.

\bar{A} = Sacar impar = {1 negro, 3 negro, 5 negro, 1 blanco, 3 blanco, 5 blanco, 7 blanco}.

- a) Aplicamos la regla de Laplace.

$$P(B) = \frac{7 \text{ bolas blancas}}{12 \text{ bolas}} = \boxed{\frac{7}{12} \approx 0.583}$$

- b) Aplicamos la regla de Laplace.

$$P(A) = \frac{5 \text{ bolas con número par}}{12 \text{ bolas}} = \boxed{\frac{5}{12} \approx 0.417}$$

- c) Hemos reducido los casos posibles a sólo 7 bolas blancas numeradas del 1 al 7.

Aplicamos la regla de Laplace.

$$P(A/B) = \frac{\text{Nº de bolas blancas numeradas con un par}}{\text{Nº bolas blancas}} = \boxed{\frac{3}{7} \approx 0.429}$$

- d) Sólo hay 3 bolas blancas numeradas con un número par.

Aplicamos la regla de Laplace.

$$P(B \cap A) = \boxed{\frac{3}{12} = 0.25}$$

- e) A = Sacar número par = {2 negro, 4 negro, 2 blanco, 4 blanco, 6 blanco}

Si sabemos que es par, los casos posibles son solamente 5. De ellos favorables al suceso hay 3.

$$P(B/A) = \boxed{\frac{3}{5} = 0.6}$$

8: Juan es un estudiante bastante despistado y su tutora está cansada de que llegue tarde a clase. Él se defiende diciendo que no es para tanto y que la tutora le tiene manía. Ella le propone el siguiente trato: si en los próximos 9 días Juan llega tarde como mucho 2 días, la tutora le sube 1 punto en la nota final de la evaluación. Sabiendo que la probabilidad de que Juan llegue tarde a clase cada día es 0,45, determine:

- a) [1 p.] El tipo de distribución que sigue la variable aleatoria que cuenta el número de días que Juan llega tarde a clase en los próximos 9 días. ¿Cuáles son sus parámetros?
- b) [0,5 p.] ¿Cuál es la media y la desviación típica de esta distribución?
- c) [1 p.] ¿Cuál es la probabilidad de que Juan consiga la ansiada subida de 1 punto en la nota final?

a) $X =$ número de días que Juan llega tarde a clase en los próximos 9 días.
 X es una variable aleatoria binomial, pues la probabilidad de llegar tarde a clase es 0,45, independientemente del día y solo puede ocurrir dos cosas: que llegue tarde o no.
 Los parámetros son $n = 9$ que es el número de repeticiones y $p =$ probabilidad de llegar tarde un día a clase $= 0.45$.

$$X = B(9, 0.45)$$

b) La media es $n \cdot p = 9 \cdot 0.45 = 4.05$ veces.
 La desviación típica es $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{9 \cdot 0.45 \cdot 0.55} = 1.49$

c) Para conseguir la subida de 1 punto debe llegar tarde a clase ninguno, uno o dos días.

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \{\text{Mirando en la tabla de la binomial}\} = 0.0046 + 0.0339 + 0.1110 = \boxed{0.1495}$$

n	x	p											
		0,01	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	1/3	0,35	0,40	0,45	
2	0	0,9801	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4444	0,4225	0,3600	0,3225	0,0
	1	0,0198	0,0975	0,1800	0,2775	0,3600	0,4375	0,5100	0,5556	0,5775	0,6400	0,6775	0,0
3	0	0,9703	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2963	0,2746	0,2160	0,1664	0,0
	1	0,0294	0,1354	0,2430	0,3251	0,3840	0,4219	0,4410	0,4444	0,4436	0,4320	0,3884	0,0
4	0	0,9608	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1975	0,1785	0,1296	0,0915	0,0
	1	0,0388	0,1715	0,2916	0,3685	0,4096	0,4219	0,4116	0,3951	0,3845	0,3456	0,2995	0,0
5	0	0,9510	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1881	0,1317	0,1160	0,0778	0,0503	0,0
	1	0,0480	0,2036	0,3281	0,3915	0,4096	0,3956	0,3602	0,3292	0,3124	0,2592	0,1969	0,0
6	0	0,9415	0,7351	0,5314	0,3771	0,2821	0,1780	0,1178	0,0878	0,0754	0,0467	0,0277	0,0
	1	0,0571	0,2321	0,3543	0,3993	0,3932	0,3560	0,3025	0,2634	0,2437	0,1868	0,1269	0,0
7	0	0,9321	0,6983	0,4783	0,3206	0,2097	0,1335	0,0824	0,0585	0,0490	0,0280	0,0152	0,0
	1	0,0659	0,2573	0,3720	0,3980	0,3670	0,3115	0,2471	0,2048	0,1848	0,1308	0,0872	0,0
8	0	0,9227	0,6834	0,4305	0,2725	0,1878	0,1001	0,0578	0,0390	0,0319	0,0168	0,0084	0,0
	1	0,0746	0,2793	0,3826	0,3847	0,3355	0,2670	0,1977	0,1561	0,1373	0,0898	0,0548	0,0
9	0	0,9133	0,6532	0,3814	0,2210	0,1342	0,0741	0,0404	0,0250	0,0209	0,0104	0,0046	0,0
	1	0,0866	0,2967	0,3824	0,3530	0,2988	0,2259	0,1556	0,1173	0,1004	0,0589	0,0339	0,0
9	2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0
	3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0