

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima.

OPCIÓN A

1. (2,5 puntos)

- a) (1,5 puntos) Sean A y B matrices 2×2 . Determine dichas matrices sabiendo que verifican las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} A + 3B &= \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \\ 2A - B &= \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- b) (1 punto) Sean C y D las matrices:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Determine el determinante: $|5(CD)^{-1}|$, donde $(CD)^{-1}$ es la matriz inversa de (CD) .

SOLUCIÓN.

- a) Multiplicamos por 3 la segunda ecuación: $6A - 3B = \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$

Sumamos ahora ambas ecuaciones: $7A = \begin{pmatrix} -7 & 7 \\ 0 & -7 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Para calcular B , sustituimos A en la segunda ecuación y despejamos B :

$$B = 2A - \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

b) $CD = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

Calculemos la inversa de CD : $|CD| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$

$$CD = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Adjunta}} \text{Adj}(CD) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Traspuesta}} (\text{Adj}(CD))^t = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Inversa}} (CD)^{-1} = \frac{(\text{Adj}(CD))^t}{|CD|} = \begin{pmatrix} -1 & 3/2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Por tanto: $5(CD)^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 15/2 \\ 5 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow |5(CD)^{-1}| = \begin{vmatrix} -5 & 15/2 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} = 25 - \frac{75}{2} = -\frac{25}{2}$

2. (2,5 puntos)

- a) (1,5 puntos) Determine el valor o valores de m , si existen, para que la recta

$$r: \begin{cases} mx + y = 2 \\ x + mz = 3 \end{cases}$$

sea paralela al plano:

$$\pi: 2x - y - z + 6 = 0$$

- b) (1 punto) Determine la distancia del punto $P = (2, 1, 1)$ a la recta r cuando $m = 2$.

SOLUCIÓN.

- a) La recta será paralela al plano cuando un vector direccional de la recta sea perpendicular a un vector normal al plano.

Para obtener un vector direccional de la recta, obtengamos dos puntos de la misma:

$$\left| \begin{array}{l} \text{Para } z=0: \quad x=3, \quad y=2-3m \Rightarrow A(3, 2-3m, 0) \\ \text{Para } z=1: \quad x=3-m, \quad y=2-3m+m^2 \Rightarrow B(3-m, 2-3m+m^2, 1) \end{array} \right| \Rightarrow \overline{AB} = (-m, m^2, 1)$$

Un vector normal al plano es $\vec{n} = (2, -1, -1)$

$$r \parallel \pi \Leftrightarrow \overline{AB} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \overline{AB} \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow -2m - m^2 - 1 = 0 \Rightarrow m = \frac{2 \pm \sqrt{4-4}}{-2} = -1$$

b) Para $m = 2$, la recta r es $\begin{cases} 2x + y = 2 \\ x + 2z = 3 \end{cases}$ y un vector direccional de la misma es $\vec{u} = \overline{AB} = (-2, 4, 1)$.

Hallamos el plano π' perpendicular a r que pasa por P . Su vector normal es el direccional de la recta luego su ecuación es $-2x + 4y + z + D = 0$ y como contiene al punto P : $-4 + 4 + 1 + D = 0 \Rightarrow D = -1 \Rightarrow \pi' \equiv -2x + 4y + z - 1 = 0$.

El punto Q de intersección de la recta r y el plano π' (proyección de P sobre r):

$$\begin{cases} 2x + y = 2 \\ x + 2z = 3 \\ -2x + 4y + z = 1 \end{cases} \Rightarrow -2(3-2z) + 4[2-2(3-2z)] + z = 1 \Rightarrow -6 + 4z + 8 - 24 + 16z + z = 1 \Rightarrow 21z = 23 \Rightarrow z = \frac{23}{21} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = 3 - 2z = 3 - \frac{46}{21} = \frac{17}{21}, \quad y = 2 - 2x = 2 - \frac{34}{21} = \frac{8}{21} \Rightarrow Q\left(\frac{17}{21}, \frac{8}{21}, \frac{23}{21}\right)$$

La distancia entre el punto y la recta es la distancia entre los puntos P y Q :

$$d(P, r) = d(P, Q) = \sqrt{\left(2 - \frac{17}{21}\right)^2 + \left(1 - \frac{8}{21}\right)^2 + \left(1 - \frac{23}{21}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{25}{21}\right)^2 + \left(\frac{13}{21}\right)^2 + \left(\frac{-2}{21}\right)^2} = \sqrt{\frac{798}{441}} = \sqrt{\frac{38}{21}}$$

– Otra forma –

Un punto de la recta es $A(3, -4, 0)$ y su vector direccional $\vec{u} = (-2, 4, 1)$. Además, el vector $\overline{AP} = (-1, 5, 1)$.

$$\text{Se tiene: } d(P, r) = \frac{|\overline{AP} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|} = \frac{\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 5 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \end{vmatrix}}{\sqrt{4+16+1}} = \frac{|5\vec{i} - 2\vec{j} - 4\vec{k} + 10\vec{k} + \vec{j} - 4\vec{i}|}{\sqrt{21}} = \frac{|(1, -1, 6)|}{\sqrt{21}} = \frac{\sqrt{1+1+36}}{\sqrt{21}} = \sqrt{\frac{38}{21}}$$

3. (2,5 puntos) Considere la función:

$$f(x) = \frac{x^2}{2x-6}$$

a) (1,25 puntos) Determine el dominio y las asíntotas, si existen, de esa función.

b) (1,25 puntos) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos relativos, si existen, de esa función.

SOLUCIÓN.


a) • Por tratarse de una función racional: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{3\}$

• Asíntotas verticales: $x = 3$ pues $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2}{2x-6} = \infty$. Además: $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2}{2x-6} = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2}{2x-6} = +\infty$

• Asíntota oblicua: $f(x) = \frac{x^2}{2x-6} = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} + \frac{9}{2x-6} \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ es una asíntota oblicua de la función.

Además, la posición de la gráfica respecto a la asíntota:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{9}{2x-6} = 0^- \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9}{2x-6} = 0^+$$



$\begin{array}{r} x^2 \\ -x^2 + 3x \\ \hline 3x \\ -3x + 9 \\ \hline 9 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2x-6 \\ \hline \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \end{array}$
---	--

$$b) f'(x) = \frac{2x(2x-6) - 2x^2}{(2x-6)^2} = \frac{2x(2x-6-x)}{(2x-6)^2} = \frac{2x(x-6)}{(2x-6)^2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=6 \end{cases}$$

Se tiene:

$$\begin{array}{ccccccc} f' > 0 & & f' < 0 & & f' < 0 & & f' > 0 \\ \hline & 0 & & 3 & & 6 & \end{array}$$

Luego la función es creciente en $(-\infty, 0) \cup (6, +\infty)$ y decreciente en $(0, 6) - \{3\}$

• La función sólo es discontinua en $x=3$. En $x=0$ la función tiene un máximo relativo puesto que pasa de creciente a decreciente y en $x=6$ tiene un mínimo relativo puesto que pasa de decreciente a creciente.

4. (2,5 puntos)

a) (1,25 puntos) La derivada de una función $f(x)$ es:

$$(x-1)^3(x-3)$$

Determine la función $f(x)$ sabiendo que $f(0) = 1$.

b) (1,25 puntos) Determine el límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 + 2x + 2}{x^3 + 1} \right)^{3x^2 + x + 1}$$

SOLUCIÓN.

$$a) f(x) = \int (x-1)^3(x-3) dx = \int (x-1)^3(x-3) dx \quad | \quad x-1=t \Rightarrow x-3=t-2, \quad dx=dt \quad | \quad = \int t^3(t-2) dt = \int (t^4 - 2t^3) dt = \frac{t^5}{5} - 2 \frac{t^4}{4} + C =$$

$$= \frac{1}{5}(x-1)^5 - \frac{1}{2}(x-1)^4 + C \quad \text{y como } f(0)=1: \quad -\frac{1}{5} - \frac{1}{2} + C = 1 \Rightarrow C = 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{17}{10}$$

$$\text{Por tanto: } f(x) = \frac{1}{5}(x-1)^5 - \frac{1}{2}(x-1)^4 + \frac{17}{10}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 + 2x + 2}{x^3 + 1} \right)^{3x^2 + x + 1} = 1^\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2x+1}{x^3+1} \right)^{3x^2+x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x^3+1}{2x+1}} \right)^{\frac{(3x^2+x+1) \cdot \frac{x^3+1}{2x+1} \cdot \frac{2x+1}{x^3+1}}{1}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x^3+1}{2x+1}} \right)^{\frac{x^3+1}{2x+1}} \right]^{\frac{6x^3+5x^2+3x+1}{x^3+1}} = e^6$$

– Otra forma –

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 + 2x + 2}{x^3 + 1} \right)^{3x^2 + x + 1} = 1^\infty = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 + 2x + 2}{x^3 + 1} - 1 \right) \cdot (3x^2 + x + 1)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 + 2x + 2 - x^3 - 1}{x^3 + 1} \right) \cdot (3x^2 + x + 1)} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+1}{x^3+1} \right) \cdot (3x^2+x+1)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{6x^3+5x^2+3x+1}{x^3+1} \right)} = e^6$$

OPCIÓN B

1. (2,5 puntos) Determine para qué valores de a el sistema que aparece a continuación es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.

$$\begin{aligned}ax - 3y + 6z &= 3 \\ax + 3y + az &= 6 \\-ax - 6y + 9z &= 0\end{aligned}$$

SOLUCIÓN.

Las matrices de los coeficientes, A, y ampliada, B, son:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & -3 & 6 & 3 \\ a & 3 & a & 6 \\ -a & -6 & 9 & 0 \end{array} \right)$$

El sistema es compatible determinado cuando $\text{rg } A = \text{rg } B = 3$, es compatible indeterminado cuando $\text{rg } A = \text{rg } B < 3$ y es incompatible cuando $\text{rg } A \neq \text{rg } B$.

Estudiemos el rango de las matrices según los posibles valores del parámetro a :

$$\begin{vmatrix} a & -3 & 6 \\ a & 3 & a \\ -a & -6 & 9 \end{vmatrix} = 27a - 36a + 3a^2 + 18a + 27a + 6a^2 = 9a^2 + 36a = 0 \Rightarrow 9a(a+4) = 0 \Rightarrow a = 0, a = -4$$

- Si $a \neq -4$ y $a \neq 0$: $\text{rg } A = \text{rg } B = 3 \Rightarrow$ el sistema es compatible determinado.

- Si $a = -4$ las matrices A y B son ahora:
- $$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & -3 & 6 & 3 \\ -4 & 3 & -4 & 6 \\ 4 & -6 & 9 & 0 \end{array} \right)$$

El menor $\begin{vmatrix} -4 & -3 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = -12 - 12 = -24 \neq 0 \Rightarrow \text{rg } A = 2$

Orlamos el menor con los términos independientes: $\begin{vmatrix} -4 & -3 & 3 \\ -4 & 3 & 6 \\ 4 & -6 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 72 - 72 - 36 - 0 - 144 \neq 0 \Rightarrow \text{rg } B = 3$

Luego para $a = -4$ el sistema es incompatible.

- Si $a = 0$ las matrices de los coeficientes y ampliada son ahora:
- $$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 6 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & -6 & 9 & 0 \end{array} \right)$$

El menor de la matriz de los coeficientes $\begin{vmatrix} -3 & 6 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -18 \neq 0 \Rightarrow \text{rg } A = 2$

Orlamos el menor con los términos independientes: $\begin{vmatrix} -3 & 6 & 3 \\ 3 & 0 & 6 \\ -6 & 9 & 0 \end{vmatrix} = 81 - 216 + 162 = 27 \neq 0 \Rightarrow \text{rg } B = 3$

Luego para $a = 0$ el sistema es también incompatible.

- El sistema no es compatible indeterminado para ningún valor del parámetro.

2. (2,5 puntos)

a) (1,5 puntos) Estudie la posición relativa de los planos:

$$\pi : x - y - z = 0$$

$$\pi' : \begin{cases} x = 3 + 2\lambda - \mu \\ y = 1 + \lambda + \mu \\ z = \mu \end{cases}$$

b) (1 punto) Determine la ecuación de la recta perpendicular a π que pasa por el punto $P = (1, 0, 1)$.
Escriba la ecuación de la recta como intersección de dos planos.

SOLUCIÓN.

a) Los planos pueden ser secantes, paralelos o coincidentes.

$\vec{n} = (1, -1, -1)$ es un vector normal al plano π . $A(3, 1, 0)$ es un punto y $\vec{u} = (2, 1, 0)$, $\vec{v} = (-1, 1, 1)$ dos vectores de π' . Puesto que $\vec{n} \cdot \vec{u} = 2 - 1 + 0 = 1 \neq 0$ descartamos la posibilidad de que coincidan o sean paralelos. Los planos se cortan.

b) El vector $\vec{n} = (1, -1, -1)$ perpendicular al plano π es un vector direccional de cualquier recta perpendicular al plano. Como la recta que buscamos debe pasar por el punto $P(1, 0, 1)$, la ecuación (en forma continua) es:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-1} \Leftrightarrow \text{Y como intersección de planos: } \begin{cases} \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} \\ \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y-1=0 \\ y-z+1=0 \end{cases}$$

3. (2,5 puntos)

a) (1,25 puntos) Considere la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 2 \\ 2x + a & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ -x^2 + 3x + b & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

Determine los valores de a y b para que la función sea continua.

b) (1,25 puntos) Supongamos ahora que $a = 0$. Usando la definición de derivada, estudie la derivabilidad de $f(x)$ en $x = 2$.

SOLUCIÓN.

a) Puesto que los tres trozos en que está definida la función corresponden a funciones continuas (polinómicas), debemos exigir que $f(x)$ sea continua en $x = 2$ y en $x = 4$.

Debe ser: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x + a) \Leftrightarrow 4 = 4 + a \Rightarrow a = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 4^-} (2x + 0) = \lim_{x \rightarrow 4^+} (-x^2 + 3x + b) \Leftrightarrow 8 = -16 + 12 + b \Rightarrow b = 12 \end{cases}$

b) La función es derivable en $x = 2$ si $f'(2^-) = f'(2^+)$.

$$\left. \begin{aligned} f'(2^-) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{4h + h^2}{h} = 4 \\ f'(2^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2(2+h) - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{4 + 2h - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h} = 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{No es derivable.}$$

4. (2,5 puntos)

a) (1,25 puntos) Dadas las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = -x^2 + 2$, determine el área encerrada entre ambas funciones.

b) (1,25 puntos) Calcule la integral:

$$\int_2^3 \frac{x^3}{x^2 - 2x + 1} dx$$

SOLUCIÓN.

a) Definimos la función diferencia de ambas funciones: $d(x) = x^2 + x^2 - 2 = 2x^2 - 2$

Los puntos de corte de esta función con OX son: $2x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = -1, x = 1$

Tenemos: $A = \left| \int_{-1}^1 (2x^2 - 2) dx \right| = \left| \left[\frac{2x^3}{3} - 2x \right]_{-1}^1 \right| = \left| \left(\frac{2}{3} - 2 \right) - \left(-\frac{2}{3} + 2 \right) \right| = \left| \frac{2}{3} - 2 + \frac{2}{3} - 2 \right| = \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{8}{3} u^2$

b) Calculemos una primitiva de la función:

$\begin{array}{r} x^3 \\ -x^3 + 2x^2 - x \\ \hline 2x^2 - x \\ -2x^2 + 4x - 2 \\ \hline 3x - 2 \end{array}$	$\begin{array}{l} x^2 - 2x + 1 \\ x + 2 \end{array}$
---	--

$$\int \frac{x^3}{x^2 - 2x + 1} dx = \int \left(x + 2 + \frac{3x - 2}{x^2 - 2x + 1} \right) dx = \frac{1}{2} x^2 + 2x + \int \frac{3x - 2}{x^2 - 2x + 1} dx$$

Calculemos la nueva integral:

$$\frac{3x - 2}{x^2 - 2x + 1} = \frac{3x - 2}{(x - 1)^2} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} = \frac{Ax - A + B}{(x - 1)^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = 3 \\ -A + B = -2 \end{cases} \Rightarrow B = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int \frac{3x - 2}{x^2 - 2x + 1} dx = \int \frac{3}{x - 1} dx + \int \frac{1}{(x - 1)^2} dx = 3 \ln(x - 1) - \frac{1}{x - 1}$$

Así pues la integral inicial es $\int \frac{x^3}{x^2 - 2x + 1} dx = \frac{1}{2} x^2 + 2x + 3 \ln(x - 1) - \frac{1}{x - 1}$ y tenemos:

$$\int_2^3 \frac{x^3}{x^2 - 2x + 1} = \left[\frac{x^2}{2} + 2x + 3 \ln(x - 1) - \frac{1}{x - 1} \right]_2^3 = \left(\frac{9}{2} + 6 + 3 \ln 2 - \frac{1}{2} \right) - \left(2 + 4 + 0 - 1 \right) = 5 + \ln 8$$