

OPCIÓN A

CUESTIÓN 1.- Responde, razonando la respuesta, a las siguientes cuestiones que se plantean indicando si son verdaderas o falsas:

- Los valores (3,2,2,+1/2) representan a un electrón situado en un orbital 3d.
- A lo largo de un período las propiedades químicas de los elementos son semejantes.
- La energía de ionización en un período aumenta de izquierda a derecha.
- Los elementos de un mismo grupo presentan propiedades químicas muy similares pero no iguales, debido a que su configuración electrónica externa varía muy poco de unos a otros.

CUESTIÓN 2.- Se tiene el siguiente equilibrio:

$\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$, y se sabe que el valor de K_c a 900 °C vale 0,003, mientras que a 1200 °C vale 0,2. Responde de forma razonada a las siguientes cuestiones:


- ¿Cuál es la temperatura más adecuada para favorecer la producción de CO_2 ?
- ¿Cómo afectaría a la reacción un aumento de la presión?
- Si se elimina H_2 a medida que se va formando, ¿hacia donde se desplaza el equilibrio?
- Dado que al aumentar la temperatura la reacción se desplaza hacia la formación de CO_2 , ¿la reacción será exotérmica o endotérmica?

CUESTIÓN 3.- a) Formula las siguientes especies químicas:

Fosfina; Óxido de nitrógeno (II); Ácido perbrómico; Dihidrogenofosfato (V) de hierro (III); 4-metil-2-hexino; Fenol; 4-etilhexanal; Ácido 4-cloropentanoico.

b) Nombra las siguientes especies químicas:

$\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$; MgCl_2 ; H_2CO_3 ; Li_2O_2 ; $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CHBr-CH}_3$;
 $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-NH}_2$; $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COO-CH}_2\text{-CH}_3$; $\text{HOOC-CH}_2\text{-COOH}$;



PROBLEMA 1.- Sabiendo que los calores de formación estándar a 298 K del butano, C_4H_{10} , dióxido de carbono y agua, son $-125 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $-393 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ y $-242 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, respectivamente, calcula:

- La entalpía de combustión del butano haciendo uso de la ley de Hess.
- La variación de energía interna que acompaña al proceso.

DATOS: $R = 8,413 \cdot 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Resultado: a) $\Delta H_c = -2657 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; b) $\Delta U = -2648,23 \text{ kJ}$.

PROBLEMA 2.- En 500 mL de agua se disuelven 5 g de ácido acético, CH_3COOH . Sabiendo que su $K_a = 1,8 \cdot 10^{-5}$, calcula:

- El pH de la disolución.
- El grado de disociación, α .

DATOS: $A_r(\text{C}) = 12 \text{ u}$; $A_r(\text{O}) = 16 \text{ u}$; $A_r(\text{H}) = 1 \text{ u}$.

Resultado: a) $\text{pH} = 2,76$; b) $1,036 \%$.

OPCIÓN B

CUESTIÓN 1.- Responde a las siguientes cuestiones:

- Explica razonadamente como variará con la temperatura la espontaneidad de una reacción en la que $\Delta H < 0$ y $\Delta S > 0$, suponiendo que ambas magnitudes no varían con la temperatura.
- Explica en que consiste el Efecto Invernadero.

CUESTIÓN 2.- Di, justificando razonadamente la respuesta, si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- El amoníaco es una base de Arrhenius.
- Aunque una disolución de un ácido sea muy fuerte siempre habrá iones OH^- .
- Si se mezclan volúmenes iguales de HCl y NaOH con concentraciones iguales, el pH de la disolución resultante es ácido.
- El HSO_4^- es una especie química que se comporta como un anfótero.

CUESTIÓN 3.- a) Formula las siguientes especies químicas:

Sulfuro de estroncio; Cloruro de cromo (III); Hidróxido de plomo (IV); Yodato de cobre (II);
3-bromo-2-cloro-2-hexeno; 2,3-dimetil-penten-1-ol; 3-metilpentanamida; Etilpropiléter.


b) Nombra las siguientes especies químicas:

PCl_5 ; NiH_3 ; N_2O_5 ; NaHSO_4 ; $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$;
 $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$; $\text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$; $\text{CH}_3-\text{CHOH}-\text{CH}_2-\text{COOH}$.

CUESTIÓN 4.- Ajustar por el método del ión-electrón, la siguiente reacción, indicando:

a) ¿Cuál es la especie oxidante y cuál la reductora? ¿Qué especie se oxida y cuál se reduce?

b) Escribir las semirreacciones de oxido-reducción. La reacción global.



PROBLEMA 1.- En un recipiente de 5 L se introduce 1 mol de SO_2 y 1 mol de O_2 y se calienta a 1000°

C, estableciéndose el equilibrio: $2 \text{SO}_2 (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{SO}_3 (\text{g})$.

Una vez que se ha alcanzado el equilibrio se encuentran 0,15 moles de SO_2 . Se pide:

a) Composición de la mezcla en el equilibrio.

b) El valor de K_c y K_p .

DATOS: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Resultado: a) $\text{SO}_2 = 0,15$ moles; $\text{O}_2 = 0,575$ moles; $\text{SO}_3 = 0,85$ moles; b) $K_c = 279,23 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$;
 $K_p = 2,67 \text{ atm}$.

OPCIÓN A

CUESTIÓN 1.- Responde, razonando la respuesta, a las siguientes cuestiones que se plantean indicando si son verdaderas o falsas:

- Los valores (3, 2, 2, +1/2) representan a un electrón situado en un orbital 3d.
- A lo largo de un período las propiedades químicas de los elementos son semejantes.
- La energía de ionización en un período aumenta de izquierda a derecha.
- Los elementos de un mismo grupo presentan propiedades químicas muy similares pero no iguales, debido a que su configuración electrónica externa varía muy poco de unos a otros.

Solución:

a) Verdadera. El valor 3 corresponde al número cuántico principal n , que indica el nivel energético en el que se encuentra el electrón. El primer 2 es el del número cuántico secundario l , que corresponde al subnivel u orbital d. El siguiente valor 2 es uno de los cinco valores que puede tomar el número cuántico magnético m_l (-2, -1, 0, +1, +2), y +1/2 es uno de los valores del número cuántico de espín m_s (+1/2 y -1/2). Estos valores son los que representan a un electrón 3d.

b) Falso. A lo largo de un período las propiedades periódicas varían de un elemento a otro, por aumentar la carga nuclear e incrementarse en un electrón (electrón diferenciador), respecto al elemento anterior, el nivel energético que se está completando. Esta diferencia en la configuración electrónica de un átomo de un elemento, respecto a la del átomo siguiente o anterior de otro elemento, es la responsable de la diferencia de las propiedades químicas de los elementos a lo largo de un período.

c) Verdadera. Como al avanzar en un período aumenta la carga nuclear y los electrones se van situando en el mismo nivel energético, se incrementa la fuerza nuclear atractiva sobre el electrón más externo aumentando, por tanto, la energía de ionización al avanzar en un período.

d) Falso. La semejanza de propiedades químicas de los elementos de un mismo grupo, se debe a que todos tienen la misma configuración electrónica en su capa de valencia.

CUESTIÓN 2.- Se tiene el siguiente equilibrio: $H_2O(g) + CO(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$, y se sabe que el valor de K_c a 900 °C vale 0,003, mientras que a 1200 °C vale 0,2. Responde de forma razonada a las siguientes cuestiones:

- ¿Cuál es la temperatura más adecuada para favorecer la producción de CO_2 ?
- ¿Cómo afectaría a la reacción un aumento de la presión?
- Si se elimina H_2 a medida que se va formando, ¿hacia donde se desplaza el equilibrio?
- Dado que al aumentar la temperatura la reacción se desplaza hacia la formación de CO_2 , ¿la reacción será exotérmica o endotérmica?

Solución:

a) La expresión de la constante K_c para el equilibrio propuesto es:
$$K_c = \frac{[CO_2] \cdot [H_2]}{[H_2O] \cdot [CO]}$$

De los valores dados se observa que a 1200 °C, el valor de K_c es mayor que a 900 °C, es decir, el numerador de la expresión es mayor a la temperatura más alta, lo que demuestra que es mayor la concentración de CO_2 , luego, la temperatura más adecuada para favorecer la producción de CO_2 es la de 1200 °C.

b) Si se modifica un factor externo de un sistema en equilibrio, éste se desplaza en el sentido que tienda a corregir la alteración producida. Principio de Le Chatelier.

Al modificar la presión, aumentándola, se produce una disminución del volumen del reactor, ley de Boyle-Mariotte, y ante esta disminución del volumen del reactor, el sistema se desplaza en el sentido en el que aparece un menor número de moles hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Ahora bien, como en ambos miembros de la ecuación química existe el mismo número de moles, el sistema no sufre alteración alguna y permanece inalterable.

c) Al ir retirando H_2 del medio de reacción disminuye su concentración, contrarrestando este efecto el sistema consumiendo agua y monóxido de carbono para producir más dióxido de carbono e hidrógeno hasta alcanzar un nuevo equilibrio; es decir, el sistema se desplaza hacia la derecha.

d) Si se aumenta la temperatura (se cede calor) a un sistema en equilibrio, éste tiende a absorber el calor suministrado para restablecer el equilibrio, por lo que se desplazará en el sentido endotérmico. Ahora bien, como en el caso propuesto aumenta la producción de CO_2 con la temperatura, la reacción propuesta, tal cual está escrita, es endotérmica.

PROBLEMA 1.- Sabiendo que los calores de formación estándar a 298 K del butano, dióxido de carbono y agua, son $-125 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $-393 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ y $-242 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, respectivamente, calcula:

a) La entalpía de combustión del butano haciendo uso de la ley de Hess.

b) La variación de energía interna que acompaña al proceso.


DATOS: $R = 8,413 \cdot 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Solución:

a) Las ecuaciones correspondientes a la formación del butano, dióxido de carbono y agua son:



Invertiendo la ecuación de formación del butano, cambiando el signo a la entalpía, multiplicando por 4 la ecuación de formación del dióxido de carbono, incluida la entalpía, y por 5 la de formación del agua, incluida también la entalpía, para así igualar los átomos de carbono e hidrógeno en las tres ecuaciones y sumándolas, se obtiene la ecuación de combustión del butano y el valor de su entalpía:



b) La energía interna se encuentra relacionada con la entalpía de combustión y trabajo por la expresión: $\Delta U = \Delta H + W$, y como $W = -P \cdot \Delta V = -\Delta n \cdot R \cdot T$, se deduce que: $\Delta U = \Delta H - \Delta n \cdot R \cdot T$.

La variación en el número de moles de la reacción es: $\Delta n = 4 - \left(\frac{13}{2} + 1\right) = -3,5$, y sustituyendo valores en la expresión anterior resulta para la variación de energía interna:

$$\Delta U = -2657 \text{ kJ} + 3,5 \text{ moles} \cdot 8,413 \cdot 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298 \text{ K} = -2648,23 \text{ kJ}.$$

Resultado: a) $\Delta H_c = -2657 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; b) $\Delta U = -2648,23 \text{ kJ}$.

OPCIÓN B

CUESTIÓN 1.- Responde a las siguientes cuestiones:

a) Explica razonadamente como variará con la temperatura la espontaneidad de una reacción en la que $\Delta H < 0$ y $\Delta S > 0$, suponiendo que ambas magnitudes no varían con la temperatura.

b) Explica en que consiste el Efecto Invernadero.

Solución:

a) La espontaneidad de una reacción viene dada por la expresión: $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S < 0$.

Si $\Delta H < 0$ y $\Delta S > 0$, la reacción es espontánea para cualquier temperatura, pues al restar el producto $T \cdot \Delta S$, positivo, a ΔH , negativo, siempre produce una diferencia negativa, es decir, $\Delta G < 0$.

$$K_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \cdot [O_2]} = \frac{0,17^2 \text{ M}^2}{0,03^2 \text{ M}^2 \cdot 0,115 \text{ M}} = 279,23 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}; \text{ y de la relación } K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n}, \text{ siendo}$$

$$\Delta n = 2 - 3 = -1, \text{ resulta para } K_p: \quad K_p = \frac{279,23 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}}{0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 1273 \text{ K}} = 2,67 \text{ atm}^{-1}.$$

Resultado: a) moles: SO₂ = 0,15, O₂ = 0,575 y SO₃ = 0,85; b) K_c = 279,23 L · mol⁻¹; K_p = 2,67 atm.

www.yoquieroaprobar.es