

Problemas [6 Ptos]

1. Se lanza horizontalmente un objeto de 500 g con una velocidad de 18,0 m/s sobre una superficie horizontal y se detiene tras recorrer 5,60 m. Calcula:
 - a) El tiempo que tarda en pararse. [1 Pto.]
 - b) La fuerza de rozamiento entre el objeto y la superficie. [1 Pto.]

Solución

2. Un ascensor de 525 kg en arranca desde el sexto piso bajando con una aceleración de $2,16 \text{ m/s}^2$ durante 0,75 s, sigue bajando con velocidad constante durante 8,25 s y finalmente frena en 0,50 s. La fuerza de rozamiento en todo el movimiento vale 750 N.
 - a) ¿Cuál es la velocidad constante con la que baja? [$\frac{1}{2}$ Pto.]
 - b) ¿Cuánto vale la tensión del cable del ascensor en cada tramo? [$1\frac{1}{2}$ Pto.]
 - c) ¿Qué distancia ha recorrido el ascensor? ¿En qué piso se ha detenido? [1 Pto.]

Solución

3. Calcula la fuerza de atracción entre Júpiter y el más próximo de sus satélites. [1 Pto.]

Solución

Cuestiones [4 Ptos]

1.
 - a) Enuncia la 1ª ley de Newton o principio de inercia.
 - b) Supón que despiertas en un vagón de un tren y las ventanillas están cegadas de forma que no puedes observar el exterior. ¿Qué medida o experiencia puedes realizar para determinar si el tren se mueve con velocidad constante o está en reposo?
2.
 - a) Enuncia la 2ª ley de Newton o ley fundamental.
 - b) Varios objetos de distintas masas se someten a la misma fuerza. ¿Qué relación existe entre las aceleraciones y las masas?
3.
 - a) Enuncia la 3ª ley de Newton o principio de acción y reacción.
 - b) Estás sobre unos patines cerca a una pared y empujas la pared. ¿Por qué te pones en movimiento?
4.
 - a) Enuncia la ley de Newton de la gravitación universal.
 - b) Jordi y Nuria se sienten atraídos gravitatoriamente por una fuerza de $20 \mu\text{N}$ cuando se encuentran a 10 cm el uno de la otra. ¿Cuántas veces mayor o menor será la atracción gravitatoria si la distancia se hace 10 veces mayor?

Solución

Datos: Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Constante de la gravitación universal: $G = 6,6742 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$

Masa de Júpiter $m_J = 1,899 \times 10^{27} \text{ kg}$

Datos de los satélites (m : masa del satélite, d : distancia del centro del satélite al centro de Júpiter)

Satélite	Ío	Europa	Ganímedes	Calisto
$m \text{ (kg)}$	$8,9 \times 10^{22}$	$4,8 \times 10^{22}$	$1,5 \times 10^{23}$	$1,1 \times 10^{23}$
$d \text{ (km)}$	421 800	671 100	1 070 400	1 882 700

Soluciones

1. Se lanza horizontalmente un objeto de 500 g con una velocidad de 18,0 m/s sobre una superficie horizontal y se detiene tras recorrer 5,60 m. Calcula:
- El tiempo que tarda en pararse.
 - La fuerza de rozamiento entre el objeto y la superficie.

[Examen](#)

[Siguiendo](#)

Solución:

Datos:

Masa del objeto: $m = 500 \text{ g} = 0,500 \text{ kg}$
Velocidad inicial: $v_0 = 18,0 \text{ m/s}$
Velocidad final: $v = 0 \text{ m/s}$
Desplazamiento: $\Delta x = 5,60 \text{ m}$

Ecuaciones:

MRUA velocidad $v = v_0 + a \Delta t$
MRUA desplazamiento $\Delta x = v_0 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2$
2ª ley de Newton $F_{\text{RES}} = m \cdot a$

Cálculos:

$$0 = 18,0 + a \cdot \Delta t$$

$$5,60 = 18,0 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2$$

Despejando la aceleración en la primera ecuación:

$$a = \frac{-18,0}{\Delta t}$$

y sustituyendo en la segunda

$$5,60 = 18,0 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a \cdot \Delta t^2 = 18,0 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \frac{(-18,0)}{\Delta t} \Delta t^2 = 18,0 \cdot \Delta t + \frac{(-18,0)}{2} \cdot \Delta t = 9,00 \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{5,60 \text{ m}}{9,00 \text{ m/s}} = 0,622 \text{ s}$$

Las fuerzas peso y normal se anulan, por lo que la fuerza resultante es la fuerza de rozamiento.

$$a = \frac{-18,0}{\Delta t} = \frac{-18,0 \text{ m/s}}{0,622 \text{ s}} = -28,9 \text{ m/s}^2$$

$$F_{\text{roz}} = F_{\text{RES}} = m \cdot a = 0,500 \text{ kg} \cdot (-28,9 \text{ m/s}^2) = -14,5 \text{ N}$$

2. Un ascensor de 525 kg en el sexto piso arranca bajando con una aceleración de 2,16 m/s² durante 0,75 s, sigue bajando con velocidad constante durante 8,75 s y finalmente frena en 0,50 s. La fuerza de rozamiento en todo el movimiento vale 750 N.
- ¿Cuál es la velocidad constante con la que baja?
 - ¿Cuánto vale la tensión del cable del ascensor en cada tramo?
 - ¿Qué distancia ha recorrido el ascensor? ¿En qué piso se ha detenido?

[Anterior](#)

[Examen](#)

[Siguiendo](#)

Solución:

Datos:

Masa del ascensor: $m = 525 \text{ kg}$
 Velocidad inicial: $v_0 = 0 \text{ m/s}$
 Aceleración arranque: $a_1 = 2,16 \text{ m/s}^2$
 Tiempo arranque: $\Delta t_1 = 0,75 \text{ s}$
 Tiempo v. cte.: $\Delta t_2 = 8,25 \text{ s}$
 Tiempo frenado: $\Delta t_3 = 0,50 \text{ s}$
 Fuerza rozamiento: $F_{\text{roz}} = 750 \text{ N}$
 Aceleración gravedad: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Ecuaciones:

MRUA velocidad $v = v_0 + a \Delta t$
 MRUA desplazamiento $\Delta x = v_0 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2$
 2ª ley de Newton $F_{\text{RES}} = m \cdot a$
 Peso: $P = m \cdot g$

Cálculos:

a) La velocidad constante del 2º tramo es igual a la velocidad final del 1º tramo:

$$v_2 = v_1 = v_0 + a_1 \Delta t_1 = 0 + 2,16 \text{ m/s}^2 \cdot 0,75 \text{ s} = 1,62 \text{ m/s}$$

b) Peso del ascensor: $P = m \cdot g = 525 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 5,15 \times 10^3 \text{ N}$

1º tramo: cuando arranca (baja acelerando)

Fuerza resultante (1): $F_{\text{RES}1} = m \cdot a_1 = 525 \text{ kg} \cdot 2,16 \text{ m/s}^2 = 1,13 \times 10^3 \text{ N}$

A la vista del esquema, la fuerza positiva es el peso y la tensión del cable y el rozamiento son negativas:

$$P - T - F_{\text{roz}} = F_{\text{RES}}$$

$$T_1 = P - F_{\text{roz}} - F_{\text{RES}1} = 5,15 \times 10^3 - 750 - 1,13 \times 10^3 = 3,27 \times 10^3 \text{ N}$$

2º tramo: cuando baja con velocidad constante ($a_2 = 0$):

Fuerza resultante (2): $F_{\text{RES}2} = m \cdot a_2 = 0 \text{ N}$

Las direcciones y los sentidos de las fuerzas son los mismos que en el tramo anterior, solo cambia el valor de la tensión del cable:

$$T_2 = P - F_{\text{roz}} - F_{\text{RES}2} = 5,15 \times 10^3 - 750 = 4,40 \times 10^3 \text{ N}$$

3º tramo: cuando baja frenando:

La velocidad inicial de este 3º tramo es igual a la velocidad final del 1º tramo:

$$v_{03} = v_1 = 1,62 \text{ m/s}$$

$$a_3 = \frac{v_3 - v_{03}}{\Delta t} = \frac{(0 - 1,62) \text{ m/s}}{0,50 \text{ s}} = -3,2 \text{ m/s}^2$$



Fuerza resultante (3): $F_{\text{RES}3} = m \cdot a_3 = 525 \text{ kg} \cdot (-3,2 \text{ m/s}^2) = -1,7 \times 10^3 \text{ N}$

$$T_3 = P - F_{\text{roz}} - F_{\text{RES}3} = 5,15 \times 10^3 - 750 - (-1,7 \times 10^3) = 6,1 \times 10^3 \text{ N}$$

c) Si se representa la velocidad en función del tiempo, la gráfica es un trapecio de bases 9,5 y 8,25 s y de altura 1,62 m/s. El desplazamiento es el área de ese trapecio.

$$\Delta x = \frac{B+b}{2} \cdot h = \frac{9,5+8,25}{2} \cdot 1,62 = 14,4 \text{ m}$$

Suponiendo una altura de unos 3 m por cada piso, el ascensor ha bajado:



$$\frac{14,4 \text{ m}}{3 \text{ m/piso}} = 4,8 \approx 5 \text{ pisos}$$

Habr  bajado 5 pisos y se encontrar  en el 1 .

3. Calcula la fuerza de atracci n entre J piter y el m s pr ximo de sus sat lites.

[Anterior](#)

[Examen](#)

[Cuestiones](#)

Soluci n:

Datos:

Constante de la gravitaci n universal: $G = 6,6742 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$

Masa de J piter: $M = 1,899 \times 10^{27} \text{ kg}$

Masa de  o: $m = 8,9 \times 10^{22} \text{ kg}$

Distancia de J piter a  o: $d = 421 \text{ 800 km} = 4,218 \times 10^8 \text{ m}$

Ecuaciones:

Ley de Newton de la gravitaci n universal: $F = G \frac{M \cdot m}{d^2}$

C culos:

Fuerza de atracci n entre J piter e  o:

$$F = G \frac{M \cdot m}{d^2} = 6,6742 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2} \cdot \frac{1,899 \times 10^{27} \text{ kg} \cdot 8,9 \times 10^{22} \text{ kg}}{(4,218 \times 10^8 \text{ m})^2} = 6,3 \times 10^{22} \text{ N}$$

Cuestiones

1. a) Enuncia la 1  ley de Newton o principio de inercia.

b) Sup n que despiertas en un vag n de un tren y las ventanillas est n cegadas de forma que no puedes observar el exterior.  Qu  medida o experiencia puedes realizar para determinar si el tren se mueve con velocidad constante o est  en reposo?

Ninguna. El principio de relatividad de Galileo dice que ninguna experiencia permite distinguir entre un sistema en reposo y otro que se desplaza con movimiento rectil neo uniforme.

2. a) Enuncia la 2  ley de Newton o ley fundamental.

b) Varios objetos de distintas masas se someten a la misma fuerza.  Qu  relaci n existe entre las aceleraciones y las masas?

Como la fuerza es la misma, son inversamente proporcionales: $F = m \cdot a = \text{constante}$. A mayor masa, menor aceleraci n.

3. a) Enuncia la 3  ley de Newton o principio de acci n y reacci n.

b) Est s sobre unos patines cerca a una pared y empujas la pared.  Por qu  te pones en movimiento?

Por el principio de acci n y reacci n. La pared hace sobre ti una fuerza del mismo valor y direcci n y de sentido contrario: te «empuja».

4. a) Enuncia la ley de Newton de la gravitaci n universal.

b) Jordi y Nuria se sienten atra dos gravitatoriamente por una fuerza de $20 \mu\text{N}$ cuando se encuentran a 10 cm el uno de la otra.  Cu ntas veces mayor o menor ser  la atracci n gravitatoria si la distancia se hace 10 veces mayor?

Se hace $10^2 = 100$ veces menor.