

1.- (4 puntos) Calcula los siguientes límites:

a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2+3x}{3x-5} \right)^{\frac{2x-1}{3}} =$

b)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{3-x}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 - x - 3}{2x^2 - 2}$

d)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x}$

2.- (3 puntos) Calcula las asíntotas de las funciones y su posición respecto a la función

a)  $f(x) = \frac{4x^2}{3x^2 - 27}$

b)  $g(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}}$

3.- (3 puntos)

a) Calcula el valor de  $a$  y  $b$  para que  $f(x)$  sea continua en todo  $\mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} -2x - a & \text{si } x \leq 0 \\ x - 1 & \text{si } 0 < x < 2 \\ bx - 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

b) Para  $b = -2$  estudia la continuidad de la función en  $x = 2$

$$\textcircled{1} \quad a) \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2+3x}{3x-5} \right)^{\frac{2x-1}{3}} = \left( 1^{\infty} \right) = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{3} \cdot \left( \frac{2+3x}{3x-5} - 1 \right)} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{3} \left( \frac{2+3x-3x+5}{3x-5} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2x-1}{3} \cdot \frac{7}{3x-5} \right)} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14x-7}{9x-15}} = e^{\left( \frac{\infty}{\infty} \right)} = \boxed{e^{\frac{14}{9}}}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{3-x} = \frac{\sqrt{3+1} - 2}{3-3} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+1} - 2)(\sqrt{x+1} + 2)}{(3-x)(\sqrt{x+1} + 2)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+1) - 2^2}{(3-x)(\sqrt{x+1} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(-1)}{(3-x)(\sqrt{x+1} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-1}{\sqrt{x+1} + 2} = \frac{-1}{\sqrt{4+2}} = \boxed{\frac{-1}{4}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 - x - 3}{2x^2 - 2} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4(x-1)(x+\frac{3}{4})}{2(x+1)(x-1)} = \frac{4 \cdot (1+\frac{3}{4})}{2 \cdot (1+1)} = \boxed{\frac{7}{4}}$$

$$4x^2 - x - 3 = 0 \quad \begin{cases} x = 1 \\ x = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x} \right) = (\infty - \infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})(\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x})}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2+x) - (x^2-x)}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x - x^2+x}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x}} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{x}}{\sqrt{\frac{x^2}{x^2} + \frac{x}{x^2}} + \sqrt{\frac{x^2}{x^2} - \frac{x}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}}} = \frac{2}{1+1} = \frac{2}{2} = \boxed{1}$$

$$\textcircled{2} \quad \text{a) } f(x) = \frac{4x^2}{3x^2 - 27}$$

$$\text{A.N. } 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 27 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm\sqrt{9} = \pm 3$$

Posiciones:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{4x^2}{3x^2 - 27} = \frac{4 \cdot 9^-}{3 \cdot (3)^2 - 27} = \frac{36^-}{27^- - 27} = \frac{36^-}{0^-} = \frac{+}{-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{4x^2}{3x^2 - 27} = \frac{4 \cdot 9^+}{3 \cdot (3^+)^2 - 27} = \frac{36^+}{27^+ - 27} = \frac{36^+}{0^+} = \frac{+}{+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{4x^2}{3x^2 - 27} = \frac{4 \cdot 9^+}{3 \cdot (-3)^2 - 27} = \frac{36^+}{27^+ - 27} = \frac{36^+}{0^+} = \frac{+}{+} = +\infty$$


$$\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{4x^2}{3x^2 - 27} = \frac{4 \cdot 9^-}{3 \cdot (-3^+)^2 - 27} = \frac{36^-}{27^- - 27} = \frac{36^-}{0^-} = \frac{+}{-} = -\infty$$

$$\text{A.H. } \boxed{y} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2}{3x^2 - 27} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) = \frac{4}{3}$$

Posición:

$$\text{Si } x = 100 \quad \begin{cases} y = \frac{4}{3} = 1,3333 \\ f(100) = \frac{4 \cdot 100^2}{3 \cdot 100^2 - 27} = 1,3345 \end{cases} \Rightarrow f(100) > y = \frac{4}{3} \text{ Función por encima}$$

$$\text{Si } x = -100 \quad \begin{cases} y = \frac{4}{3} = 1,3333 \\ f(-100) = \frac{4 \cdot (-100)^2}{3 \cdot (-100)^2 - 27} = 1,3345 \end{cases} \Rightarrow f(-100) > y = \frac{4}{3} \text{ Función por encima.}$$



$$\textcircled{2} \quad b) \quad g(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$\text{A.V. } \sqrt{x^2-1} = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

Posición:


$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{(1^+)^2}{\sqrt{(1^+)^2-1}} = \frac{1^+}{\sqrt{0^+}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{(1^-)^2}{\sqrt{(1^-)^2-1}} = \frac{1^-}{\sqrt{0^-}} = \not\exists$$

Por ser  $g(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}$  par, pues  $g(-x) = g(x)$  se repite simétricamente

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \not\exists \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = +\infty \end{array} \right\} \text{simetría respecto OY}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = \not\exists$$



$$\text{A.O. } y = mx + n \Rightarrow y = x$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x\sqrt{x^2-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^4-x^2}} = \left( \frac{\infty}{\infty} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{x^2}}{\frac{\sqrt{x^4-x^2}}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-0}} = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} - 1 \cdot x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x\sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^2-1}} = \left( \frac{\infty - \infty}{\infty} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2 - x\sqrt{x^2-1})(x^2 + x\sqrt{x^2-1})}{\sqrt{x^2-1} \cdot (x^2 + x\sqrt{x^2-1})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - x^2(x^2-1)}{x^2\sqrt{x^2-1} + x \cdot (x^2-1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2\sqrt{x^2-1} + x^3 - x} = 0$$

(pues el grado del denominador es 3 y el del numerador es 2)

Posición: Si  $x = 100$

$$\left\{ \begin{array}{l} y = x \Rightarrow y = 100 \\ y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} \Rightarrow y = \frac{10.000}{\sqrt{10.000-1}} = 100,005 \end{array} \right. \quad f(x) > \text{A.O}$$

Si  $x = -100$

$$\left\{ \begin{array}{l} y = x \Rightarrow y = -100 \\ y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} \Rightarrow y = 100,005 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{No se approxima por la izq. la función a la} \\ \text{asintota.} \end{array}$$

Pto de corte:

$$\left. \begin{array}{l} y = x \\ y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} \end{array} \right\} \quad x = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} \Rightarrow x \cdot \sqrt{x^2-1} = x^2$$

$$x^2 \cdot (x^2-1) = x^4$$

$$x^4 - x^2 = x^4$$

$$0 = x^2 \Rightarrow x=0 \Rightarrow y=0$$

$\parallel P(0,0)$  pero  $f(x) \neq f(0)$

$\Rightarrow$  Luego no hay punto de corte.

③

$$f(x) = \begin{cases} -2x-a & \text{si } x \leq 0 \\ x-1 & \text{si } 0 < x < 2 \\ bx-5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

a)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -2x-a = -2 \cdot 0 - a = -a$   $\left. \begin{array}{l} -a = -1 \\ a = 1 \end{array} \right\}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x-1 = 0-1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x-1 = 2-1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} bx-5 = b \cdot 2 - 5 = 2b-5$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 = 2b-5 \\ 1+5 = 2b \\ 6 = 2b \\ b = 3 \end{array} \right\}$$

b)  $f(x) = \begin{cases} x-1 & 0 < x < 2 \\ -2x-5 & x \geq 2 \end{cases}$

En  $x=2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x-1 = 2-1=1$  ~~Discont. SALTO FINITO~~

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} -2x-5 = -2 \cdot 2 - 5 = -4 - 5 = -9$$

$$S = \left| \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \right| = |1 - (-9)| = |1 + 9| = |10| = \boxed{10}$$