

Ejercicio 1. (Puntuación máxima 3.75 puntos)

- a) Sabiendo que $\cos \alpha = -0.5$ y $\sin \beta = -0.2$, que $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ y $\frac{3\pi}{2} < \beta < 2\pi$, calcula $\cos(\alpha - 2\beta)$ III IV
- b) Calcular $\operatorname{cosec} 280^\circ$ sabiendo que $\operatorname{tg}(10^\circ) = h$.
- c) Resolver la ecuación: $\cos 2x + 5 \cos x + 3 = 0$

Ejercicio 2. (Puntuación máxima 6.25 puntos)

- a) Resolver por el método de Gauss:
$$\begin{cases} 2x + 5y - 2z = 10 \\ x + 2y - 2z = 4 \\ 4x + 9y - 6z = 18 \end{cases}$$
- b) Desarrollar la expresión: $3 \cdot |x + 1| - |2x - 6|$
- c) Resolver: $9^x - 2 \cdot 3^{x+2} + 81 = 0$
- d) Desarrollar por el binomio de Newton: $\left(\frac{3x^2}{y^3} - \frac{2y^5}{x^4}\right)^4 =$
- e) Calcular x en los siguientes casos:

$$\log_{\frac{5}{3}} \left(\sqrt{\frac{27}{125}} \right) = x$$

$$\log_x \left(\frac{2}{5} \right) = -2$$

OBSERVACIÓN: Cada apartado de los dos ejercicios vale 1,25 puntos

① a) $\cos \alpha = -0,5$ $\sin \beta = -0,2$ $\alpha \in \text{III}$ y $\beta \in \text{IV}$

$$\boxed{\cos(\alpha - 2\beta)} = \cos \alpha \cos 2\beta + \sin \alpha \sin 2\beta = \cos \alpha (\cos^2 \beta - \sin^2 \beta) + \sin \alpha \cdot 2 \sin \beta \cos \beta$$

$$= \cos \alpha \cos^2 \beta - \cos \alpha \sin^2 \beta + 2 \sin \alpha \sin \beta \cos \beta \stackrel{(*)}{=} -0,5 \cdot 0,96 - (-0,5) \cdot (0,2)^2 + 2 \cdot (-0,866) \cdot (-0,2) \cdot 0,9798$$

$$(*) \quad \left. \begin{aligned} \sin^2 \alpha &= 1 - \cos^2 \alpha = 1 - (-0,5)^2 = 1 - 0,25 = 0,75 \Rightarrow \sin \alpha = \pm \sqrt{0,75} \\ &\alpha \in \text{III} \end{aligned} \right\} \sin \alpha = -0,866$$

$$\left. \begin{aligned} \cos^2 \beta &= 1 - \sin^2 \beta = 1 - (-0,2)^2 = 1 - 0,04 = 0,96 \Rightarrow \cos \beta = \pm \sqrt{0,96} \\ &\beta \in \text{IV} \end{aligned} \right\} \cos \beta = 0,9798$$

$$= -0,1206$$

b) ¿cosec 280° ? conocida $\tan 10^\circ = h$



$$\left. \begin{aligned} \text{cosec } 280^\circ &= -\text{cosec } 80^\circ = -\frac{1}{\sin 80^\circ} = -\frac{1}{\cos 10^\circ} = -\sec 10^\circ \\ 1 + \tan^2 10^\circ &= \sec^2 10^\circ \Rightarrow 1 + h^2 = \sec^2 10^\circ \Rightarrow \sec 10^\circ = \sqrt{1 + h^2} \end{aligned} \right\} 10^\circ \in \text{I}$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{cosec } 280^\circ = -\sqrt{1 + h^2}}$$

c) $\cos 2x + 5 \cos x + 3 = 0$

$$\cos^2 x - \sin^2 x + 5 \cos x + 3 = 0 \Rightarrow \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) + 5 \cos x + 3 = 0$$

$$\cos^2 x - 1 + \cos^2 x + 5 \cos x + 3 = 0 \Rightarrow 2 \cos^2 x + 5 \cos x + 2 = 0$$

$$\cos x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 2 \cdot 2}}{2 \cdot 2} = \frac{-5 \pm 3}{4} \quad \begin{cases} -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2} \\ -\frac{8}{4} = -2 \text{ NO VALE!!} \end{cases}$$

$$\cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \begin{cases} 120^\circ + 2\pi K \\ 240^\circ + 2\pi K \end{cases} \quad \forall K \in \mathbb{Z}$$

$$\textcircled{2} a) \begin{cases} 2x + 5y - 2z = 10 \\ x + 2y - 2z = 4 \\ 4x + 9y - 6z = 18 \end{cases} \xrightarrow{E_2 \leftrightarrow E_1} \begin{cases} x + 2y - 2z = 4 \\ 2x + 5y - 2z = 10 \\ 4x + 9y - 6z = 18 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} E_2 - 2E_1 \\ E_3 - 4E_1 \end{matrix}} \begin{cases} x + 2y - 2z = 4 \\ / & y + 2z = 2 \\ / & y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{E_3 = E_2} \begin{cases} x + 2y - 2z = 4 \\ y + 2z = 2 \end{cases} \xrightarrow{z=t} \begin{cases} x + 2y = 4 + 2t \\ y = 2 - 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2(2 - 2t) = 4 + 2t \\ x + 4 - 4t = 4 + 2t \\ x = 6t \end{cases}$$

$$S = (6t, 2 - 2t, t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$b) \quad 3 \cdot |x+1| - |2x-6| = \begin{cases} 3 \cdot (-x-1) - (-2x+6) & \text{si } x < -1 \\ 3(x+1) - (-2x+6) & \text{si } -1 \leq x < 3 \\ 3(x+1) - (2x-6) & \text{si } x \geq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x-9 & \text{si } x < -1 \\ 5x-3 & \text{si } -1 \leq x < 3 \\ x+9 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

$$|x+1| = \begin{cases} x+1 & \text{si } x+1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1 \\ -x-1 & \text{si } x+1 < 0 \Rightarrow x < -1 \end{cases} \quad |2x-6| = \begin{cases} 2x-6 & \text{si } 2x-6 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq 6 \Rightarrow x \geq 3 \\ -2x+6 & \text{si } 2x-6 < 0 \Rightarrow 2x < 6 \Rightarrow x < 3 \end{cases}$$



$$c) \quad 9^x - 2 \cdot 3^{x+2} + 81 = 0 \Rightarrow (3^2)^x - 2 \cdot 3^2 \cdot 3^x + 81 = 0 \Rightarrow (3^x)^2 - 18 \cdot 3^x + 81 = 0$$

$$3^x = L \Rightarrow 3^{2x} = L^2 \Rightarrow L^2 - 18 \cdot L + 81 = 0 \Rightarrow \begin{cases} L_1 = 9 \\ L_2 = 9 \end{cases} \text{ (Doble)}$$

$$3^x = 9 = 3^2 \Rightarrow \boxed{x=2} \text{ (Doble)}$$

$$d) \quad \left(\frac{3x^2}{y^3} - \frac{2y^5}{x^4} \right)^4 = \left(\frac{3x^2}{y^3} \right)^4 - 4 \cdot \left(\frac{3x^2}{y^3} \right)^3 \cdot \frac{2y^5}{x^4} + 6 \cdot \left(\frac{3x^2}{y^3} \right)^2 \cdot \left(\frac{2y^5}{x^4} \right)^2 - 4 \cdot \left(\frac{3x^2}{y^3} \right) \cdot \left(\frac{2y^5}{x^4} \right)^3 + \left(\frac{2y^5}{x^4} \right)^4$$

$$= \frac{81x^8}{y^{12}} - 4 \cdot \frac{27x^6}{y^9} \cdot \frac{2y^5}{x^4} + 6 \cdot \frac{9x^4}{y^6} \cdot \frac{4y^{10}}{x^8} - 4 \cdot \frac{3x^2}{y^3} \cdot \frac{8y^{15}}{x^{12}} + \frac{16y^{20}}{x^{16}} =$$

$$= \boxed{\frac{81x^8}{y^{12}} - \frac{216x^2}{y^4} + \frac{216y^4}{x^4} - \frac{96y^{12}}{x^{10}} + \frac{16y^{20}}{x^{16}}}$$

$$e) \quad a) \log_{\frac{5}{3}} \left(\sqrt{\frac{27}{125}} \right) = x \Rightarrow \left(\frac{5}{3} \right)^x = \sqrt{\frac{27}{125}} = \sqrt{\left(\frac{3}{5} \right)^3} = \left(\frac{3}{5} \right)^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{5}{3} \right)^{-\frac{3}{2}}$$

$$\boxed{x = -\frac{3}{2}}$$

$$b) \quad \log_x \left(\frac{2}{5} \right) = -2 \Rightarrow x^{-2} = \frac{2}{5} \Rightarrow x^2 = \frac{5}{2} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{5}{2}} \Rightarrow$$

$$\boxed{x = +\sqrt{\frac{5}{2}}} \text{ (la base debe ser positiva)}$$