

Geometría: Puntos, rectas, planos.

1.

Considera los puntos $A(2, -1, -2)$ y $B(-1, -1, 2)$, y la recta r dada por $x-1=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-1}{2}$

- a) Determina los puntos del segmento AB que lo dividen en 3 segmentos de la misma longitud.
 b) Determina un punto C de r de forma que el triángulo ABC sea rectángulo en C .

2.

Halla cada uno de los puntos de la recta $r \equiv \begin{cases} x-y=0 \\ y-z=0 \end{cases}$ de manera que junto con los puntos

$A(1, 1, 0)$, $B(1, 0, 1)$ y $C(0, 1, 1)$ formen un tetraedro de volumen $\frac{5}{6}$

POSICIONES RELATIVA DE RECTAS (determinación de planos y rectas)

3.

La recta $r \equiv \frac{x+3}{2} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-3}{3}$ y la recta s , que pasa por los puntos $P(1, 0, 2)$ y $Q(a, 1, 0)$, se cortan en un punto. Calcula el valor de a y el punto de corte.

4.

Considera las rectas

$$r \equiv \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 1 \\ z = -3 - \lambda \end{cases} \quad \text{y} \quad s \equiv \begin{cases} x + y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

- a) Estudia la posición relativa de r y s .
 b) Halla la recta que corta perpendicularmente a r y a s .

5.

Siendo $a \neq 0$, considera las rectas

$$r \equiv x-1=y-2=\frac{z-1}{a} \quad \text{y} \quad s \equiv \frac{x-3}{-a}=\frac{y-3}{-1}=\frac{z+1}{2}$$

- a) (1'25 puntos) Estudia la posición relativa de ambas rectas según los valores de a .
 b) (1'25 puntos) Para $a=2$, determina las ecuaciones de la recta que pasa por el punto de corte de r y s y es perpendicular a ambas.

6.

Considera las rectas $r \equiv \frac{x-2}{-2} = y-1 = \frac{z}{-2}$ y $s \equiv \begin{cases} x+2y=3 \\ 2y+z=2 \end{cases}$

- Estudia la posición relativa de r y s .
- Calcula, si es posible, el plano que contiene a r y s .

7.

Considera las rectas r y s dadas por

$$r \equiv x-2=y-2=z \quad \text{y} \quad s \equiv \begin{cases} x=4+t \\ y=4+t \\ z=mt \end{cases}$$

- Determina m para que r y s sean paralelas.
- Halla, si existe, un valor de m para el que ambas rectas sean la misma.
- Para $m=1$, calcula la ecuación del plano que contiene a r y a s .

8.

Considera las rectas $r \equiv \begin{cases} x=1+\lambda \\ y=1+\lambda \\ z=2+m\lambda \end{cases}$ y $s \equiv \begin{cases} x-y+2z=3 \\ x+z=2 \end{cases}$

- Estudia la posición relativa de r y s según los valores de m .
- Para $m=1$, calcula el coseno del ángulo que forman las rectas r y s .

9.

Considera las rectas $r \equiv \frac{x-2}{1} = \frac{y-k}{2} = \frac{z}{2}$ y $s \equiv \frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$

- Halla k sabiendo que ambas se cortan en un punto.
- Para $k=1$, halla la ecuación general del plano que contiene a r y es paralelo a s .

10. (Apartado b: perpendicular común a rectas, razonarlo detenidamente)

Considera las rectas r y s dadas por: $r \equiv \begin{cases} x+y=z+4 \\ x+2y=-7 \end{cases}$ y $s \equiv \begin{cases} x-2=0 \\ y+3=0 \end{cases}$

- Estudia y determina la posición relativa de r y s .
- Calcula la recta perpendicular común a r y a s .

GEO METRÍA

① $A(2, -1, -2) \quad B(-1, -1, 2) \quad r \equiv x-1 = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$

Clase

a) Puntos de \overline{AB} que lo dividen en 3 iguales


$$\vec{AB} = (-1, -1, 2) - (2, -1, -2) = (-3, 0, 4)$$

$$\boxed{\vec{OP} = \vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{AB} = (2, -1, -2) + \frac{1}{3}(-3, 0, 4)}$$

$$= (2, -1, -2) + (-1, 0, 4/3) = \boxed{(1, -1, -2/3)}$$


$$\boxed{\vec{OQ} = \vec{OA} + \frac{2}{3}\vec{AB} = (2, -1, -2) + \frac{2}{3}(-3, 0, 4) = (2, -1, -2) + (-2, 0, 8/3)}$$

$$= \boxed{(0, -1, 2/3)}$$



b) C de r / triángulo ABC sea rectángulo en C.

$$r: \begin{cases} x = 1+t \\ y = 1-t \\ z = 1+2t \end{cases} \quad \text{Sea } C \in r, \quad C(1+t, 1-t, 1+2t)$$



$$\vec{CA} = (2, -1, -2) - (1+t, 1-t, 1+2t)$$

$$= (1-t, -2+t, -3-2t)$$

$$\vec{CB} = (-1, -1, 2) - (1+t, 1-t, 1+2t) = (-2-t, -2+t, 1-2t)$$

$$\vec{CA} \perp \vec{CB} \Rightarrow \vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0 \Rightarrow (1-t, -2+t, -3-2t) \cdot (-2-t, -2+t, 1-2t) = 0$$

$$\Rightarrow (1-t)(-2-t) + (-2+t)(-2+t) + (-3-2t)(1-2t) = 0$$

$$-2-t+2t+\underline{t^2}+4-2t-2t+\underline{t^2}-3+6t-2t+\underline{4t^2}=0$$

$$6t^2+t-1=0 \Rightarrow t = \frac{-1 \pm \sqrt{12-4(-1) \cdot 6}}{2 \cdot 6} = \frac{-1 \pm 5}{12} \quad \begin{cases} 1/3 \\ -1/2 \end{cases}$$

$$\text{Si } t = \frac{1}{3} \quad C = (1+\frac{1}{3}, 1-\frac{1}{3}, 1+\frac{2}{3}) = (\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{5}{3})$$


$$\text{Si } t = -\frac{1}{2} \quad C' = (1-\frac{1}{2}, 1+\frac{1}{2}, 1-\frac{2}{2}) = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 0)$$

Luego hay 2 puntos que lo cumplen.

(2)

Res

Halla cada uno de los puntos de $r \equiv \begin{cases} x-y=0 \\ y-z=0 \end{cases}$
que junto con $A(1,1,0)$, $B(1,0,1)$ y $C(0,1,1)$ formen
tetraedro de volumen $\frac{5}{6}$.



$$V = \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]| = \frac{5}{6} \text{ Siendo } D \text{ punto}\text{ central de } r$$

$$r \equiv \begin{cases} x=y \\ z=y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$$

$$\vec{AB} = (1,0,1) - (\underline{\underline{t}}, \underline{\underline{t}}, \underline{\underline{0}}) = \underline{\underline{(0, -t, 1)}}$$

$$\vec{AC} = (0,1,1) - (\underline{\underline{t}}, \underline{\underline{t}}, \underline{\underline{0}}) = \underline{\underline{(-t, 1-t, 1)}}$$

$$\vec{AD} = (t,t,t) - (1,1,0) = (t-1, t-1, t)$$

$$V = \frac{5}{6} \Rightarrow |[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]| = 5$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ t-1 & t-1 & t \end{vmatrix} = -(t-1) - (t-1) - t = -3t + 2 =$$

$$-3t + 2 = 5 \Rightarrow t = \frac{-3+5}{3} = -1$$

$$-3t + 2 = -5 \Rightarrow t = \frac{7}{3}$$

Hay 2 soluciones: $D_1 = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ y $D_2 = (-\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$

③ Clase $r \equiv \frac{x+3}{2} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-3}{3}$ $s \equiv$ recta por $P(1,0,2)$
 $y Q(a,1,0)$
 r y s se cortan. ¿a? ¿punto de corte?

r: $\vec{u}(2,2,3)$
 $A(-3,-4,3)$

s: $\overrightarrow{PQ} = (a,1,0) - (1,0,2) = (a-1,1,-2)$

$P(1,0,2)$
 $s \equiv \begin{cases} x = 1 + (a-1)t \\ y = 0 + t \\ z = 2 - 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

Como r y s tienen un punto en común, alguno de s debe cumplir r, veamos cuál, sustituyendo x, y, z de s en r:

$$\frac{1 + (a-1)t + 3}{2} = \frac{t+4}{2} = \frac{2-2t-3}{3} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 1 + (a-1)t + 3 = t + 4 \\ 3(t+4) = 2(-2t-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = (a-1)t + t \\ 3t + 12 = -4t - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = at - 2t \\ 7t = -14 \end{cases}$$

$$\Rightarrow t = -2 \quad \text{así}$$

$$-2a + 4 = 0 \Rightarrow a = 2.$$

Así, para $a=2$ las rectas tienen un punto en común, en concreto cuando $t=-2$ en s:

$$\begin{aligned} x &= 1 + (2-1)(-2) = -1 \\ y &= -2 \\ z &= 2 - 2(-2) = 6 \end{aligned} \quad \left. \right\} \text{punto } (-1, -2, 6)$$

(4)

Clave

$$r = \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 1 \\ z = -3 - \lambda \end{cases}$$

$$s = \begin{cases} xy = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

a) Posición relativa r y s

$$r = \begin{cases} P(3, 1, -3) \\ \vec{u} (1, 0, -1) \end{cases}$$

$$s = \begin{cases} x = 1 - y \\ y \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$$

\vec{u} y \vec{v} no son proporcionales, tienen distinta dirección.
 $(\vec{u} \neq k\vec{v})$ luego rango $[\vec{u}, \vec{v}] = 2$. Las rectas se cortan o se cruzan.


$$\vec{PQ} = (-2, -1, 3)$$

Hallamos el rango de $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{PQ})$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 + 0 - 1 - 2 - 0 - 0 = 0 \Rightarrow \text{rango } (\vec{u}, \vec{v}, \vec{PQ}) = 2$$

Luego r y s se cortan en un punto.

b)

si r' recta perpendicular a r y s que las corta? r y s secantes1) Debe pasar por el punto común
(vimos en a) que son secantes)2) El vector dirección de r' debe ser
perpendicular a \vec{u} y \vec{v} (hacemos $\vec{u} \times \vec{v}$).1) Punto común de r y s (en paramétricas):igualamos x, y, z de ambas

$$\begin{cases} 3 + \lambda = 1 - t \\ 1 = t \\ -3 - \lambda = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \rightarrow t = 1 \\ \rightarrow \lambda = -3 \end{cases}$$

$$\text{Corte: } \begin{cases} x = 3 + \lambda = 3 - 3 = 0 \\ y = 1 \\ z = -3 - \lambda = 0 \end{cases}$$

Punto de corte: $(0, 1, 0)$

2) v) Vector dirección de r' , que es \perp a \vec{u} y \vec{v} ,
luego usamos $\vec{u} \times \vec{v}$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} = \\ = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \quad \text{vector } (1,1,1) = \vec{v}'$$

Luego r' pasa por el $(0,1,0)$ y su dirección es la de r' $(1,1,1)$:

$$r' \equiv \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$$

(5) $a \neq 0$ $r \equiv x-1 = y-2 = \frac{z-1}{a}$ $s \equiv \frac{x-3}{-a} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{2}$

a) Posición relativa de r y s según a .

$$r \equiv \begin{cases} P(1,2,1) \\ \vec{u}(1,1,a) \end{cases} \quad s \equiv \begin{cases} Q(3,3,-1) \\ \vec{v}(-a,-1,2) \end{cases}$$

Hallamos $\vec{PQ} = (2,1,-2)$ y estudiamos el rango de $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{PQ}]$

$$\begin{vmatrix} 1 & -a & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ a & 2 & -2 \end{vmatrix} = 1+4-a^2+2a - 1-2a = 4-a^2$$

$$4-a^2=0 \Leftrightarrow a=2 \text{ ó } a=-2$$

- Si $a \neq 2, -2$ el rango de $([\vec{u}, \vec{v}, \vec{PQ}]) = 3$ y entonces r y s se cruzan.

- Si $a=2$, el rango será menor o igual que 2

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{Como } \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ el rango es 2.}$$

y \vec{u}, \vec{v} no son paralelos, luego r y s se cortan

- Si $a = -2$, sucede parido:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$$

luego $\text{rango } [\vec{u}, \vec{v}] = \text{rango } [\vec{u}, \vec{v}, \vec{PQ}] = 2$

y r y s se cortan.

- b) Para $a=2$, halla ecuaciones recta perp. a r y s por el punto de corte de ambas.
(como 4 b)

⑥


$$r \equiv \frac{x-2}{-2} = y-1 = \frac{z}{-2} \quad s \equiv \begin{cases} x+2y=3 \\ 2y+z=2 \end{cases}$$

a) Posición relativa r y s

$$s \equiv \begin{cases} x = 3-2y \\ z = 2-2y \\ y = y \end{cases} \quad \begin{cases} x = 3-2t \\ y = t \\ z = 2-2t \end{cases} \quad \vec{d}_s (-2, 1, -2) \\ p_s (3, 0, 2)$$

$\vec{d}_r (-2, 1, -2)$ Observamos que r y s tienen la misma dirección. Como $P_r(2, 1, 0)$ no cumple s : $\begin{cases} 2+2 \cdot 1 \neq 3 \\ 2 \cdot 1 + 0 = 2 \end{cases}$ entonces r y s no tienen puntos en común, luego son paralelas

- b) Plano que corta a r y s .



Tomamos $P_r \in \pi$ y como direcciones, $\vec{d}_r (-2, 1, -2)$ y $\vec{P_r P_s} = (3, 0, 2) - (2, 1, 0) = (1, -1, 2)$ (no paralelos).

La ec. de π :

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & x-2 \\ 1 & -1 & y-1 \\ -2 & 2 & z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2x+2(x-2)-2(y-1)-2(z-2) \\ -z+4(y-1)=2z-2y+2-z \\ +4y-4=2y+z-2=0$$

$$\textcircled{7} \quad r = x - 2 = y - 2 = z \quad s = \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 4 + t \\ z = mt \end{cases} \quad P_s(4, 4, 0)$$

a) m para que r y s sean paralelas.

$$\vec{dr} = (1, 1, 1) \quad \vec{ds} = (1, 1, m) \quad \vec{dr} \parallel \vec{ds} \Leftrightarrow m = 1$$

Veamos si ~~común~~^{un} punto de r está o no en s:

$$P_r(2, 2, 0) \quad \begin{cases} 2 = 4 + t & t = -2 \\ 2 = 4 + t & t = 0 \\ 0 = t & \text{no cumple.} \end{cases}$$

Luego no tienen ningún punto en común, así que son paralelas si $m = 1$.

b) m para que r y s coincidan.

Para que coincidan, deben tener la misma dirección. Eso sólo sucede para $m = 1$ (por a), y en ese caso son paralelas. Luego no existe valor de m para que sean coincidentes.

c) Para $m = 1$, planos que contiene a r y s.

Por a) r y s son paralelas. Tomamos $P_r(2, 2, 0)$ que está en el plano, y como direcciones de π :

$$\vec{dr} = (1, 1, 1) \quad \text{y} \quad \vec{P_r P_s} = (4, 4, 0) - (2, 2, 0) = (2, 2, 0)$$

(no son paralelos)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & x-2 \\ 1 & 2 & y-2 \\ 1 & 0 & z \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 2z + 2(y-2) - 2(x-2) - 2x = 0 \\ 2y - 2x = 0 \Rightarrow \boxed{y-x=0}$$

$$⑧ \quad r = \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = 2 + m\lambda \end{cases} \quad s = \begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ x + z = 2 \end{cases}$$

a) Posición relativa de r y s según m .

$$\vec{d}_r (1, 1, m)$$

$$P_r (1, 1, 2)$$

$$s = \begin{cases} x - z = 2 - t \\ y = x + 2z - 3 = 2 - t + 2t - 3 = t - 1 \\ z = t \end{cases}$$

$$\vec{d}_s (-1, 1, 1) \quad P_s (2, -1, 0)$$

Veamos el rango de $[\vec{d}_r, \vec{d}_s, \vec{v}, \vec{P}_s]$ según m

$$\vec{P}_r \vec{P}_s = (2, -1, 0) - (1, 1, 2) = (1, -2, -2)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = -2 + 2m + 1 - m + 2 - 2 = m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1$$

Si $m \neq 1$, rango es 3, luego las rectas se cruzan

Si $m = 1$, el rango es 2 $\left[\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \neq 0 \right]$, luego r y s

son secantes

b) $m = 1$, ¿ángulo r y s ?

Por a), r y s son secantes. Su ángulo viene dado por el de r y s :

$$\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s = |\vec{d}_r| \cdot |\vec{d}_s| \cdot \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s|}{|\vec{d}_r| \cdot |\vec{d}_s|} = \frac{|(1, 1, 1) \cdot (-1, 1, 1)|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{|-1 + 1 + 1|}{\sqrt{3} \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}^2} = \frac{1}{3}$$

$$\boxed{\cos \alpha = \cos \alpha \cos \frac{1}{3}}$$

$$⑨ \quad A(-1, 3, 2) \quad B(2, -1, -1) \quad y \quad C(a-2, 7, b)$$

a) a y b t.g. A, B, C alineados.

Eso sucede si \vec{AB} y \vec{AC} son proporcionales, es decir, porcellos:

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (3, -4, -3) \quad \vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = (a-1, 4, b-2)$$

$$\frac{3}{a-1} = \frac{-4}{4} = \frac{-3}{b-2} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3}{a-1} = -1 \Rightarrow 3 = -a+1 \Rightarrow a = -2 \\ \frac{-3}{b-2} = -1 \Rightarrow -3 = -b+2 \Rightarrow b = 5 \end{cases}$$

b) $a=b=1$, halla recta por origen y es perp. al plano que contiene A, B, C.

Por a), para $a=b=1$, A, B y C no están alineados, luego determinan un plano, π . Si $r \perp \pi \Rightarrow \vec{d}_r = \vec{n}_{\pi}$

Entonces para determinar \vec{n}_{π} , hallamos $\vec{n}_{\pi} = \vec{AB} \times \vec{AC}$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -4 & -3 \\ 0 & 4 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} k = 16i + 3j + 12k \quad \vec{n}_{\pi} (16, 3, 12)$$

Recta con $\vec{d}_r (16, 3, 12)$ por $O(0,0,0)$:

$$\frac{x}{16} = \frac{y}{3} = \frac{z}{12}$$

dm.

(10)

Clase

$$r = \begin{cases} x+y=7+4 \\ x+2y=7 \end{cases}$$

$$s = \begin{cases} x-2=0 \\ y+3=0 \end{cases}$$

a) Posición relativa de r y s

$$r: \begin{cases} y=t \\ x=7-2t \\ z=x+y-4=7-2t+t-4=-t+3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=7-2t \\ y=t \\ z=3-t \end{cases}$$

$$P(7,0,3) \quad \vec{u}(-2,1,-1)$$

$$s: \begin{cases} x=2 \\ y=-3 \\ z=\lambda \end{cases} \quad Q(2,-3,0) \quad \vec{v}(0,0,1)$$

Como $\vec{u}(-2,1,-1)$ y $\vec{v}(0,0,1)$ no son proporcionales, puede que r y s sean secantes o se cruzan.


Veamos el rango de $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{PQ}]$

$$\vec{PQ} = (2, -3, 0) - (7, 0, 3) = (-5, -3, -3)$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & -3 \\ -1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -5 - 6 = -11 \neq 0 \Rightarrow \text{rango es } 3,$$

luego r y s se cruzan

b) recta perpendicular a r y s .



Vamos a hallar los puntos P_r y P_s de cada recta por los que pasa la perpendicular a ambas, sabiendo que $\vec{P_rP_s} \perp \vec{u}$ y $\vec{P_rP_s} \perp \vec{v}$.

$$P_r(7-2t, t, 3-t) \text{ fr } P_s(2, -3, \lambda) \text{ Es}$$

$$\vec{P_rP_s}(-5+2t, -3-t, \lambda-3+t)$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_r P_s} \perp \vec{u} &\Rightarrow (-5+2t, -3-t, \lambda-3+t) \cdot (-2, 1, -1) = 0 \\ &\Rightarrow (-5+2t) \cdot (-2) - 3-t - (\lambda-3+t) = 0 \\ &10-4t-3-t-\lambda+3-t=0 \Rightarrow 10-6t-\lambda=0 \quad (I)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_r P_s} \perp \vec{v} &\Rightarrow (-5+2t, -3-t, \lambda-3+t) \cdot (0, 0, 1) = 0 \\ &\Rightarrow \lambda-3+t=0 \Rightarrow \lambda=3-t \quad (II)\end{aligned}$$

De (I) y (II) : $10-6t-3+t=0 \Rightarrow 7=5t \Rightarrow t=\frac{7}{5}$

$$\lambda=3-\frac{7}{5}=\frac{8}{5}$$

Así $P_r \left(7-2 \cdot \frac{7}{5}, \frac{7}{5}, 3-\frac{7}{5}\right) = \left(\frac{21}{5}, \frac{7}{5}, \frac{8}{5}\right)$

$$P_s (2, -3, 8/5).$$

La recta pedida para P_r, P_s y su vector puede ser $\overrightarrow{P_r P_s} = \left(2-\frac{21}{5}, -3-\frac{7}{5}, 0\right) = \left(-\frac{11}{5}, -\frac{22}{5}, 0\right)$

Tomando P_s :

$$\begin{cases} x = 2 - \frac{11}{5}\mu \\ y = -3 - \frac{22}{5}\mu \\ z = 8/5 \end{cases}$$