

Instrucciones: en todos y cada uno de los ejercicios es obligatorio hacer un desarrollo o procedimiento, por breve que sea, que lleve a la solución.

1. Dados los polinomios $P(x) = 2x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1$, $Q(x) = 3x^2 + x - 1$, $R(x) = 2x^2 + x + 1$, efectúa las siguientes operaciones. **(2 puntos, 1 punto por apartado)**

a) $P(x)(Q(x) - R(x))$ (reduce términos semejantes y ordena el resultado)

b) $P(x) : R(x)$ (indica quién es el cociente y quién es el resto de la división)

2. Desarrolla las siguientes expresiones utilizando las igualdades notables, y simplifica el resultado. **(1 punto, 0,5 puntos por apartado)**

a) $(x^2y + y^2x)^2$

b) $(5b - 4ab^2)^2$

3. Realiza la siguientes división utilizando la regla de Ruffini. Expresa después el resultado de la forma

Dividendo = Divisor × Cociente + Resto. (1 punto)

$$(-3x^4 + x^5 - 5 + 2x^2) : (x+2)$$

4. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:

a) $3(2+x) - 21 = 2 - \frac{x+3}{4}$ **(1 punto)**

b) $\frac{2-3x}{2} - \frac{2+5x}{4} = \frac{5x-4}{6} - \frac{7x+11}{3}$ **(1 punto)**

5. Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado sin utilizar la fórmula:

a) $(x+1)(x-1) = 2(x^2 - 13)$ **(1 punto)**

b) $\frac{x}{2} + 2x^2 = -x(x-1)$ **(1 punto)**

6. Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:

a) $\frac{2}{5}x^2 + 2x + \frac{5}{2} = 0$ **(1 punto)**

b) $\frac{x(x-1)}{2} - \frac{3x-2}{4} = \frac{x^2+2}{6} - \frac{x+1}{3}$ **(1 punto)**

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \text{ a) } P(x)(Q(x) - R(x)) &= (2x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1)((3x^2 + x - 1) - (2x^2 + x + 1)) = \\ &= (2x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1)(x^2 - 2) = 2x^6 - x^5 + 2x^4 - x^3 + x^2 - 4x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 2x - 2 = \\ &= \underline{\underline{2x^6 - x^5 - 2x^4 + x^3 - 3x^2 + 2x - 2}} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} b) \quad \begin{array}{c} 2x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1 \\ - 2x^4 - x^3 - x^2 \\ \hline - 2x^3 + x^2 - x + 1 \\ + 2x^3 + x^2 + x \\ \hline 2x^2 + 1 \\ - 2x^2 - x - 1 \\ \hline - x \end{array} & \begin{array}{l} | 2x^2 + x + 1 \\ \hline x^2 - x + 1 \\ \hline \end{array} \\ \text{Cociente: } \underline{\underline{x^2 - x + 1}} & \text{Resto: } \underline{\underline{-x}} \end{array}$$

$$\textcircled{2} \text{ a) } (x^2y + y^2x)^2 = (x^2y)^2 + 2x^2y y^2x + (y^2x)^2 = \underline{\underline{x^4y^2 + 2x^3y^3 + y^4x^2}}$$

$$\text{b) } (5b - 4ab^2)^2 = (5b)^2 - 2 \cdot 5b \cdot 4ab^2 + (4ab^2)^2 = \underline{\underline{25b^2 - 40ab^3 + 16a^2b^4}}$$

$$\textcircled{3} \quad \begin{array}{r} -1 & -5 & 2 & 2 & 0 & -3 \\ 3 | & -3 & -24 & -66 & -192 & -576 \\ \hline -1 & -8 & -22 & -64 & -192 & \underline{\underline{-579}} \end{array}$$

$$-x^5 - 5x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 3 = (-x^4 - 8x^3 - 22x^2 - 64x - 192)(x - 3) - 579$$

$$\begin{array}{l} \textcircled{4} \text{ a) } 3(2+x) - 21 = 2 - \frac{x+3}{4}; \quad 12(2+x) - 84 = 8 - (x+3); \\ 24 + 12x - 84 = 8 - x - 3; \quad 12x + x = 8 - 3 - 24 + 84; \\ 13x = 65 \Rightarrow x = \frac{65}{13} \Rightarrow \underline{\underline{x = 5}} \end{array}$$

$$\text{b) } \frac{2-3x}{2} - \frac{2+5x}{4} = \frac{5x-4}{6} - \frac{7x+11}{3},$$

$$6(2-3x) - 3(2+5x) = 2(5x-4) - 4(7x+11);$$

$$12 - 18x - 6 - 15x = 10x - 8 - 28x - 44;$$

$$-18x - 15x - 10x + 28x = -8 - 44 - 12 + 6;$$

$$-15x = -58 \Rightarrow x = \frac{58}{15}$$

$$\textcircled{5} \quad \text{a) } (x+1)(x-1) = 2(x^2 - 13); \quad x^2 - 1 = 2x^2 - 26;$$

$$x^2 - 2x^2 = -26 + 1; \quad -x^2 = -25; \quad x^2 = 25;$$

$$x = \sqrt{25} \Rightarrow x = \underline{\underline{\pm 5}}$$

$$\text{b) } \frac{x}{2} + 2x^2 = -x(x-1); \quad x + 4x^2 = -2x(x-1);$$

$$x + 4x^2 = -2x^2 + 2x; \quad 6x^2 - x = 0; \quad x(6x - 1) = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ 6x - 1 = 0 \end{cases}$$

$$6x - 1 = 0 \Rightarrow 6x = 1 \Rightarrow x = \underline{\underline{\frac{1}{6}}}$$

$$\textcircled{6} \quad \text{a) } \frac{2}{5}x^2 + 2x + \frac{5}{2} = 0; \quad 4x^2 + 20x + 25 = 0$$

$$x = \frac{-20 \pm \sqrt{20^2 - 4 \cdot 4 \cdot 25}}{2 \cdot 4} = \frac{-20 \pm \sqrt{400 - 400}}{8} =$$

$$= \frac{-20 \pm \sqrt{0}}{8} = \frac{-20 \pm 0}{8} = \frac{-20}{8} = \underline{\underline{\frac{-5}{2}}}$$

$$\text{b) } \frac{x(x-1)}{2} - \frac{3x-2}{4} = \frac{x^2 + 2}{6} - \frac{x+1}{3},$$

$$6x(x-1) - 3(3x-2) = 2(x^2 + 2) - 4(x+1);$$

$$6x^2 - 6x - 9x + 6 = 2x^2 + 4 - 4x - 4;$$

$$6x^2 - 15x + 6 = 2x^2 - 4x;$$

$$4x^2 - 11x + 6 = 0$$

$$x = \frac{11 \pm \sqrt{(-11)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 6}}{2 \cdot 4} = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 96}}{8} =$$

$$= \frac{11 \pm \sqrt{25}}{8} = \frac{11 \pm 5}{8} = \begin{cases} \frac{2}{8} \\ \frac{6}{8} = \underline{\underline{\frac{3}{4}}} \end{cases}$$