



DERIVACIÓN DE FUNCIONES, 1

1º Calcula la 1^a derivada, simplificando el resultado, de:

- a) $f(x) = \sin^4 x^6$
- b) $f(x) = \sqrt[3]{\cos x}$
- c) $f(x) = \frac{16}{x^2 \cdot (x-1)}$
- d) $f(x) = \operatorname{tg}^2(3x-1)$
- e) $f(x) = \log_3 [\log_2 (4x^2 - 3x)]$
- f) $f(x) = 3^{\cos x} \cdot 10^{-\operatorname{tg} x}$
- g) $f(x) = \sin(3x-2) \cdot \cos(-x+1) \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x^2}{3} - 3x\right)$
- h) $f(x) = \operatorname{arctg}(\ln(\operatorname{sen} x))$
- i) $f(x) = x \cdot \operatorname{arcse}n(\sqrt{x})$
- j) $f(x) = -3x^3 + e^x \cdot \operatorname{arccos}(3x-1)$

2º Calcula la 1^a y 2^a derivada, simplificando el resultado, de:

- a) $f(x) = \frac{x^3}{(1+x)^2}$
- b) $f(x) = (x-3) \cdot e^{-x}$
- c) $f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x-3}$
- d) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$
- e) $f(x) = (x+1)^2 \cdot (x-2)$
- f) $f(x) = x^3 - 5x^2 + x + 1$
- g) $f(x) = (x-1) \cdot \ln x$
- h) $f(x) = x^2 \cdot e^x$

3º Calcula la derivada de las siguientes funciones:

- a) $f(x) = x^{\operatorname{sen} x}$
- b) $f(x) = (x^2 + 2x)^{\operatorname{tg} x}$