43 EJERCICIOS de POLINOMIOS

1. Calcular el **valor numérico del polinomio** P(x) para el valor de x indicado:

a) $P(x)=x^2+1$, para x=1

b) $P(x)=x^3+1$, para x=-1

c) $P(x)=x^2+x+2$, para x=2

d) $P(x)= -x^2-x-2$, para x= -2

*(Soluc: **a)** 2; **b)** 0; **c)** 8; **d)** -4)*

☞ *Ejercicios libro: **pág. 31: 7; pág. 42: 25***

2. En cada caso, hallar k para el valor numérico indicado:

a) $P(x)=2x^2-6x-k$, siendo P(1)=7
(Soluc: k= -11)

b) $P(x)= -2x^4-6x^3+5x-k$, siendo P(-2)=35
(Soluc: k= -29)

c) $P(x) = -\frac{1}{2}x^6 - 5x^4 + 5x^2 - k$, siendo P(-4)=58
(Soluc: k= -3306)

d) $P(x) = -8x^4 - \frac{1}{4}x^2 - 12x + k$, siendo P(1/2)=125
(Soluc: k=2105/16)

3. **Sumar** convenientemente **monomios semejantes**:

a) $2x-5x+7x+x=$

b) $3x^2-7x^2+x^2-2x^2=$

c) $2x^2y-3x^2y+5x^2y=$

d) $-3xy^2+xy^2-6xy^2+8xy^2=$

e) $3x^2y^2-xy^2+5x^2y-x^2y^2+2xy^2-x^2y=$

f) $-2x^3yz+3x^3yz+5x^3yz-x^3yz=$

g) $2ab^2-5a^2b-\frac{2}{3}ab^2-ab^2+\frac{1}{2}a^2b=$

h) $-2xy^3+3x^3y+5xy^3-xy^3=$

*(Soluc: **a)** 5x; **b)** $-5x^2$; **c)** $4x^2y$; **d)** 0; **e)** $2x^2y^2+4x^2y+xy^2$; **f)** $5x^3yz$; **g)** $\frac{1}{3}ab^2 - \frac{9}{2}a^2b$; **h)** $2xy^3+3x^3y$)*

☞ *Ejercicios libro: pág. 30: 3a; pág. 42: 23a*

4. Dados $P(x)=2x^5-3x^4+3x^2-5$ y $Q(x)=x^5+6x^4-4x^3-x+7$, hallar P(x)+Q(x) y P(x)-Q(x)
(Soluc: $3x^5+3x^4-4x^3+3x^2-x+2$; $x^5-9x^4+4x^3+3x^2+x-12$)

5. Dados $P(x)=4x^3+6x^2-2x+3$, $Q(x)=2x^3-x+7$ y $R(x)=7x^2-2x+1$, hallar:

a) P(x)+Q(x)+R(x) *(Soluc: $6x^3+13x^2-5x+11$)*

b) P(x)-Q(x)-R(x) *(Soluc: $2x^3-x^2+x-5$)*

c) P(x)+3Q(x)-2R(x) *(Soluc: $10x^3-8x^2-x+22$)*

6. Efectuar los siguientes **productos** en los que intervienen **monomios**, dando el resultado simplificado:

a) $(-2x^3)\cdot\left(\frac{4}{5}x^2\right)\cdot\left(\frac{1}{2}x\right)=$ *(Soluc : $-\frac{4}{5}x^6$)*

b) $\left(-\frac{5}{7}x^7\right)\cdot\left(\frac{3}{5}x^2\right)\cdot\left(-\frac{4}{3}x\right)=$ *(Soluc : $\frac{4}{7}x^{10}$)*

c) $5x^3\cdot 3x^2y\cdot(-4xz^3)=$ *(Soluc : $-60x^6yz^3$)*

d) $-3ab^2\cdot 2ab\cdot(-\frac{2}{3}a^2b)=$ *(Soluc : $4a^4b^4$)*

e) $(3x^4-2x^3+2x^2+5)\cdot 2x^2=$ *(Soluc : $6x^6-4x^5+4x^4+10x^2$)*

www.yoquieroaprobar.es

f) $(-2x^5+3x^3-2x^2-7x+1)\cdot(-3x^3)=$ *(Soluc : $6x^8-9x^6+6x^5+21x^4-3x^3$)*

g) $\left(\frac{2}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{4}{5}x-\frac{5}{4}\right)\cdot 12x^2=$ *(Soluc : $8x^5-18x^4+\frac{48}{5}x^3-15x^2$)*

h) $\left(\frac{1}{2}ab^3-a^2+\frac{4}{3}a^2b+2ab\right)\cdot 6a^2b=$ *(Soluc : $3a^3b^4-6a^4b+8a^4b^2+12a^3b^2$)*

☞ *Ejercicios libro:* ***pág. 42: 23b y 30***

7. **Extraer** el máximo **factor común** posible:

a) $4x^2-6x+2x^3$ *(Soluc: $2x(x^2+2x-3)$)*

b) $12x^4y^2+6x^2y^4-15x^3y$ *(Soluc: $3x^2y(4x^2y+2y^3-5x)$)*

c) $-3xy-2xy^2-10x^2yz$ *(Soluc: $xy(-3-2y-10xz)$)*

d) $-3x+6x^2+12x^3$ *(Soluc: $3x(4x^2+2x-1)$)*

e) $2ab^2-4a^3b+8a^4b^3$ *(Soluc: $2ab(b-2a^2+4a^3b^2)$)*

f) $2x^3+4x^2-8x$ *(Soluc: $2x(x^2+2x-4)$)*

g) $6x^3y^2-3x^2yz+9xy^3z^2$ *(Soluc: $3xy(2x^2y-xz+3y^2z^2)$)*

h) $-2x(x-3)^2+4x^2(x-3)$ *(Soluc: $2x(x-3)(x+3)$)*

☞ *Ejercicios libro:* ***pág. 43: 38***

8. Efectuar los siguientes **productos**:

a) $(3x^2+5x-6)\ (8x^2-3x+4)=$ *(Soluc: $24x^4+31x^3-51x^2+38x-24$)*

b) $(5x^3-4x^2+x-2)\ (x^3-7x^2+3)=$ *(Soluc: $5x^6-39x^5+29x^4+6x^3+2x^2+3x-6$)*

c) $(2x^4-3x^2+5x)\ (3x^5-2x^3+x-2)=$ *(Soluc: $6x^9-13x^7+15x^6+8x^5-14x^4-3x^3+11x^2-10x$)*

d) $(ab^2+a^2b+ab)\ (ab-ab^2)=$ *(Soluc: $a^3b^2+a^2b^2-a^2b^4-a^3b^3$)*

e) $(-x^6+x^5-2x^3+7)\ (x^2-x+1)=$ *(Soluc: $-x^8+2x^7-2x^6-x^5+2x^4-2x^3+7x^2-7x+7$)*

f) $(x^2y^2-2xy)\ (2xy+4)=$ *(Soluc: $2x^3y^3-8xy$)*

g) $10\ (x-5+y-5)+(10-x)\ (10-y)=$ *(Soluc: xy)*

h) $(x^2-4x+3/2)\ (x+2)=$ *(Soluc: $x^3-2x^2-13x/2+3$)*

i) $(x^2+5x/2+35/3)\ (x-6)=$ *(Soluc: $x^3-7x^2/2-10x/3-70$)*

j) $(2x^2+4x+2)\ (x-1/2)=$ *(Soluc: $2x^3+3x^2-1$)*

9. Efectuar las siguientes **operaciones combinadas**:

a) $(2x^2+x+3/2)\ (2x^2-3)+8x+7/2=$ *(Soluc: $4x^4+2x^3-3x^2+5x-1$)*

b) $(3x^3+5x^2/2-3x+13)\ (2x^2+2)-(-6x+24)=$ *(Soluc: $6x^5+5x^4+31x^2+2$)*

c) $(3x^2-6x+1)\ (x^3-2x/3+2)+14x/3=$ *(Soluc: $3x^5-6x^4-x^3+10x^2-8x+2$)*

d) $-x/3+1/3+(2x^2-x/3-2/3)\ (3x^2+2)=$ *(Soluc: $6x^4-x^3+2x^2-x-1$)*

www.yoquieroaprobar.es

10. Dados los polinomios del ejercicio 5, hallar:

a) $[R(x)]^2$ **b)** $P(x)-Q(x)\cdot R(x)$ **c)** $P(x)\cdot[Q(x)+R(x)]$ **d)** $P(x)\cdot Q(x)\cdot R(x)$

*(Soluc: **a)** $49x^4-28x^3+18x^2-4x+1$; **b)** $-14x^5+4x^4+9x^3-45x^2+13x-4$; **c)** $8x^6+40x^5+26x^4+6x^3+75x^2-25x+24$*
***d)** $56x^8+68x^7-72x^6+224x^5+244x^4-179x^3+225x^2-59x+21$)*

☞ *Ejercicios libro: **pág. 32: 8 y 9; pág. 42: 27 y 28***

11. Desarrollar, aplicando las **igualdades notables**:

a) $(x+2)^2=$
b) $(x-3)^2=$
c) $(x+2)\,(x-2)=$
d) $(3x+2)^2=$
e) $(2x-3)^2=$
f) $(5x+4)\,(5x-4)=$
g) $(x^2+5)^2=$
h) $(x^3-2)^2=$
i) $(x^2-1)\,(x^2+1)=$
j) $(2x^2+3x)^2=$
k) $(2x^2-3)^2=$
l) $(-x-3)^2=$
m) $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2=$
n) $\left(2a-\frac{3}{2}\right)^2=$
o) $\left(1+\frac{x}{2}\right)\left(1-\frac{x}{2}\right)=$
p) $\left(2x+\frac{3}{4}\right)^2=$
q) $\left(\frac{3}{2}-\frac{x}{4}\right)^2=$
r) $\left(2+\frac{a}{3}\right)\left(-\frac{a}{3}+2\right)=$
s) $\left(\frac{3x}{2}-\frac{1}{x}\right)^2=$
t) $\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x}{3}\right)\left(\frac{x^2}{2}+\frac{x}{3}\right)=$
u) $\left(\frac{3}{2}x+\frac{1}{4}\right)^2=$

*(Soluc: **m)** $x^2+x+\frac{1}{4}$; **n)** $4a^2-6a+\frac{9}{4}$; **o)** $1-\frac{x^2}{4}$; **p)** $4x^2+3x+\frac{9}{16}$; **q)** $\frac{9}{4}-\frac{3x}{4}+\frac{x^2}{16}$; **r)** $4-\frac{a^2}{9}$;*
***s)** $\frac{9}{4}x^2-3+\frac{1}{x^2}$; **t)** $\frac{x^4}{4}-\frac{x^2}{9}$; **u)** $\frac{9}{4}x^2+\frac{3x}{4}+\frac{1}{16}$)*

☞ *Ejercicios libro: **pág. 32: 10a,b; pág. 34: 12; pág. 42: 31, 32 y 33***

12. Operar y simplificar:

a) $(x+1)^2+(x-2)(x+2)=$
b) $(3x-1)^2-(2x+5)(2x-5)=$
c) $(2x+3)(-3+2x)-(x+1)^2=$
d) $(-x+2)^2-(2x+1)^2-(x+1)(x-1)=$
e) $-3x+x(2x-5)(2x+5)-(1-x^2)^2=$
f) $(3x-1)^2-(-5x^2-3x)^2-(-x+2x^2)(2x^2+x)=$

☞ *Ejercicios libro: **pág. 42: 34***

*(Soluc: **a)** $2x^2+2x-3$; **b)** $5x^2-6x+26$; **c)** $3x^2-2x-10$; **d)** $-4x^2-4x+4$; **e)** $-x^4+4x^3+2x^2-28x-1$; **f)** $-29x^4-30x^3+x^2-6x+1$)*

13. El matemático griego Pitágoras conocía las dos siguientes posibles formas de construir un triángulo rectángulo con sus tres lados de longitud entera, llamadas **ternas pitagóricas**, sin más que dar valores a $n\in$ IN:



Por su parte, Euclides conocía la siguiente fórmula general, que engloba a las dos anteriores:



$(m,n \in IN,\ m>n)$

www.yoquieroaprobar.es

Finalmente, he aquí otras dos ternas pitagóricas de autor desconocido:



Demostrar la veracidad de estas fórmulas. Generar algunos casos concretos.

14. Demostrar que $(a^2+b^2)\,(c^2+d^2)=(ac-bd)^2+(ad+bc)^2$

15. Desarrollar, aplicando el **triángulo de Tartaglia**:

a) $(x+2)^4$
b) $(x^2+3)^6$
c) $(2x^2+3y)^6$
d) $(2x^3+5)^5$
e) $(2x^4+5x)^5$
f) $\left(x+\frac{1}{x}\right)^4$
g) $\left(x+\frac{1}{2}\right)^5$
h) $(a-b)^5$
i) $(x-3)^3$
j) $(3x-2)^4$
k) $(x^2-3x)^5$
l) $(3x-2y)^6$
m) $(2x^2-4)^4$
n) $\left(x-\frac{1}{2}\right)^5$
o) $(2-3x^2)^5$
p) $\left(2x-\frac{1}{3}\right)^4$
q) $(2x-3)^6$
r) $\left(\frac{x}{2}-3\right)^6$
s) $(-x-1)^4$
t) $(2x-1)^5$

☞ *Ejercicio libro:* ***pág. 32: 10c***

(Sol: ***a)*** $x^4+8x^3+24x^2+32x+16$; ***b)*** $x^{12}+18x^{10}+135x^8+540x^6+1215x^4+1458x^2+729$;
c) $64x^{12}+576x^{10}y+2160x^8y^2+4320x^6y^3+4860x^4y^4+2916x^2y^5+729y^6$; ***d)*** $32x^{15}+400x^{12}+2000x^9+5000x^6+6250x^3+3125$;
e) $32x^{20}+400x^{17}+2000x^{14}+5000x^{11}+6250x^8+3125x^5$; ***f)*** $x^4+4x^2+6+4/x^2+1/x^4$; ***g)*** $x^5+5x^4/2+5x^3/2+5x^2/4+5x/16+1/32$;
h) $a^5-5a^4b+10a^3b^2-10a^2b^3+5ab^4-b^5$; ***i)*** $x^3-9x^2+27x-27$; ***j)*** $81x^4-216x^3+216x^2-96x+16$;
k) $x^{10}-15x^9+90x^8-270x^7+405x^6-243x^5$; ***l)*** $729x^6-2916x^5y+4860x^4y^2-4320x^3y^3+2160x^2y^4-576xy^5+64y^6$;
m) $16x^8-128x^6+384x^4-512x^2+256$; ***n)*** $x^5-5x^4/2+5x^3/2-5x^2/4+5x/16-1/32$; ***p)*** $16x^4-32x^3/3+8x^2/3-8x/27+1/81$
r) $x^6/64-9x^5/16+134x^4/16-135x^3/2+1215x^2/4-729x+729$*)*

16. Efectuar los siguientes **cocientes** en los que intervienen **monomios**, dando el resultado simplificado:

a) $\frac{4x^3}{2x^2}=$
b) $\frac{8x^4}{-2x^2}=$
c) $\frac{7x^5}{2x^3}=$
d) $\frac{-8x^3}{2x^2}=$
e) $\frac{-3x^7}{-9x^4}=$
f) $\frac{6x^3y^4}{2x^2y}=$
g) $\frac{-9a^4b^3c^2}{3ab^2c}=$
h) $\frac{6x^5-9x^2+3x}{3x}=$
i) $\frac{-12x^4+6x^3-4x^2}{-2x^2}=$
j) $\frac{-6x^8-7x^4-\frac{3}{4}x^3}{-\frac{5}{3}x^3}=$
k) $\frac{-8x^9+\frac{3}{2}x^5-x^4}{-\frac{3}{7}x^4}=$
l) $(-18x^3yz^3):(6xyz^3)=$
m) $\frac{-3a(a^3b)+5a^4b}{-a^2b}=$
n) $\frac{-3xy^2(-2x^3y)}{4x^2y}=$

(Soluc: ***h)*** $2x^4-3x+1$; ***i)*** $6x^2-3x+2$; ***j)*** $18x^6/5+21x/5+9/20$; ***k)*** $56x^6/3-7x/2+7/3$; ***l)*** $-3x^2$; ***m)*** $-2a^2$; ***n)*** $3x^2y^2/2$*)*

www.yoquieroaprobar.es

17. Efectuar los siguientes **cocientes**, indicando claramente el cociente C(x) y el resto R(x), y comprobar el resultado mediante la regla D=d·C+R:

a) $x^4-x^3+7x^2+x+15 \,|\, x^2+2$ *(Soluc: $C(x)=x^2-x+5$; $R(x)=3x+5$)*

b) $2x^5-x^3+2x^2-3x-3 \,|\, 2x^2-3$ *(Soluc: $C(x)=x^3+x+1$; División exacta)*

c) $6x^4-10x^3+x^2+11x-6 \,|\, 2x^2-4x+3$ *(Soluc: $C(x)=3x^2+x-2$; División exacta)*

d) $x^3+2x^2+x-1 \,|\, x^2-1$ *(Soluc: $C(x)=x+2$; $R(x)=2x+1$)*

e) $8x^5-16x^4+20x^3-11x^2+3x+2 \,|\, 2x^2-3x+2$ *(Soluc: $C(x)=4x^3-2x^2+3x+1$; División exacta)*

f) $x^4+3x^3-2x+5 \,|\, x^3+2$ *(Soluc: $C(x)=x+3$; $R(x)=-4x-1$)*

g) $x^5-2x^4+3x^2-6 \,|\, x^4+1$ *(Soluc: $C(x)=x-2$; $R(x)=3x^2-x-4$)*

h) $x^2 \,|\, x^2+1$ *(Soluc: $C(x)=1$; $R(x)=-1$)*

i) $3x^6+2x^4-3x^2+5 \,|\, x^3-2x+4$ *(Soluc: $C(x)=3x^3+8x-12$; $R(x)=13x^2-56x+53$)*

j) $x^8 \,|\, x^2+1$ *(Soluc: $C(x)=x^6-x^4+x^2-1$; $R(x)=1$)*

k) $x^3-4x^2+5x-8 \,|\, x-2$ *(Soluc: $C(x)=x^2-2x+1$; $R=-6$)*

l) $2x^5+3x^2-6 \,|\, x+3$ *(Soluc: $C(x)=2x^4-6x^3+18x^2-51x+153$; $R(x)=-465$)*

m) $x^4-7x^3+8x^2-2 \,|\, x-1$ *(Soluc: $C(x)=x^3-6x^2+2x+2$; División exacta)*

n) $3x^5-x^4+8x^2-5x-2 \,|\, x^2-x+1$ *(Soluc: $C(x)=3x^3+2x^2-x+5$; $R(x)=x-7$)*

o) $5x^4-2x^3+x-7 \,|\, x^2-1$ *(Soluc: $C(x)=5x^2-2x+5$; $R(x)=-x-2$)*

p) $4x^5-3x^3+5x^2-7 \,|\, 2x^2-3x+5$ *(Soluc: $C(x)=2x^3+3x^2-2x-8$; $R(x)=-14x+33$)*

q) $9x^3+3x^2-7x+2 \,|\, 3x^2+5$ *(Soluc: $C(x)=3x+1$; $R(x)=-22x-3$)*

r) $4x^4-3x^2+5x-7 \,|\, 2x^2+x-3$ *(Soluc: $C(x)=2x^2-x+2$; $R(x)=-1$)*

s) $4x^5+3x^3-2x^2+5 \,|\, 2x^2-x+3$ *(Soluc: $C(x)=2x^3+x^2-x-3$; $R(x)=14$)*

t) $6x^4+5x^2-3x+8 \,|\, 3x^3-2x-3$ *(Soluc: $C(x)=2x$; $R(x)=9x^2+3x+8$)*

u) $4x^4+2x^3-3x^2+5x-1 \,|\, 2x^2-3$ *(Soluc: $C(x)=2x^2+x+3/2$; $R(x)=8x+7/2$)*

v) $8x^4+3x^3+2x-2 \,|\, 4x^2+x-3$ *(Soluc: $C(x)=2x^2+x/4+23/16$; $R(x)=21x/16+37/16$)*

w) $2x^5-x^3+3x-9 \,|\, 2x^2-x+2$ *(Soluc: $C(x)=x^3+x^2/2-5x/4-9/8$; $R(x)=35x/8-27/4$)*

x) $6x^3-3x^2+2x-5 \,|\, 3x-2$ *(Soluc: $C(x)=2x^2+x/3+8/9$; $R(x)=-29/9$)*

y) $4x^4-x^3+x+5 \,|\, 2x^2-x+3$ *(Soluc: $C(x)=2x^2+x/2-11/4$; $R(x)=-13x/4+53/4$)*

z) $6x^4+3x^3-5x^2+x-8 \,|\, 3x^2-5x+2$ *(Soluc: $C(x)=2x^2+13x/3+38/9$; $R(x)=121x/9-148/9$)*

α) $8x^4-3x^2+7x-5 \,|\, 4x^2-3x+2$ *(Soluc: $C(x)=2x^2+3x/2-5/8$; $R(x)=17x/8-15/4$)*

β) $6x^5+5x^4+31x^2+2 \,|\, 2x^2+2$ *(Soluc: $C(x)=3x^3+5x^2/2-3x+13$; $R(x)=6x-24$)*

γ) $3x^5-6x^4-x^3+10x^2-8x+2 \,|\, 3x^2-6x+1$ *(Soluc: $C(x)=x^3--2x/3+2$; $R(x)=14x/3$)*

δ) $6x^4-x^3+2x^2-x-1 \,|\, 3x^2+2$ *(Soluc: $C(x)=2x^2--x/3-2/3$; $R(x)=-x/3+1/3$)*

ε) $4x^4 \,|\, 2x^2-1$ *(Soluc: $C(x)=2x^2+1$; $R(x)=1$)*

ζ) $4x^4+x^3-x+1 \,|\, 2x^2-1$ *(Soluc: $C(x)=2x^2+x/2+1$; $R(x)=-x/2+2$)*

☞ *Ejercicios libro:* ***pág. 33: 11; pág. 42: 29***

www.yoquieroaprobar.es

18. Inventar una división de polinomios cuyo cociente sea $C(x)=x^2-3x+1$, el resto sea $R(x)=x-1$ y el dividendo un polinomio de 4º grado.

19. Efectuar las siguientes divisiones mediante la **regla de Ruffini**, indicando claramente el cociente C(x) y el resto R(x), y comprobar el resultado:

a) $x^4-7x^3+8x^2-2 \mid x-1$ *(Soluc: $C(x)=x^3-6x^2+2x+2$; División exacta)*

b) $x^3-4x^2+5x-8 \mid x-2$ *(Soluc: $C(x)=x^2-2x+1$; $R=-6$)*

c) $2x^4+3x^3-4x^2+x-18 \mid x-2$ *(Soluc: $C(x)=2x^3+7x^2+10x+21$; $R=24$)*

d) $2x^5+3x^2-6 \mid x+3$ *(Soluc: $C(x)=2x^4-6x^3+18x^2-51x+153$; $R=-465$)*

e) $3x^4-10x^3-x^2-20x+5 \mid x-4$ *(Soluc: $C(x)=3x^3+2x^2+7x+8$; $R=37$)*

f) $2x^4-10x+8 \mid x+2$ *(Soluc: $C(x)=2x^3-4x^2+8x-26$; $R=60$)*

g) $10x^3-15 \mid x+5$ *(Soluc: $C(x)=10x^2-50x+250$; $R=-1265$)*

h) $x^3-2x^2-13x/2+3 \mid x+2$ *(Soluc: $C(x)=x^2-4x+3/2$; División exacta)*

i) $x^3-7x^2/2-10x/3-70 \mid x-6$ *(Soluc: $C(x)=x^2+5x/2+35/3$; División exacta)*

j) $x^4-2x^3/3+x^2/2+3x+1 \mid x+3$ $\left(Soluc: C(x)=x^3-\frac{11}{3}x^2+\frac{23}{2}x-\frac{63}{2};\ R(x)=\frac{191}{2}\right)$

k) $x^3+2x^2+3x+1 \mid x-1$ *(Soluc: $C(x)=x^2+3x+6$; $R=7$)*

l) $x^4-2x^3+x^2+3x+1 \mid x-2$ *(Soluc: $C(x)=x^3+x+5$; $R=11$)*

m) $x^3+x^2+x+1 \mid x+1$ *(Soluc: $C(x)=x^2+1$; División exacta)*

n) $2x^4+x^3-2x^2-1 \mid x+2$ *(Soluc: $C(x)=2x^3-3x^2+4x-8$; $R=15$)*

o) $2x^4-7x^3+4x^2-5x+6 \mid x-3$ *(Soluc: $C(x)=2x^3-x^2+x-2$; División exacta)*

p) $x^5+1 \mid x-1$ *(Soluc: $C(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$; $R=2$)*

q) $2x^3+3x^2-1 \mid x-1/2$ *(Soluc: $C(x)=2x^2+4x+2$; División exacta)*

r) $3x^3+2x^2+2x-1 \mid x-1/3$ *(Soluc: $C(x)=3x^2+3x+3$; División exacta)*

s) $x^4+x^3-x^2+x-1 \mid x+2$ *(Soluc: $C(x)=x^3-x^2+x-1$; $R=1$)*

t) $2x^3-x^2-x-3 \mid 2x-3$ *(Soluc: $C(x)=x^2+x+1$; División exacta)*

(Ayuda: Dividir entre 2 ambos términos)

u) $ax^3-3a^2x^2+2a^3x+1 \mid x-a$ *(Soluc: $C(x)=ax^2-2a^2x$; $R=1$)*

☞ *Ejercicios libro:* ***pág. 35: 15; pág. 43: 39***

RECORDAR:

TEOREMA DEL RESTO: "El resto de la división de P(x) por x-a coincide con el valor numérico P(a)"

Ejemplo: Al efectuar la división de $P(x)=x^2+x-2$ entre x-1 se obtiene resto cero, como cabía esperar, puesto que $P(1)=0$

Utilidad: El th. del resto permite predecir, sin necesidad de efectuar la división, si se trata de una división exacta.

20. Comprobar el **teorema del resto** mediante las divisiones anteriores.

21. Dado $P(x)=2x^2-x-3$, comprobar si es divisible por x+1 o por x-2 mediante el teorema del resto. Comprobar a continuación efectuando la división ¿Cuál es el otro factor por el que es divisible?
(Soluc: SÍ; NO; 2x-3)

www.yoquieroaprobar.es

22. Determinar, aplicando el teorema del resto, el valor de **a** para que el resto de la división $-x^5+3x^4+ax^3+9x^2+2x-7 \,|\, x-3$ sea -1; comprobar, a continuación, el resultado obtenido haciendo la división. *(Soluc: a=-3)*

23. Averiguar, sin efectuar la división, cuáles de las siguientes divisiones son exactas:

a) $x^3-3x^2+2x-10 \,|\, x-4$ *(Soluc: NO)*

b) $x^3-x^2+x+14 \,|\, x+2$ *(Soluc: SÍ)*

c) $x^6-1 \,|\, x-1$ *(Soluc: SÍ)*

d) $x^5-3x^3+2x \,|\, x-4$ *(Soluc: NO)*

24. Hallar, de dos formas distintas, el valor de **m** en cada caso para que las siguientes divisiones sean exactas:

a) $x^3+8x^2+4x+m \,|\, x+4$ *(Soluc: m=-48)*

b) $2x^3-10x^2+mx+25 \,|\, x-5$ *(Soluc: m=-5)*

c) $2x^4+mx^3-4x^2+40 \,|\, x-2$ *(Soluc: m=-7)*

d) $mx^2-3x-744 \,|\, x-8$ *(Soluc: m=12)*

e) $x^2+4x-m \,|\, x+3$ *(Soluc: m=-3)*

f) $x^3-5x^2+m \,|\, x-1$ *(Soluc: m=4)*

g) $5x^4+2x^2+mx+1 \,|\, x-3$ *(Soluc: m=-424/3)*

h) $x^5-4x^3+mx^2-10 \,|\, x+1$ *(Soluc: m=7)*

RECORDAR:

TEOREMA DEL FACTOR: "P(x) es divisible por x-a (o dicho de otra forma, P(x) contiene el factor x-a) si se cumple que P(a)=0"

Ejemplo: Dado $P(x)=x^2+x-2$, como P(1)=0, podemos asegurar que P(x) es divisible por x-1

De hecho, puede comprobarse que al factorizarlo se obtiene $x^2+x-2=(x-1)(x+2)$

(Nótese que el th. del factor es a la división polinómica lo que los criterios de divisibilidad eran a la división numérica)

25. Comprobar, sin efectuar la división, que $x^{99}+1 \,|\, x+1$ es exacta. *(Soluc: Al hacer P(-1), sale 0)*

26. Comprobar que x^2-2x-3 es divisible por x-3 sin efectuar la división. Comprobar el resultado obtenido haciendo la división. ¿Por qué otro factor es divisible? *(Soluc: P(x)=(x-3)(x+1))*

27. Estudiar si $P(x)=x^2+x-2$ es divisible por x+2 y/o por x-3, sin efectuar la división. Comprobar el resultado obtenido haciendo la división. ¿Por qué otro factor es divisible? *(Soluc: divisible por x+2 pero no por x-3)*

28. Estudiar si $P(x)=x^5-32$ es divisible por x-2 sin efectuar la división (Comprobar el resultado obtenido haciendo la división). *(Soluc: Sí es divisible)*

29. Sin necesidad de efectuar la división, ¿podemos asegurar que el polinomio $P(x)=x^{50}+x^{25}-x-1$ es divisible por x-1? ¿Por qué?

30. TEORÍA: Razonar, mediante ejemplos, que el teorema del factor viene a ser a la división polinómica lo que los criterios de divisibilidad eran a la división numérica

FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS:

31. Dados los siguientes polinomios cuadráticos se pide:

i) Obtener sus raíces y comprobarlas.
ii) A partir de las raíces anteriores, factorizarlos.
iii) Comprobar dicha factorización.

a) x^2-5x+6 **b)** x^2-2x-8 **c)** x^2-6x+9 **d)** $4x^2+23x-6$ **e)** x^2+x+1 **f)** $6x^2-7x+2$

www.yoquieroaprobar.es

32. Dados los siguientes polinomios se pide**: i)** Obtener sus raíces por Ruffini. **ii)** Comprobar dichas raíces sustituyéndolas en P(x) **iii)** Factorizar P(x) a partir de sus raíces y comprobar dicha factorización:

a) $P(x)=x^3-4x^2+x+6$ *(Soluc: x=-1,2,3)*

b) $P(x)=x^4-8x^3+17x^2+2x-24$ *(Soluc: x=-1,2,3,4)*

c) $P(x)=x^3+x^2-5x+3$ *(Soluc: x=1doble,-3)*

d) $P(x)=x^4-2x^2+1$ *(Soluc: x=-1doble,1doble)*

e) $P(x)=6x^4+x^3-25x^2-4x+4$ *(Soluc: x=±2,-1/2,1/3)*

33. Sabiendo que una de sus raíces es x=1/2, factorizar $P(x)=2x^4-3x^3+3x^2-3x+1$

34. Dadas las siguientes ecuaciones polinómicas se pide:

i) Resolverlas por Ruffini.

ii) Comprobar las soluciones obtenidas sustituyéndolas en la ecuación.

iii) A partir de sus raíces, factorizar el polinomio y comprobar dicha factorización.

a) $x^3-6x^2+11x-6=0$ *(Soluc: x=1,2,3)*

b) $x^3+x^2-9x-9=0$ *(Soluc: x=-1,-3,3)*

c) $x^4-2x^3-17x^2+18x+72=0$ *(Soluc: x=-2, ±3, 4)*

d) $x^4-x^3-13x^2+25x-12=0$ *(Soluc: x=-4, 1 doble, 3)*

e) $x^4-x^3+2x^2+4x-8=0$ *(Soluc: carece de raíces ε Q)*

f) $3x^3+x^2-8x+4=0$ *(Soluc: x=-2,1,2/3)*

g) $x^5-3x^4-5x^3+15x^2+4x-12=0$ *(Soluc: x=±1,±2,3)*

h) $x^4-5x^2+4=0$ *(Soluc: x=±1,±2) (También se puede hacer por ecuación bicuadrada)*

i) $x^4+2x^3-5x^2-6x=0$ *(Soluc: x=-3,-1,0,2)*

j) $x^4+2x^3-7x^2-8x+12=0$ *(Soluc: x=1, ±2, -3)*

k) $x^3-5x^2-5x-6=0$ *(Soluc: x=6)*

l) $x^5-2x^4-x+2=0$ *(Soluc: x=±1,2)*

m) $x^4-6x^3+11x^2-6x=0$ *(Soluc: x=0,1,2,3)*

n) $6x^4+11x^3-28x^2-15x+18=0$ *(Soluc: x=-1,-3,2/3,3/2)*

o) $x^3+3x^2-10x-24=0$ *(Soluc: x=-4,-2,3)*

p) $x^3+2x^2-15x-36=0$ *(Soluc: x=-3 doble,4)*

q) $x^3-3x^2+3x-1=0$ *(Soluc: x=1 triple)*

35. Dados los siguientes polinomios, se pide:

i) Obtener sus raíces por Ruffini.

ii) Comprobar dichas raíces sustituyéndolas en P(x)

iii) Factorizar P(x) a partir de sus raíces y comprobar dicha factorización.

a) $P(x)=x^4+4x^3+7x^2+8x+4$ *(Soluc: x=-2,-1)*

b) $P(x)=6x^3+7x^2-9x+2$ *(Soluc: x=-2,1/2,1/3)*

c) $P(x)=x^4-x^3+2x^2-4x-8$ *(Soluc: x=-1,2)*

d) $P(x)=x^4-5x^3+5x^2+5x-6$ *(Soluc: x=2,3,±1)*

e) $P(x)=x^4-3x^3+5x^2-9x+6$ *(Soluc: x=1,2)*

f) $P(x)=x^4-5x^2+4$ *(También se puede hacer por ecuación bicuadrada)*

g) $P(x)=x^4-5x^2-36$ *(También se puede hacer por ecuación bicuadrada)*

h) $P(x)=x^4-2x^3-2x^2-2x-3$ *(Soluc: x=-1,3)*

i) $P(x)=x^4-6x^2+7x-6$ *(Soluc: x=2,-3)*

j) $P(x)=x^4-3x^3-3x^2+7x+6$ *(Soluc: x=-1 doble,2,3)*

www.yoquieroaprobar.es

k) $P(x)=12x^4-25x^3+25x-12$ *(Soluc: $x=\pm1,4/3,3/4$)*

l) $P(x)=2x^4-x^3+6x^2-7x$ *(Soluc: x=0, 1)*

m) $P(x)=x^4-x^3-x^2-x-2$ *(Soluc: x=1)*

n) $P(x)=x^5-x^3-x^2+1$ *(Soluc: $x=\pm1$)*

o) $P(x)=x^4-2x^3-7x^2+5x-6$ *(Soluc: carece de raíces εQ)*

p) $P(x)=3x^4-9x^3-6x^2+36x-24$ *(Soluc: x=1,2 doble,-2)*

q) $P(x)=6x^4+11x^3-13x^2-16x+12$ *(Soluc: x=1, -2, 2/3, -3/2)*

r) $P(x)=x^6+6x^5+9x^4-x^2-6x-9$ *(Soluc: $x=\pm1$,-3 doble)*

☞ *Ejercicios libro:* ***pág. 37: 19; pág. 43: 55 y 57***

CONSECUENCIA:

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA: "Un polinomio de grado *n* tiene a lo sumo *n* raíces reales"

36. Resolver la ecuación $2x^3-3x^2=-\frac{1}{2}$, sabiendo que una de sus raíces es 1/2 *(Soluc: $x=\pm1/2$, 3/2)*

37. Resolver la ecuación $\sqrt[3]{x-2}=x$ *(Sol: x=2)*

38. ¿Serías capaz de resolver la ecuación $\sqrt[3]{x}=2\sqrt{x}-1$? Aunque es un poco complicada para este curso, puedes resolverla con los conocimientos ya adquiridos: tendrás que aplicar binomio de Newton y Ruffini… *(Sol: x=1)*

39. Resolver: **a)** $\left.\begin{array}{l}\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{1}{2}\\ y-x^2=1\end{array}\right\}$ *(Soluc: x=1, y=2)* **b)** $\left.\begin{array}{l}y=\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}\\ y=\sqrt{x^3}\end{array}\right\}$ *(Soluc: x=1; y=1)*

40. Inventar una ecuación polinómica que tenga únicamente por soluciones x=-2, x=1 y x=3

41. Inventar, de dos formas distintas, una ecuación polinómica que tenga únicamente como raíces 1 y 2

☞ *Ejercicios libro:* ***pág. 43: 48, 50 y 52***

42. Determinar el polinomio de grado 3 que verifica: P(-1)=P(2)=P(-3)=0 y P(-2)=18

43. Un polinomio de grado 3, ¿cuántas raíces puede tener como mínimo? Razonar la respuesta. *(Soluc: 1 raíz)*

www.yoquieroaprobar.es